



ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2024

02 - රසායන විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

මෙය උත්තරයක් පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන/ සහකාර පරීක්ෂක රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතුව ඇත.

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2024

02 - රසායන විද්‍යාව

ලකුණු බෙදී යාමේ ආකාරය

$$\text{I පත්‍රය} : 1 \times 50 = 50$$

II පත්‍රය :

$$\text{A කොටස} : 100 \times 4 = 400$$

$$\text{B කොටස} : 150 \times 2 = 300$$

$$\text{C කොටස} : 150 \times 2 = 300$$

$$\text{එකතුව} = 1000$$

$$\text{II පත්‍රය - අවසාන ලකුණු} = 100$$

Attachment 01

G.C.E. (A/L) Examination - 2024**02 - Chemistry****Distribution of Marks****AMENDMENTS TO MARKING SCHEME (Sinhala, English, Tamil) – 28th January 2025**

Paper I (Multiple Choice Questions)	
Q 18	2, 5



Paper II

Q1(b)(ii)	If Lewis structure in part (i) is correct, give marks for the following considerations of electronegativities of S and I (If electronegativity of S = I); S +5 or +V I +4 or +IV (If electronegativity of S > I); S +4 or +IV I +5 or +V (If electronegativity of S < I); S +6 or +VI I +3 or +III
Q3(a)(ii)	The 05 marks for equilibrium concentrations should change as 04+01
Q4(a)(i)	- COOH / carboxylic acid should be replaced by COOH / carboxylic acid / carboxyl - Remove the note
Q4(c)	Accept if student has written H ₃ O ⁺ instead of H ⁺ in the second step. H ₂ O is not acceptable instead of H ⁺ in the second step. If the structure of J in (i) is incorrect, do not award marks for (ii)

Paper III

Q5(a)(ii)	The 05 marks for substitution should change as 04 + 01 The 05 marks for K _c should change as 04 + 01
Q5(a)(iv)	$K_p = 2 (8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 500 \text{ K}) \text{ should be corrected to}$ $K_p = 2 \times 10^3 (8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 500 \text{ K})$ $K_p = 8.314 \times 10^3 \text{ Pa should be corrected to } K_p = 8.314 \times 10^6 \text{ Pa}$ Include the following ALTERNATE ANSWER $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ Partial pressure = Mole fraction x Total pressure $P_{\text{O}_2(\text{g})} = \frac{0.20 \text{ mol}}{0.64 \text{ mol}} \times 32 \times 8.314 \times 10^3 \text{ Pa} = 8.314 \times 10^4 \text{ Pa} \quad (04+01)$ $P_{\text{NO}(\text{g})} = \frac{0.40 \text{ mol}}{0.64 \text{ mol}} \times 32 \times 8.314 \times 10^3 \text{ Pa} = 16.628 \times 10^4 \text{ Pa} \quad (04+01)$ $P_{\text{NO}_2(\text{g})} = \frac{0.04 \text{ mol}}{0.64 \text{ mol}} \times 32 \times 8.314 \times 10^3 \text{ Pa} = 16.628 \times 10^3 \text{ Pa} \quad (04+01)$

	$K_p = \frac{P_{O_2(g)} P_{NO(g)}^2}{P_{NO_2(g)}^2} \quad (05)$ $K_p = \frac{\left(\frac{0.40 \text{ mol}}{0.64 \text{ mol}} \times 32 \times 8.314 \times 10^3 \text{ Pa}\right) \times \left(\frac{0.20 \text{ mol}}{0.64 \text{ mol}} \times 32 \times 8.314 \times 10^3 \text{ Pa}\right)^2}{\left(\frac{0.04 \text{ mol}}{0.64 \text{ mol}} \times 32 \times 8.314 \times 10^3 \text{ Pa}\right)^2}$ $\therefore K_p = 8.314 \times 10^6 \text{ Pa} \quad (04+01)$
Q5(b)(i)	The breakdown of marks for $\Delta H^\theta = (33 - 90) = -57 \text{ kJ mol}^{-1}$ (05 + 05) should be considered as given below: $\Delta H^\theta = (33 - 90) \text{ kJ mol}^{-1}$ (05) $\Delta H^\theta = -57 \text{ kJ mol}^{-1}$ (05) The alternate answer should change as OR: (B) $\times 2$ - (D) $\times 2$ (05) $2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)}$ (05) $\Delta H^\theta = \Delta H^\theta_{\text{products}} - \Delta H^\theta_{\text{reactants}}$ (05) $\Delta H^\theta = (66 - 180) \text{ kJ mol}^{-1}$ (05) $\Delta H^\theta = -114 \text{ kJ mol}^{-1}$ (04+01)
Q5(b)(iii)	- Accept if written as number of moles decreased even though 3.5 moles $\rightarrow$ 1 mole is not written $\Delta H_s^\theta (\text{N}_2\text{O}_5\text{(g)})$ should be replaced with $\Delta S_f^\theta (\text{N}_2\text{O}_5\text{(g)})$
Q6(b)(v)	The marks should be given as below, $r_A = k_A[A]: \quad (k_A = \frac{r_A}{[A]}) \quad (05)$ $r_B = k_B[B]: \quad (k_B = \frac{r_B}{[B]}) \quad (05)$
Q(c)(ii)	Please include the 04 marks in the same line as $x = 0.0005 \text{ g}$ (04)
Q7(a)(i)	- C or graphite can be accepted as anode - Pt can be accepted as cathode Delete the following line: OR $\text{MgCl}_2\text{(l)} \rightarrow \text{Mg(s)/(l)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$ (05)
Q7(a)(ii)	Reversible arrows not accepted

Q7(a)(iii)	Anode to cathode can also be accepted
Q7(a)(iv)II	H ⁺ can be accepted instead of water
Q7(b)(i)	If the relevant structures are drawn for P, Q, R, S and T award marks
Q7(b)(i) and (ii)II	Also include the following in the note given: (i) R: [Co(NH₃)₄(SO₄)]Cl (06) (ii) II. The following structure denoting sulfate as a bidentate ligand can be accepted  (03) Metal to ligand bonds may be shown as covalent bonds or coordinate bonds.
Q8(a)	Delete the first note marked with *
Q8(b)(i)	If ether is not written in LiAlH₄/ether, deduct 01 mark Dilute acid or H₃O⁺ can be accepted instead of H⁺/H₂O H₂O cannot be accepted instead of H⁺/H₂O Al₂O₃ with heating instead of conc H₂SO₄ with heating can be accepted
Q8(b)(ii)	If written as N ₂ ⁺ Cl ⁻ or N ₂ Cl without showing the triple bond, can be accepted
Q8(c)(i)	If the first reaction is given as, Br₂ + FeBr₃ → Br⁺ FeBr₄⁻ (04) Award marks as follows. (Note that FeBr₄⁻ in the third step is awarded 02 marks)  (26 Marks)
Q9(a)	B2; CrO₄²⁻(aq) can be accepted B3; Cr₂O₇²⁻(aq) can be accepted
Q9(b)(iii)	Mark accordingly for each of the following; If 40.8 used, 4896 g and 6.12 kg will be obtained If 40.82 used, 4898 g and 6.122 kg will be obtained If 40.82 used, 4898.4 g and 6.123 kg will be obtained

Q10(a)	CaCO ₃ / limestone / calcite can be accepted instead of CO ₂
Q10(a)(vii)	Accept if student writes raw materials may be reused instead of reusing NH ₃ and CO ₂
Q10(b)(i)	Award marks as given below to avoid confusion: • <u>N₂O</u> (02) contributes to global warming • It is a <u>greenhouse gas</u> (01) • <u>Increase in its concentration</u> contributes to global warming. (01) • <u>CH₄</u> (02) contribute to global warming • It is a <u>greenhouse gas</u> (01) • <u>Increase in its concentration</u> contributes to global warming. (01)
Q10(b)(ii)	Formation of CO₂: Replace Fossil fuels and coke used in iron extraction are converted to CO₂ during combustion (04) Fossil fuels (02) and coke (02) used in iron extraction are converted to CO₂ during combustion
Q10(c)(i)	Accept fermentation
Q10(c)(iv)	Out of the four constituents any two can be accepted (02x2)

Sinhala scheme only

Q2(b)(ii)III	Correct PbI ₂ to be PbCl ₂ to read as $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{PbCl}_2 \downarrow + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
Page 28	N ₂ O ₂ in alternate answer should be corrected to be N ₂ O ₅
Q6(b)(v)	$(k_B = \frac{r_A}{[A]})$ $(k_B = \frac{r_B}{[B]})$ should be corrected to

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Examinations – Sri Lanka
අ.පො.ස.(උ.පෙළ)විභාගය/G.C.E. (A/L) - 2024

විෂය අංකය
Subject No

02

විෂය
Subject

රසායන විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය/Marking Scheme
I පත්‍රය/Paper I

ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.	ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.	ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.	ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.	ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.
01.	5	11.	3	21.	4	31.	4/5	41.	1
02.	2	12.	2	22.	3	32.	5	42.	1
03.	4	13.	3	23.	4	33.	3	43.	1
04.	4	14.	1	24.	1	34.	3	44.	1
05.	2	15.	3	25.	1	35.	3	45.	2
06.	4	16.	2	26.	4	36.	4	46.	3
07.	5	17.	4	27.	2	37.	5	47.	4
08.	3	18.	5/2	28.	5	38.	1	48.	3
09.	3	19.	5	29.	(all)	39.	2	49.	1
10.	5	20.	2	30.	5	40.	2	50.	1

❖ විශේෂ උපදෙස්/Special Instructions:

විෂ් පිළිතුරකට ලකුණු 01 වැරදිත්/ 01 Mark for each question

මුළු ලකුණු/Total Marks 01 × 50 = 50

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

ප්‍රශ්න හතරවන මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි.)


1. (a) පහත සඳහන් ප්‍රකාශ හතර ද හැඟහොත් අසත්‍ය ද යන බව තීන් ඉරි මත සඳහන් කරන්න. හේතු අවශ්‍ය නැත.

- (i) නැතෝඩ කිරණ සහ β කිරණ යන දෙකෙහිම අංශුවල ආරෝපණය සහ ස්කන්ධය අතර අනුපාතය (e/m) එකම වේ. සත්‍ය
- (ii) කොපර් (Cu) පරමාණුවක වුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය $m_l = -1$ වන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 ක් ඇත. සත්‍ය
- (iii) F_2ClO^+ අයනයට තලීය ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් ඇත. අසත්‍ය
- (iv) F, S සහ Cl මූලද්‍රව්‍ය අතුරෙන් සල්ෆර් (S) වලට අඩුම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇත. සත්‍ය
- (v) කැටායනවල වූවිකරණ බලය සහ ඇනායනවල වූවිකරණ බලය හා සම්බන්ධ නීති, KF වලට වඩා LiCl වල ද්‍රවාංකය ඉහළ බව ප්‍රරෝකතනය කරයි. අසත්‍ය
- (vi) නයිට්‍රස් අම්ලය (HNO_2) හි, N—O බන්ධන දෙක දිගින් සමාන ය. අසත්‍ය
- (vii) CN_2^{2-} අයනය සඳහා ඇදිය හැකි ලුවීස් තීන්-ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) සංඛ්‍යාව 3 කි. සත්‍ය
- (viii) හෙක්සේන් (hexane) වල තාපාංකය 2, 2-ඩයිමීතයිල්බියුටේන් (2, 2-dimethylbutane) හි එම අගයට වඩා ඉහළ ය. සත්‍ය

(ලකුණු 04 X 8 = ලකුණු 32)

1(a): ලකුණු 32

(b) (i) ISO_4F අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් තීන්-ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න. එහි සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.



* මෙම ලුවීස් ව්‍යුහය වැරදි නම්
II කොටසට සම්පූර්ණ ලකුණු නැත.

(ලකුණු 06)

(ii) ඉහත (i) හි අඳින ලද ව්‍යුහයේ S සහ I පරමාණුවල ඔක්සිකරණ අංක දෙන්න.


S $+5$ හෝ $+V$
 $+4$ හෝ $+IV$
 $+6$ හෝ $+VI$

I $+4$ හෝ $+IV$
 $+5$ හෝ $+V$

(01) + (01)


(i) කොටස නිවැරදි නම් පමණක් (ii) කොටසට ලකුණු දෙන්න.

- (iii) HNCO අණුව සඳහා පිළිගත හැකි (ස්ථායී) ලුවීස් නිත්-ඉරි ව්‍යුහයක් පහත දී ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවීස් නිත්-ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රසුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් ඇද ඒවායේ ස්ථායීතාවයන් දී ඇති ව්‍යුහයට සාපේක්ෂව දැක්වීමට එම ව්‍යුහ යටින් ස්ථායී හෝ අඩු ස්ථායී හෝ අස්ථායී වශයෙන් ලියන්න.



(ව්‍යුහයට ලකුණු 02) + (ස්ථායීතාවයට ලකුණු 01)
(ලකුණු 06)

- (iv) පහත සඳහන් ලුවීස් නිත්-ඉරි ව්‍යුහය සහ එහි ලේබල් කරන ලද සැකිල්ල පදනම් කරගෙන දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



		N ¹	N ²	N ³	N ⁴
I	පරමාණු වටා VSEPR යුගල් සංඛ්‍යාව	4	3	3	2
II	පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය	වකුස්තලීය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණ	රේඛීය
III	පරමාණුව වටා හැඩය	පිරමීඩිය/ත්‍රි ආනති පිරමීඩිය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	කෝණික/V හැඩැති	රේඛීය
IV	පරමාණුවේ මුහුම්කරණය	sp ³	sp ²	sp ²	sp

(ලකුණු 01 X 16 = ලකුණු 16)

- කොටස් (v) සිට (viii), ඉහත (iv) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය මත පදනම් වේ. පරමාණු ලේබල් කිරීම (iv) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.

(v) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

I.	$H-N^1$	$H \dots 1s$	$N^1 \dots sp^3$
II.	N^1-N^2	$N^1 \dots sp^3$	$N^2 \dots sp^2$
III.	N^2-O	$N^2 \dots sp^2$	$O \dots 2p / sp^3$
IV.	N^2-N^3	$N^2 \dots sp^2$	$N^3 \dots sp^2$
V.	N^3-N^4	$N^3 \dots sp^2$	$N^4 \dots sp$
VI.	N^4-C	$N^4 \dots sp$	$C \dots 2p / sp$

(ලකුණු 01 X 12 = ලකුණු 12)

(vi) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

I.	N^2-N^3	$N^2 \dots 2p$	$N^3 \dots 2p$
II.	N^4-C	$N^4 \dots 2p$	$C \dots 2p$
		$N^4 \dots 2p$	$C \dots 2p$

(ලකුණු 01 X 6 = ලකුණු 06)

(vii) N^1, N^2, N^3 සහ N^4 පරමාණු වටා ආසන්න බන්ධන කෝණ සඳහන් කරන්න.

$N^1 (107^\circ \pm 1)$ $N^2 (120^\circ \pm 1)$ $N^3 (117^\circ \pm 2)$ $N^4 (180^\circ \pm 1)$ (ලකුණු 01 X 4 = ලකුණු 04)

(viii) N^1, N^2, N^3 සහ N^4 පරමාණු ඒවායේ විද්‍යුත් සෘණතාවයන් වැඩිවන පිළිවෙලට සකස්න්න.

$\dots N^1 \dots < \dots N^3 \dots < \dots N^2 \dots < \dots N^4 \dots$

(ලකුණු 04)

1(b): ලකුණු 56

(c) වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය විශ්ලිෂ්ට පිළිවෙළට පහත සඳහන් විශේෂ සකයන්හ. හේතු අවශ්‍ය නැත.

(i) B, O, F, S, Na, Mg (විද්‍යුත් සෘණතාව)

..... Na < Mg < B < S < O < F

(ලකුණු 06)

(ii) K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Al^{3+} , Cl^- , S^{2-} (අයනික අරය)

..... Al^{3+} < Mg^{2+} < Ca^{2+} < K^+ < Cl^- < S^{2-}

(ලකුණු 06)

1(c): ලකුණු 12

2. (a) (i) I. X යනු තැඹිලි පැහැති අයනික සංයෝගයකි. එය 7:2:2 අනුපාතයෙන් ඇති මූලද්‍රව්‍ය තුනකින් සමන්විත වේ (රසායනික සූත්‍රය ලිවීමේ අනුපිළිවෙළට නොවේ). මේවායින් දෙකක්, ආවර්තිතා වගුවේ එකම ආවර්තයට අයත් ලෝහ වේ. මෙම ලෝහ දෙකෙන් එකක්, s-ගොනුවට අයත් වන අතර, අනෙක d-ගොනුවට අයත් වේ. d-ගොනුවේ ලෝහය විද්‍යුත් ලෝහාලේපනයේදී බහුලව භාවිත කරයි.

X හඳුනාගන්න. $K_2Cr_2O_7$

II. Y යනු බන්ධන අම්ලයකි. එය 1:2:4 අනුපාතයෙන් ඇති මූලද්‍රව්‍ය තුනකින් සමන්විත වේ (රසායනික සූත්‍රය ලිවීමේ අනුපිළිවෙළට නොවේ). Y හි ඇති එක් මූලද්‍රව්‍යයක් X හි ද අඩංගු වේ. පොස්පේට් පොහොර නිපදවීම සඳහා Y භාවිත වේ.

Y හඳුනාගන්න. H_2SO_4

III. Z යනු කටුක ගෙඩක් ඇති ත්‍රි-පරමාණුක වායුවකි. එයට V-හැඩයක් ඇත. එය Y නිෂ්පාදනයේදී භාවිත වේ.

Z හඳුනාගන්න. SO_2

(ලකුණු 06 x 3 = ලකුණු 18)

(ii) X හි අඩංගු ලෝහ දෙකෙහි ඔක්සිකරණ අංක හා ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාස ලියන්න.

ලෝහය	K	ඔක්සිකරණ අංකය	+I	ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ හෝ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
------	---	---------------	----	-------------------------	---

ලෝහය	Cr	ඔක්සිකරණ අංකය	+VI	ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ හෝ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$
------	----	---------------	-----	-------------------------	--

* සම්බන්ධතා ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස සඳහා ලකුණු නැත.

(ලකුණු 02 x 6 = ලකුණු 12)

(iii) I. Z උපයෝගී කොට Y නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලිය නම් කරන්න.

(ලකුණු 02)


ස්පර්ශ ක්‍රමය

II. Z, $O_2(g)$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර සෑදෙන වායුව Y වල සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක දිය කළ විට P සංයෝගය ලබා දේ. P සංයෝගය ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට නැවත Y ලබා දේ. P සංයෝගයේ නම් සහ රසායනික සූත්‍රය ලියන්න.

ඔලියම්/ පයිරොසල්ෆියුරික් අම්ලය (P) $H_2S_2O_7$
 නම් රසායනික සූත්‍රය
 / සධුම සල්ෆියුරික් අම්ලය
 / ඩයිසල්ෆියුරික් අම්ලය


(ලකුණු $04 \times 2 =$ ලකුණු 08)

(iv) X, Y හා Z එකට ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.



හෝ

(ලකුණු 10)



භෞතික අවස්ථා අවශ්‍ය නැත.

2(a): ලකුණු 50

(b) BaCl_2 , NaI , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, තනුක HCl , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, AgNO_3 , සාන්ද්‍ර NH_4OH හා තනුක NH_4OH හි ජලීය ද්‍රාවණ A, B, C, D, E, F, G හා H ලෙස ලේබල් කර ඇති බෝතල් අටක් (පිළිවෙළට නොවේ) ශිෂ්‍යයෙකුට දෙන ලදී. ඒවා හඳුනාගැනීම සඳහා වරකට ද්‍රාවණ දෙක බැගින් මිශ්‍ර කිරීමෙන් ලැබුණු සම්භර ප්‍රයෝජනවත් තිරික්සණ පහත දක්වා ඇත.

	මිශ්‍ර කළ ද්‍රාවණ	තිරික්සණය
I.	A + C	උණු ජලයෙහි ද්‍රාව්‍ය කහ පැහැති අවක්ෂේපයක්
II.	B + C	H හි අද්‍රාව්‍ය කහ පැහැති අවක්ෂේපයක්
III.	A + E	උණු ජලයෙහි ද්‍රාව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක්
IV.	B + E	D හි ද්‍රාව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක්
V.	E + F	G හි අද්‍රාව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක්
VI.	A + F	G හි අද්‍රාව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක්
VII.	D + G	අවර්ණ ද්‍රාවණයක්
VIII.	H + G	අවර්ණ ද්‍රාවණයක්

(i) A සිට H හඳුනාගන්න.

A $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ E BaCl_2
 B AgNO_3 F $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
 C NaI G තනුක HCl / HCl ✓.....
 D තනුක NH_4OH H සාන්ද්‍ර NH_4OH

(ලකුණු 04 x 8 = ලකුණු 32)

(ii) I සිට VI එක් එක් ප්‍රතික්‍රියාවෙහි අවක්ෂේප සෑදීම සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න. අවක්ෂේපයක් දැක්වීමට ↓ සලකුණ භාවිත කරන්න.

I. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NaI} \rightarrow \text{PbI}_2 \downarrow + 2\text{NaNO}_3$
 II. $\text{AgNO}_3 + \text{NaI} \rightarrow \text{AgI} \downarrow + \text{NaNO}_3$
 III. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{PbCl}_2 \downarrow + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
 IV. $2\text{AgNO}_3 + \text{BaCl}_2 \rightarrow 2\text{AgCl} \downarrow + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
 V. $3\text{BaCl}_2 + \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 3\text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{AlCl}_3$
 VI. $3\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 3\text{PbSO}_4 \downarrow + 2\text{Al}(\text{NO}_3)_3$

(ලකුණු 03 x 6 = ලකුණු 18)

සටහන : අවක්ෂේප දැක්වීම සඳහා ↓ යොදා නොමැති නම් ලකුණු 01 ක් අඩු කරන්න.

2(b): ලකුණු 50





3. (a) උෂ්ණත්වය 25 °C දී $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ අම්ලයේ විඝටන නියත

$$K_1 = 4.5 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \text{ සහ } K_2 = 4.7 \times 10^{-11} \text{ mol dm}^{-3} \text{ වේ.}$$

(i) $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ වල පළමු සහ දෙවන විඝටන සඳහා සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.


සටහන: භෞතික අවස්ථා අවශ්‍ය වේ.

සියළු ප්‍රතික්‍රියා සඳහා සමතුලිතතාවයේ සංකේතය $\rightleftharpoons$ අවශ්‍ය වේ.



(ii) පළමු විඝටනය සලකමින් 25 °C දී $0.05 \text{ mol dm}^{-3} \text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ ද්‍රාවණයක $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ සහ $\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ සාන්ද්‍රණ ගණනය කරන්න.

$$K_1 = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})][\text{HCO}_3^-(\text{aq})]}{[\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})]} \dots\dots (05)$$



ආරම්භක සාන්ද්‍රණය	0.05	0	0	mol dm^{-3}
සාන්ද්‍රණ වෙනස	-x	x	x	mol dm^{-3}
සමතුලිත සාන්ද්‍රණය	$0.05 - x$	x	x	mol dm^{-3}

$$K_1 = 4.50 \times 10^{-7} = \frac{x \cdot x}{0.05 - x} \approx \frac{x^2}{0.05} \dots\dots (05)$$

$$x^2 = 225 \times 10^{-10}$$

$$x = 1.5 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \dots\dots (04 + 01)$$


$$[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})] = [\text{HCO}_3^-(\text{aq})] = 1.5 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \dots\dots (04 + 01)$$

$$15 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

25

(iii) දෙවැනි විඝටනය සලකමින්, ද්‍රාවණයේ $[\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})]$ ආසන්න වශයෙන් K_2 වලට සමාන බව පෙන්වන්න. ගන්නා ලද උපකල්පන/ය සඳහන් කරන්න.

$$K_2 = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})][\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})]}{[\text{HCO}_3^-(\text{aq})]} \dots\dots (05)$$



ආරම්භක සාන්ද්‍රණය	1.5×10^{-4}	1.5×10^{-4}	0	mol dm^{-3}
සාන්ද්‍රණ වෙනස	-y	$1.5 \times 10^{-4} + y$	y	mol dm^{-3}
සමතුලිත සාන්ද්‍රණය	$1.5 \times 10^{-4} - y$	$1.5 \times 10^{-4} + y$	y	mol dm^{-3}

$$K_2 = 4.70 \times 10^{-11} = \frac{(1.5 \times 10^{-4} + y) \cdot y}{(1.5 \times 10^{-4} - y)} \approx y \dots\dots (05)^*$$

* HCO_3^- වලින් විඝටනය වූ ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා බවත් H_3O^+ හි එකතු වූ ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා බවත්, එබැවින් විශේෂ දෙකෙහි සාන්ද්‍රණ වෙනස නොසැලකිය හැකි බවත් ශිෂ්‍යයා වචන වලින් ලියන්නේ නම්, මෙම ලකුණු 05 + 05 ලබා දෙන්න.

$$[\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})] \approx K_2 \dots\dots (05)$$

උපකල්පනය : 1 වන විඝටනයට සාපේක්ෂව 2 වන විඝටනය ඉතා කුඩා බව 25 (05)

3(a): ලකුණු 60

- (b) උෂ්ණත්වය 25°C දී $0.01 \text{ mol dm}^{-3} \text{ Al}^{3+}(\text{aq})$ අයන සහ $0.01 \text{ mol dm}^{-3} \text{ Ag}^{+}(\text{aq})$ අයන අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණයක් ඔබට සපයා ඇත. එම ද්‍රාවණයේ 1.0 dm^3 කට, සාන්ද්‍ර $\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$ අයන ද්‍රාවණයක් නොතකව්වා කලතමින්, සිංදුව බැගින් එකතු කරන ලදී.

උෂ්ණත්වය 25°C දී,

$$K_{sp}(\text{AlPO}_4) = 1.3 \times 10^{-20} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} \text{ සහ } K_{sp}(\text{Ag}_3\text{PO}_4) = 8.1 \times 10^{-12} \text{ mol}^4 \text{ dm}^{-12} \text{ වේ.}$$

- (i) $\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$ ද්‍රාවණය එක් කිරීමේදී සිදු විය හැකි පරිමා වෙනස නොසලකමින්, මිශ්‍රණයෙන් පළමුව අවක්ෂේප වන ලෝහ අයනය (Al^{3+} හෝ Ag^{+}) කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න. සුදුසු ගණනය කිරීමක් පදනම් කරගනිමින් ඔබගේ පිළිතුර සඳහා හේතු දක්වන්න.

සෑදෙන අවක්ෂේප AlPO_4 සහ Ag_3PO_4

AlPO_4 සඳහා



$$K_{sp} = [\text{Al}^{3+}(\text{aq})][\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})] \quad (02)$$

$$1.30 \times 10^{-20} = 0.01 \times [\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})] \quad (04)$$

$$\text{AlPO}_4(\text{s}) \text{ අවක්ෂේප වීම සඳහා අවශ්‍ය ; } [\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})] = 1.30 \times 10^{-18} \text{ mol dm}^{-3} \quad (03+01) \quad 12$$

Ag_3PO_4 සඳහා



$$K_{sp} = [\text{Ag}^{+}(\text{aq})]^3[\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})] \quad (02)$$

$$8.10 \times 10^{-12} = (0.01)^3 \times [\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})] \quad (04)$$

$$\text{Ag}_3\text{PO}_4(\text{s}) \text{ අවක්ෂේප වීම සඳහා අවශ්‍ය ; } [\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})] = 8.10 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \quad (03+01) \quad 12$$

$$[\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})]_{\text{AlPO}_4(\text{s})} < [\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})]_{\text{Ag}_3\text{PO}_4(\text{s})} \quad (04)$$

$\text{AlPO}_4(\text{s})$ පළමුව අවක්ෂේප වේ.

(04)

32

- (ii) දෙවෙනි අයනය අවක්ෂේප වීම ආරම්භ වන විට පළමුව අවක්ෂේප වූ අයනයේ සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.

$$\text{AlPO}_4(\text{s}) \text{ අවක්ෂේප වූ පසු ද්‍රාවණය තුළ ඉතිරිව ඇති } [\text{Al}^{3+}(\text{aq})] = \frac{K_{sp}(\text{AlPO}_4(\text{s}))}{8.10 \times 10^{-6}} \quad (04)$$

$$\begin{aligned} \text{ද්‍රාවණය තුළ ඉතිරිව ඇති } [\text{Al}^{3+}(\text{aq})] &= \frac{1.30 \times 10^{-20}}{8.10 \times 10^{-6}} \quad (\text{දෙවන කිරීමේදී ආදායම් ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැකි බව දැක්වේ.}) \\ &= 1.6 \times 10^{-15} \text{ mol dm}^{-3} \quad (03+01) \end{aligned}$$

08

3(b): ලකුණු 40

4. (a) ● අණුක සූත්‍රය $C_5H_{10}O_3$ ක් වූ A කාබනික සංයෝගය වැඩිපුර PCl_5 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 155 ක් වූ B සංයෝගය සාදයි. A සංයෝගය ජලය Na_2CO_3 සමග CO_2 මුක්ත කරයි.
(C = 12.0, H = 1.0, O = 16.0, Cl = 35.5)

(i) A සංයෝගයේ පවතින ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ලියන්න.

OH / හයිඩ්‍රොක්සි / හයිඩ්‍රොක්සිල් , COOH / කාබොක්සිලික් අම්ලය


(ලකුණු $05 \times 2 =$ ලකුණු 10)

- A සංයෝගය ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය නොපෙන්වයි. A සංයෝගය පිරිඩිනියම් ක්ලෝරෝක්‍රෝමේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර C සංයෝගය සාදයි. C සංයෝගය ඇමෝනියා $AgNO_3$ සමග රිදී කැටපතක් ලබාදෙයි. B සංයෝගය ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර D සංයෝගය සාදයි. D සංයෝගය මධ්‍යසාරීය KOH සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ද්විත්ව බන්ධනයක් සහිත E ඵලය ලබාදෙයි.


(ii) A, B, C, D සහ E හි ව්‍යුහ අදාළ කොටු තුළ අඳින්න.




A



B



C



D



හෝ



E

(ලකුණු $07 \times 5 =$ ලකුණු 35)

- F සංයෝගය A හි ව්‍යුහ සමාවයවිකයක් වේ. F සංයෝගය වැඩිපුර PCl_5 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 155 ක් වූ G සංයෝගය ලබාදෙයි. F සංයෝගය ජලීය Na_2CO_3 සමග CO_2 මුක්ත නොකරයි. F සංයෝගය ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. F සංයෝගය සාන්ද්‍ර HCl /නිර්ජලීය ZnCl_2 සමග පිරියම් කළ විට ආවිලතාවක් ලබා නොදෙයි. 2,4-ඩයිනයිට්‍රෝෆීනයිල්හයිඩ්‍රසින් (2,4-DNP) සමග F සංයෝගය වර්ණවත් අවක්ෂේපයක් ලබාදෙන අතර ඇමෝනියා AgNO_3 සමග රිදී කැටපතක් ලබාදෙයි.


(iii) F සංයෝගයේ පවතින ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ලියන්න.

CHO / ඇල්ඩිහයිඩ් , OH / හයිඩ්‍රොක්සි / හයිඩ්‍රොක්සිල් / *හයිඩ්‍රොක්සිල් OH*


සටහන : පිළිතුරු 2ම නිවැරදි නම් ලකුණු 09 ප්‍රදානය කරන්න, එක් පිළිතුරක් පමණක් නිවැරදි නම් ලකුණු 5ක් පමණක් ප්‍රදානය කරන්න

(ලකුණු 05 + ලකුණු 04 = ලකුණු 09)

(iv) F සහ G හි ව්‍යුහ අදාළ කොටු තුළ අඳින්න.



(F)




(G)

(ලකුණු 07 x 2 = ලකුණු 14)


4(a): ලකුණු 68

(b) (i) ඇසිටෝන් න්‍යූන ජලීය NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සෑදෙන H එලයේ ව්‍යුහය අදාළ කොටුව තුළ අඳින්න.

(ii) H හයිඩ්‍රොක්සිලෝරික් අම්ලය සමග රත් කළ විට සෑදෙන I එලයේ ව්‍යුහය අදාළ කොටුව තුළ අඳින්න.



H




I

(ලකුණු 06 x 2 = ලකුණු 12)

4(b): ලකුණු 12


(c) (i) ඇසිටෝන් සහ HCN අතර සිදු වන ප්‍රතික්‍රියාවේදී සෑදෙන J ඵලයේ ව්‍යුහය අදාළ කොටුව තුළ අඳින්න



* මෙම ව්‍යුහය වැරදි නම් ආලයානාශ්‍රයක් සඳහා සම්පූර්ණ ලකුණු නැත.

(ලකුණු 06)

(ii) ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවෙහි යන්ත්‍රණය ලියන්න.



සටහන : CN^- වෙනුවට HCN භාවිත කර ඇත්නම් : CN^- සඳහා වෙන් කර ඇති ලකුණු 02 අඩු කරන්න.

(ලකුණු 14)


4(c): ලකුණු 20

B කොටස — රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

සටහන: භෞතික අවස්ථා අවශ්‍ය වේ


5. (a) මවුල අනුපාතය පිළිවෙළින් 2:1 වන NO(g) සහ $\text{O}_2(\text{g})$ මිශ්‍රණයක්, පරිමාව 10 dm^3 වන දෘඪ-සංචාල භාජනයකට ඇතුළත් කර T උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට ඉඩහරින ලදී. යම් කාලයකට පසු පද්ධතිය පහත දක්වා ඇති සමතුලිතතාවයට T උෂ්ණත්වයේදී එළඹුණි.



සමතුලිතතාවයේදී පහත දැක්වෙන නිරීක්ෂණ සටහන් කරගන්නා ලදී.

- වායු මිශ්‍රණයේ පීඩනය $32 \times 8.314 \times 10^3 \text{ Pa}$ විය.
- වායු තුනෙහි මුළු මවුල ගණන 0.64 විය.
- O_2 වල ස්කන්ධය 6.4 g විය.

- (i) සමතුලිතතාවයේදී එක් එක් වායුමය ප්‍රභේදයෙහි සාන්ද්‍රණය mol dm^{-3} වලින් ගණනය කරන්න. ($\text{O} = 16$)



$$\text{O}_2(\text{g}) \text{ මවුල ප්‍රමාණය} = \frac{6.4 \text{ g}}{32 \text{ g mol}^{-1}} = 0.20 \quad (02)$$

$$\text{O}_2(\text{g}) \text{ සාන්ද්‍රණය} = \frac{0.20 \text{ mol}}{10 \text{ dm}^3} = 2.0 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \quad (02+01)$$

$$\text{NO(g)} \text{ මවුල ප්‍රමාණය} = 0.40 \text{ (2:1 අනුපාතය දී ඇත)} \quad (02)$$

$$\text{NO(g)} \text{ සාන්ද්‍රණය} = \frac{0.40 \text{ mol}}{10 \text{ dm}^3} = 4.0 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \quad (02+01)$$

$$\text{NO}_2(\text{g}) \text{ මවුල ප්‍රමාණය} = 0.64 - (0.40 + 0.20) = 0.04 \quad (02)$$

$$\text{NO}_2(\text{g}) \text{ සාන්ද්‍රණය} = \frac{0.04 \text{ mol}}{10 \text{ dm}^3} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \quad (02+01)$$

15

- (ii) මෙම T උෂ්ණත්වයේදී සමතුලිතතා නියතය, K_c ගණනය කරන්න.

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2(\text{g})]^2}{[\text{O}_2(\text{g})][\text{NO}(\text{g})]^2} \quad (05)$$

$$K_c = \frac{[4.0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}]^2}{[2.0 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}][4.0 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}]^2} \quad (04+01)$$

$$K_c = 0.50 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 \quad (04+01)$$

15

- (iii) මෙම තත්ත්ව යටතේදී උෂ්ණත්වය T වල අගය (K වලින්) ගණනය කරන්න. ගන්නා ලද උපකල්පන/ය සඳහන් කරන්න.

පරිපූර්ණ වායු ලෙස උපකල්පනය කරමින් _____ (03)

$PV = nRT$ _____ (02)

$$T = \frac{PV}{nR}$$

$$T = \frac{32 \times 8.314 \times 10^3 \text{ Pa} \times 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{0.64 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}} \text{ _____ (05)}$$

$$T = 500 \text{ K} \text{ _____ (04+01)}$$

15

- (iv) $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ඉහත (iii) හි නිර්ණය කරන ලද උෂ්ණත්වයේදී සමතුලිතතා නියතය, K_p ගණනය කරන්න.

$2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ යනු ආරම්භක ප්‍රතික්‍රියාවේ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව වේ. _____ (05)

සමතුලිතතා නියතය K'_C නම්,

$$K'_C = \frac{1}{K_C} \text{ * (Check the amendments sheet for alternate answer.)} \text{ _____ (05)}$$

$$= \frac{1}{0.50} = 2 \text{ mol dm}^{-3} / 2 \times 10^3 \text{ mol m}^{-3} \text{ _____ (04+01)}$$

$$K_P = K_C (RT)^{\Delta n} \quad \Delta n = 1 \text{ _____ (03+02)}$$

$$K_P = 2 \times 10^3 \text{ mol m}^{-3} (8.314 \text{ Nm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 500 \text{ K})$$



$$K_P = 8.314 \times 10^6 \text{ Pa} / 8314 \times 10^3 \text{ Pa} \text{ _____ (04+01)}$$

25

5(a): ලකුණු 70


- (b) උෂ්ණත්වය 298 K හි පහත දී ඇති තොරතුරු සලකන්න.

$$\Delta H_f^\circ(\text{NO}(\text{g})) = 90 \text{ kJ mol}^{-1}$$



- දී ඇති තොරතුරු අනුව

$$\Delta H_f^\circ(\text{NO}(\text{g})) = 90 \text{ kJ mol}^{-1} \text{(A)}$$



(i) උෂ්ණත්වය 298 K හිදී,

$2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ΔH° ගණනය කරන්න.

අවශ්‍ය ප්‍රතික්‍රියාව : $2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)}$

Aවලින්, $\Delta H_f^\circ(\text{NO(g)})$: $\frac{1}{2}\text{N}_2\text{(g)} + \frac{1}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{NO(g)}: \Delta H^\circ = 90 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (D) \dots (05)$

(B) - (D) : $\frac{1}{2}\text{O}_2\text{(g)} + \text{NO(g)} \rightarrow \text{NO}_2\text{(g)} \dots \dots (E) \dots (05)$

$\Delta H^\circ = (33 - 90) = -57 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (05 + 05)$

(E) $\times 2$: $2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)} \Delta H^\circ = -114 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (04 + 01)$


25

හෝ : (B) $\times 2$ - (D) $\times 2$: $2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)}$ (05+05)

$\Delta H^\circ = (66 - 180) \text{ kJ mol}^{-1}$ (05+05)

$\Delta H^\circ = -114 \text{ kJ mol}^{-1}$ (04+01)

හෝ :



$$2 \times 33 = 2 \times 90 + \Delta H^\circ$$

හේතු නියමයට අනුව $\Delta H^\circ = \Delta H_2^\circ - \Delta H_1^\circ = (2 \times 33 - 2 \times 90) \text{ kJ mol}^{-1} \dots (05)$

$= -114 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (04 + 01)$

හෝ වෙනත් පිළිගත හැකි ක්‍රමයක්

(ii) උෂ්ණත්වය 298 K හිදී $\Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{O}_5\text{(g)})$ ගණනය කරන්න.

$2\text{N}_2\text{O}_5\text{(g)}$ හි උත්පාදනයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව :

$\text{N}_2\text{(g)} + \frac{5}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_5\text{(g)}: \Delta H_f^\circ = ? \dots (05)$

තොරතුරු: $\frac{1}{2}\text{N}_2\text{(g)} + \frac{1}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{NO(g)}: \Delta H^\circ = 90 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (D)$

(D) $\times 2$: $\text{N}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NO(g)}: \Delta H^\circ = 180 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (F) \dots (05 + 05)$

$2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)} \Delta H^\circ = -114 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (G)$

$4\text{NO}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{N}_2\text{O}_5\text{(g)}: \Delta H^\circ = -102 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (C)$


(C) $\div 2$: $2\text{NO}_2\text{(g)} + \frac{1}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_5\text{(g)}: \Delta H^\circ = -51 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (H) \dots (05)$

(F) + (G) + (H): $\text{N}_2\text{(g)} + \frac{5}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_5\text{(g)}$

$\Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{O}_5\text{(g)}) = [180 + (-114) + (-51)] \text{ kJ mol}^{-1} = 15 \text{ kJ mol}^{-1} \dots (05 + 04 + 01)$

30

හෝ :



හේස් නියමයට අනුව $2\Delta H_f^\theta(\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})) = (4 \times 33 - 102) \text{ kJ mol}^{-1}$ (05+05)

$\Delta H_f^\theta(\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})) = 15 \text{ kJ mol}^{-1}$ (04+01)


හෝ වෙනත් පිළිගත හැකි ක්‍රමයක්

25

(iii). ඉහත (ii) හි දී ලැබුණු ප්‍රතිඵල ආධාරයෙන් පහත දෑ පුරෝකථනය කරන්න.

I. $\Delta S_f^\theta(\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}))$ හි සලකුණ

II. $\text{N}_2(\text{g})$ සහ $\text{O}_2(\text{g})$ වලින් $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ සෑදීමේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසිද්ධතාවය



ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ වුවද ගණනය/අඩු වූ මවුල ප්‍රමාණය : මවුල 3.5 $\rightarrow$ මවුල 1 (05)

අඩු වී ඇත

$\Delta S_f^\theta(\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}))$ සාණ (< 0) වේ (05)

II. $\Delta G^\theta = \Delta H^\theta - T\Delta S^\theta$ (05)

$= +ve - (+ve)(-ve) = +ve$ (05)

උෂ්ණත්වය 298 K දී ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ නොවේ. (05)

5(b): ලකුණු 80

6. (a) වායු සඳහා වූ වාලන අණුක වාදය අනුව පරිපූරණ වායුවක් සඳහා T උෂ්ණත්වයේදී $PV = \frac{1}{3} mN \overline{C^2}$ වේ. මෙහි P වායුවේ පීඩනය ද, V වායුවේ පරිමාව ද, m වායු අණුවක ස්කන්ධය ද, N වායු අණු ගණන ද, $\overline{C^2}$ වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය ද වේ.

(i) පරිපූරණ වායුවක් සඳහා $\overline{C^2} = \frac{3RT}{M}$ බව පෙන්වන්න. M යනු වායුවේ මවුලික ස්කන්ධය වේ.

සටහන : භෞතික තත්ත්ව අවශ්‍ය වේ.

$$PV = \frac{1}{3} mN \overline{C^2} = \frac{1}{3} m(nN_A) \overline{C^2} : n - \text{මවුල, } N_A \text{ ඇවගාඩ්රෝ නියතය} \quad (04)$$

$$m' = m \cdot n, M = \frac{m}{n}, \quad = \frac{1}{3} nM \overline{C^2} : M - \text{මවුලික ස්කන්ධය} \quad (04)$$

$$n = \frac{m}{M} \quad PV = nRT = \frac{1}{3} nM \overline{C^2} \quad (04)$$

$$\overline{C^2} = \frac{3RT}{M} \quad (04)$$

16

- (ii) A සහ B යනු මවුලික ස්කන්ධයන් පිළිවෙළින් M_A සහ M_B වූ පරිපූරණ වායු දෙකකි.

උෂ්ණත්වය $T = 300 \frac{M_B}{M_A}$ හිදී, B වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය $(\overline{C_B^2})$, උෂ්ණත්වය $T = 300$ හිදී A වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය $(\overline{C_A^2})$ ට සමාන බව පෙන්වන්න. (උෂ්ණත්ව කෙල්වින්වලින් දී ඇත.)

A වායුව සඳහා: $\overline{C_A^2} = \frac{3RT}{M_A} = \frac{3R \times 300}{M_A} \dots \dots \dots (1) \quad (04)$

B වායුව සඳහා: $\overline{C_B^2} = \frac{3RT}{M_B} = \frac{3R \times 300 \left(\frac{M_B}{M_A}\right)}{M_B} = \frac{3R \times 300}{M_A} \dots \dots \dots (2) \quad (04)$

(1) = (2): $\overline{C_A^2} = \overline{C_B^2} \quad (04)$

12

- (iii) දී ඇති ඕනෑම T උෂ්ණත්වයකදී A සහ B වායු දෙකෙහි මවුලික වාලන ශක්තීන් අතර අනුපාතය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

උෂ්ණත්වය T වලදී මවුලයක් සඳහා වාලන ශක්තිය $(KE) = \frac{3RT}{2}$ *මෙම ධන වාලන ශක්තිය ව්‍යුත්පන්න කර ඇත. එය ධන වේ.*

A වායුව සඳහා: $(KE)_A = \frac{3RT_A}{2} \quad (04)$

B වායුව සඳහා: $(KE)_B = \frac{3RT_B}{2} \quad (04)$

As $T_A = T_B$: $(KE)_A = (KE)_B \quad (04)$

හෝ වායුවක වාලන ශක්තිය (නිරපේක්ෂ) උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී.

$$(KE)_A = (KE)_B \quad (12)$$

16

6(a): ලකුණු 40

(b) (i) 'ප්‍රාරම්භක ප්‍රතික්‍රියාවක්' යන පදය අර්ථ දක්වන්න.

මූලික ප්‍රතික්‍රියාව : තනි පියවරකින් පමණක් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව (අතරමැදියක් සහභාගි නොවන) (05)*
All

(ii) ප්‍රතික්‍රියාවක 'අණුකතාවය' යන පදය අර්ථ දක්වන්න.

අණුකතාවය : මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා හෝ ප්‍රතික්‍රියාවක වේග නිර්ණය පියවර සඳහා සහභාගිවන මුළු ප්‍රතික්‍රියක අණු සංඛ්‍යාව (05)

(iii) ප්‍රාරම්භක ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා 'ප්‍රතික්‍රියා පෙළ' සහ 'අණුකතාවය' අතර සම්බන්ධතාවය කුමක් ද?

මූලික ප්‍රතික්‍රියාව : ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ = අණුකතාව (05)*
All
16

(iv) ප්‍රතික්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියකයේ සාන්ද්‍රණය කාලය සමග වෙනස්වන අයුරු පහත සඳහන් වගුවේ දක්වා ඇත.

කාලය (මිනිත්තු)	0	10	20	30	40
ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණය (mol dm ⁻³)	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1

I. ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ නිර්ණය කරන්න.

II. ප්‍රතික්‍රියාවේ අර්ධ-ජීව කාලය සඳහන් කරන්න.

මිනිත්තු 10 දී සාන්ද්‍රණය ආරම්භක සාන්ද්‍රණයෙන් අඩක් වේ. (05)

මෙය මිනිත්තු 10 යේ කාල පරාසවලින් සමන්විත වේ. (05)

I) ප්‍රතික්‍රියාව පළමු පෙළ වේ. (05)

II) ප්‍රතික්‍රියාවේ අර්ධ ආයු කාලය මිනිත්තු 10 ක් වේ. (05)

20

* ශිෂ්‍යයකු ප්‍රශ්න අංක 6(b) සඳහා උත්සාහ කර ඇත්නම්, (i) සහ (iii) කොටස් සඳහා ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.

(v) දෙන ලද උෂ්ණත්වයකදී, ① සහ ② පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවන් දෙකක් සඳහා පහත දී ඇති තොරතුරු සලකන්න.

	ප්‍රතික්‍රියාව	ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව/ mol dm ⁻³ s ⁻¹	ශීඝ්‍රතා නියතය/s ⁻¹	අර්ධ-ජීව කාලය/s
①:	A → P ₁	r _A	k _A	(t _{1/2}) _A
②:	B → P ₂	r _B	k _B	(t _{1/2}) _B
	(P ₁ , P ₂ = ඵල)			

වේග නියතය k වූ පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා අර්ධ-ජීව කාලය, $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$ වේ.

[B] = 2[A] වූ විට r_B = 3r_A නම්, 2(t_{1/2})_A = 3(t_{1/2})_B බව පෙන්වන්න.

මේවා පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියා නිසා,

$$r_A = k_A[A]: \quad / \quad k_A = \frac{r_A}{[A]} \quad \text{-----} \quad (05)$$

$$r_B = k_B[B]: \quad / \quad k_B = \frac{r_B}{[B]} \quad \text{-----} \quad (05)$$

$$[B] = 2[A], r_B = 3r_A \text{ and } t_{1/2} = \frac{0.693}{k} \text{ දී ඇත}$$

$$k_A = \frac{r_A}{[A]} \dots\dots\dots(I) \quad (05)$$

$$k_B = \frac{3r_A}{2[A]} \dots\dots(II) \quad \text{ලෙස ලිවිය හැක} \quad (05)$$

$$(I)+(II) \quad \frac{k_A}{k_B} = \frac{2}{3} \quad \text{ලබා දේ} \quad (05)$$

$$\frac{(t_{1/2})_A}{(t_{1/2})_B} = \frac{0.693/k_A}{0.693/k_B} = \frac{k_B}{k_A} = \frac{3}{2} \quad (05+05)$$

$$2(t_{1/2})_A = 3(t_{1/2})_B \quad (05)$$

6(b): ලකුණු 75

(c) උෂ්ණත්වය 25°C දී 0.30 g dm^{-3} ජලීය අයඩින් ද්‍රාවණයකින් 50.0 cm^3 , CCl_4 10.0 cm^3 සමග හොඳින් සොලවන ලදී. පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට එළඹී විට ජල ස්ථරයේ අයඩින් සාන්ද්‍රණය 0.02 g dm^{-3} බව සොයාගන්නා ලදී.

(i) සමතුලිතතාවයේදී CCl_4 ස්ථරයේ අයඩින් සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.

$$\text{ජලීය ස්ථරයේ ආරම්භක } I_2 \text{ ස්කන්ධය} = 0.30 \text{ g dm}^{-3} \times 50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 = 0.015 \text{ g} \quad (03)$$

$$\text{ජලීය ස්ථරයේ සමතුලිත } I_2 \text{ ස්කන්ධය} = 0.02 \text{ g dm}^{-3} \times 50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 = 0.001 \text{ g} \quad (03)$$

$$\text{සමතුලිත අවස්ථාවේ } [I_2]_{H_2O} = \frac{(0.001 \text{ g})}{50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 0.02 \text{ g dm}^{-3} \quad \frac{0.001 \text{ g} / 254 \text{ g mol}^{-1}}{50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 7.87 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{CCl}_4 \text{ ස්ථරයේ සමතුලිත } I_2 \text{ ස්කන්ධය} = (0.015 - 0.001) \text{ g} = 0.014 \text{ g} \quad (03)$$

$$\text{සමතුලිත අවස්ථාවේ } [I_2]_{CCl_4} = \frac{(0.014 \text{ g})}{10 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 1.4 \text{ g dm}^{-3} \quad \frac{0.014 \text{ g} / 254 \text{ g mol}^{-1}}{10 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 5.51 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \quad (03+03+01)$$

16

(ii) උෂ්ණත්වය 25°C දී, CCl_4 සහ ජලය අතර I_2 වල විභාග සංගුණකය ගණනය කරන්න.

$$K_D = \frac{[I_2]_{CCl_4}}{[I_2]_{H_2O}} = \frac{1.4 \text{ g dm}^{-3}}{0.02 \text{ g dm}^{-3}} = 70 \quad \frac{5.51 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}}{7.87 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}} = 70 \quad (03+03)$$

06

(iii) ඉහත පරීක්ෂණය 25°C දී, CCl_4 10.0 cm^3 වෙනුවට 20.0 cm^3 යොදා කළේ නම් සමතුලිතතාවයේදී ජල ස්ථරයේ අයඩින් සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.

මෙම අවස්ථාවේදී ජලීය ස්ථරයෙහි අඩංගු I_2 ස්කන්ධය x ලෙස සලකමින්

$$K_D = 70 = \frac{[I_2]_{CCl_4}}{[I_2]_{H_2O}} = \frac{(0.015-x)/20}{x/50} \quad \frac{0.015-x}{20} \times \frac{50}{x} = 70 \quad (05)$$

$$x = 0.0005 \text{ g} \quad (04)$$

$$[I_2]_{H_2O} = \frac{(0.0005 \text{ g})}{50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 0.01 \text{ g dm}^{-3} \quad \frac{0.0005 \text{ g} / 254 \text{ g mol}^{-1}}{50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 3.94 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \quad (03+01)$$

6(c): ලකුණු 35

විකල්ප පිළිතුර:

මෙම අවස්ථාවේදී CCl_4 ස්ථරයෙහි අඩංගු I_2 ස්කන්ධය x ලෙස සලකමින්

$$K_D = 70 = \frac{[I_2]_{CCl_4}}{[I_2]_{H_2O}} = \frac{x/20}{(0.015-x)/50} \quad (05)$$

$$x = 0.0145 \text{ g} \quad (02)$$

$$\text{ජලීය ස්ථරයේ } I_2 \text{ ස්කන්ධය} = 0.0150 - 0.0145 = 0.0005 \text{ g} \quad (02)$$


$$[I_2]_{H_2O} = \frac{(0.0005 \text{ g})}{50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 0.01 \text{ g dm}^{-3} \quad (03+01)$$

- 7.(a) නිෂ්ක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ (උදාහරණ :Pt, ග්‍රැෆයිට්) භාවිත කර විලින $MgCl_2(l)$ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයෙන් Mg ලෝහය නිෂ්සාරණය කළ හැක. මේ සඳහා වූ සරල ඇටවුමක් රූපයේ දක්වා ඇත.

$$E^\circ_{Mg^{2+}(l)/Mg(s)} = -2.37 \text{ V}$$

$$E^\circ_{H_2O(l)/H_2(g)} = -0.63 \text{ V}$$

- (i) ඇනෝඩය හා කැතෝඩය හඳුනාගන්න. එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙහි සිදුවන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.




සටහන : භෞතික අවස්ථා අනිවාර්ය වේ.


ඉලෙක්ට්‍රෝඩය

අර්ධ - ප්‍රතික්‍රියාව

ඇනෝඩය : $C(\text{ග්‍රැෆයිට්}, s) | Cl_2(g) | MgCl_2(l)$




කැතෝඩය: $Pt(s) | Mg(s) | MgCl_2(l)$



- (ii) සම්පූර්ණ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

සම්පූර්ණ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව:



මෙම ප්‍රතික්‍රියා සඳහා $\rightleftharpoons$ ලෙස යොදා දැක්වේ ලදින්න.

- (iii) කෝෂය ක්‍රියා කිරීමේදී ඖහිර පරිපථය තුළින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාව ගලන දිශාව සඳහන් කරන්න.

$C(\text{ග්‍රැෆයිට්}, s) | Cl_2(g) |$ ඇනෝඩයේ සිට $Pt(s) | Mg(s)$ කැතෝඩය දක්වා (05)

- (iv) පහත සඳහන් දෑ පහදන්න.

- මෙම නිෂ්සාරණ ක්‍රියාවලියේදී $MgCl_2(s)$ වෙනුවට විලින $MgCl_2(l)$ භාවිත කෙරේ.
- මෙම නිෂ්සාරණ ක්‍රියාවලියේදී $MgCl_2(aq)$ ද්‍රාවණයක් භාවිත කළ නොහැක.

- ඝණ හෝ ස්ථවික $MgCl_2(s)$ හි සවල අයන නොමැත විලින අවස්ථාවේ

$Mg^{2+}(l)$ සහ $Cl^-(l)$ අයන ඇත. (05)

- $Mg^{2+}(l)$ ඔක්සිහරණය වෙනුවට ජලය ඔක්සිහරණයෙන් $H_2(g)$ ලබා දේ (05)

H/L

- (v) මෙම කෝෂය තුළින් 5.37 A ධාරාවක් පැයක කාලයක් යවා සෑදෙන $\text{Cl}_2(\text{g})$ උෂ්ණත්වය 300 K සහ පීඩනය 1 atm ($\sim 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$) යටතේ එකතු කරගන්නා ලද්දේ නම්, නිපදවෙන $\text{Cl}_2(\text{g})$ හි පරිමාව dm^3 වලින් ගණනය කරන්න. (1 F = 96 500 C)

$$Q = It \quad (05)$$

$$= 5.37 \text{ A} \times (60 \times 60) = 19332 \text{ C} \quad (04+1)$$

$$\text{ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල} = 19332/96500 = 0.2 \text{ mol} \quad (05)$$

$$\text{ඉලෙක්ට්‍රෝන } 2 \text{ mol} \equiv \text{Cl}_2(\text{g}) \text{ } 1 \text{ mol}$$

$$\text{සෑදෙන } \text{Cl}_2(\text{g}) \text{ මවුල} = 0.10 \text{ mol}$$

$$\text{පරිපූර්ණ වායුවක් ලෙස උපකල්පනය කිරීමෙන් : } PV = nRT \quad (05)$$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0.10 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 300 \text{ K}}{1 \times 10^5 \text{ Pa}}$$


$$= 249.4 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ හෝ } 2.49 \text{ dm}^3$$

$$\underline{= 2.50 \text{ dm}^3}$$

$$(04+01)$$

7(a): ලකුණු 75

- (b) (i) P, Q, R, S හා T යනු Co(III) හි සංගත සංයෝග වේ. ඒවාට අන්ධකයක් සහිතව ඇත, පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු විශේෂ කෝෂ ගනිමින් මෙම සංගත සංයෝගයන්හි ව්‍යුහ සූත්‍ර දෙන්න හෝ ව්‍යුහ දෙන්න.



සටහන : ඉහත සංගත සංයෝගවල NO_2^- ලෝහ අයනයට සම්බන්ධ වන විට එක-බන්ධන ලිගන්දයක් ලෙස හැසිරේ.

P - උදාසීන ලිගන් පමණක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත. P හි ජලීය ද්‍රාවණයක් තනුක HCl සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට රතු-දුඹුරු දූෂාරයක් පිට වේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී P, අයන හතරක් දෙයි.

Q - ලිගන් වර්ග දෙකක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත. ඒවා උදාසීන ලිගන් හා එක-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන් වේ. Q හි ජලීය ද්‍රාවණයට $\text{BaCl}_2(\text{aq})$ එක් කළ විට, තනුක අම්ලවල අද්‍රාව්‍ය සුදු අවස්ථපයක් සෑදේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී Q, අයන දෙකක් ලබාදෙයි.

R - ලිගන් වර්ග දෙකක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත. ඒවා උදාසීන ලිගන් හා බහු-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන් වේ. R ප්‍රතික්‍රියාකාරී සමාවස්ථිකතාවය පෙන්වයි. R හි ජලීය ද්‍රාවණයට $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සුදු අවස්ථපයක් සෑදේ. එම අවස්ථපය තනුක NH_4OH හි ද්‍රාව්‍ය වේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී R, අයන දෙකක් ලබාදෙයි.

S - මෙය අධනික නොවන සංයෝගයකි. උදාසීන ලිගන් හා බහු-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන් සමාන ගණනක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත.

T - එක-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන් පමණක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත, ජලීය ද්‍රාවණයේදී T, අයන හතරක් දෙයි.

(i)



* සංකීර්ණ සංයෝග වලට සංකීර්ණ නැවත හෝ දැනගත ලිගන් ගණන ලෙසු ලබා නොගන්න.

* සංකීර්ණ සංයෝග තුළ ලිගන් හෝ දැනගත නැවැත්වා ගන්නා ලිගන් ගණන ලෙසු ලබා නොගන්න.


(7 (b) (i) ලකුණු 50)

(ii) I. T හි IUPAC නාමය ලියන්න.

potassium hexachloridocobaltate(III)

(10)

II. R හි ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකයන්හි ව්‍යුහ අඳින්න.




(05)*

(ව්‍යුහ දෙකම නිවැරදි නම් ලකුණු 05ක්. ව්‍යුහ එකක් පමණක් නිවැරදි නම් ලකුණු 03ක්)

*සටහන : ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව සාමාන්‍යයෙන් උසස් පෙළ වලදී උගන්වනු ලැබුවද, බණ්ඩාරක සංකීර්ණ වලදී සිසුන් ඒවා ගැන හුරුපුරුදු නොවිය හැකිය. එබැවින්, සහනයක් ලෙස, 7 b (i) R සහ (ii) II සඳහා පහත පරිදි ලකුණු ප්‍රදානය කෙරේ.

(i) R: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{SO}_4)]\text{Cl} / [\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4]\text{Cl}$ (06)

(ii) II.



(iii) X යනු අපේක්ෂිත ජ්‍යාමිතියක් සහිත Co(III) හි සංගත සංයෝගයක් වේ. H_2O හා CO_3^{2-} ලෝහ ලෝහ අයනව සංගත වී ඇත. X හි ජලීය ද්‍රාවණයක් $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ සමඟ පිරිසම් කළ විට සාන්ද්‍ර NH_4OH හි ද්‍රාව්‍ය ලා-කත අවක්ෂේපයක් සෑදේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී X, අයන දෙකක් දෙසි. X හි ව්‍යුහ සූත්‍රය දෙන්න හෝ ව්‍යුහය අඳින්න.

සටහන : CO_3^{2-} ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් මගින් ලෝහ අයනව සංගත වේ.


$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{CO}_3)]\text{Br}$ (10)

7(b): ලකුණු 75

C කොටස — රචනා


ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

8. (a) එකම සාධනීය ආරම්භක ද්‍රව්‍යය ලෙස එකතෝල් භාවිත කරමින් V සංයෝගය සෑදීම පිණිස වූ ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමයක් සහන දී ඇත.



P, Q, R, S, T සහ U සංයෝගයන්හි ව්‍යුහ ඇදීමෙන් සහ ප්‍රතික්‍රියා 1 - 6 සඳහා සුදුසු ප්‍රතිකාරක, දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් පමණක් තෝරාගෙන ලිවීමෙන්, ඉහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය සම්පූර්ණ කරන්න.

ප්‍රතිකාරක:
තනුක H_2SO_4 , Mg/වියළි ඊතර, PBr_3 , පිරිසිදු ක්ලෝරොෆෝම (PCC)




*Q හි ව්‍යුහය දී නොමැති නම් හෝ වැරදි නම්, නමුත් එය ප්‍රතිකාරකයක් ලෙස සුදුසු ස්ථානයකදී නිවැරදිව භාවිතා කර ඇත්නම් එක්වරක් පමණක් ලකුණු 06 ක් ප්‍රදානය කරන්න.

සටහන : Q හි ව්‍යුහය දී නොමැති නම් හෝ වැරදි නම්, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය අනුව පිළිතුරෙහි ඉතිරි කොටස සඳහා ලකුණු ලබා දෙන්න.

8(a): ලකුණු 60

(b) (i) පහත දැක්වෙන පරිවර්තනය හතරකට (04) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවකින් සිදු කරන ආකාරය පෙන්වන්න.




** මෙයට දැනට විෂය නිර්දේශයෙහි සහ ගුරු මාර්ගෝපදේශයෙහි සඳහන් නොවන අතර, එය යල් පැන ගිය ක්‍රමයකි. නමුත් සමහර පාසල්වල තවමත් මෙය ඉගැන්වීම සිදු කරන බව පෙනී යයි. මෙය සිසුන්ට සාධාරණයක් කිරීම පිණිස ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටියේ ඇතුළත් කර ඇත.

(ලකුණු 25)

විකල්ප පිළිතුර :


ගුරු මාර්ගෝපදේශයේ බෙන්සින් බෙන්සල්ඩිහයිඩ් බවට පරිවර්තනය කිරීම විෂය නිර්දේශයේ හෝ ගුරු මාර්ගෝපදේශයේ දී නොමැති අතර, සමහර පාසල්වල තවමත් මෙය ඉගැන්වීම සිදු කරන බව පෙනී යයි. එබැවින් සාධාරණයක් සිදුවන පරිදි ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටියෙහි විකල්ප ක්‍රමයක් ලෙස මෙය ඇතුළත් කර ඇත.





(ලකුණු 25)

(ii) දෙකට (02) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවක් භාවිත කරමින් ඇතිලීන්වලින්, c1ccc(cc1)/N=N/c2ccc(O)cc2 සාදාගැනීම සඳහා ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

* NaOH දළ කොළඹ නව පදි
 තුළම පොරොන් 70% දෙන
 මුළු පොරොන් 50% දෙන.



(c) (i) නිරපද්‍රව FeBr_3 හමුවේ දී බෙන්සීන් සහ බ්‍රෝමීන් අතර සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවේ ඵලය සහ යන්ත්‍රණය ලියන්න.




(ලකුණු 26)

(ii) බෙන්සීන් සහ ඇනිලීන්වල සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ අඳින්න.

බෙත්සීන්හි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ



ඇනලීන්හි සම්ප්‍රසූක්ත ව්‍යුහ



* සටහන: එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල දක්වා නොමැති නම්, එක් වරක් පමණක් ලකුණු 02ක් අඩු කරන්න.

(ලකුණු 02 x 7 = ලකුණු 14)


(iii) ඇනලීන්හි බෙන්සීන් න්‍යෂ්ටිය ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා කෙරෙහි බෙන්සීන්වලට වඩා ප්‍රතික්‍රියාශීලී වන්නේ මන්දැයි ඉහත සම්ප්‍රසූක්ත ව්‍යුහ සලකමින් පැහැදිලි කරන්න.

නයිට්‍රජන්(N) පරමාණුවේ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය ඇනලීන් හි බෙන්සීන් වලට විස්ථානගත වීම (ලකුණු 03) හේතුවෙන් ඇනලීන් හි බෙන්සීන් වලට බෙන්සීන් හා සසඳන විට ඉලෙක්ට්‍රෝන චලිත පොහොසත් වේ. (ලකුණු 03)

එබැවින්, ඇනලීන් හි බෙන්සීන් වලට බෙන්සීන් වලට වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝනික කෙරෙහි ප්‍රතික්‍රියාශීලී වේ.

(ලකුණු 06)

(iv) ඇනලීන්, බ්‍රෝමීන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සෑදෙන ඵලයේ ව්‍යුහය අඳින්න.



(ලකුණු 04)

8(c): ලකුණු 50

9. (a)

A₁: CuS _____ (06)

A₂: Cu(OH)₂ _____ (04)

A₃: [Cu(NH₃)₄]²⁺ _____ (04)

A₄: [CuCl₄]²⁻ _____ (04)

B₁: Cr(OH)₃ _____ (06)

B₂: Na₂CrO₄ _____ (04)

B₃: Na₂Cr₂O₇ _____ (04)

CrO₄²⁻ ✓
Cr₂O₇²⁻ ✓

C₁: MnS _____ (06)

C₂: [Mn(H₂O)₆]²⁺ _____ (04) සටහන: Mn²⁺(aq) නම් ලකුණු 02ක් පමණි.

C₃: Mn(OH)₂ _____ (04)

Mn(NO₃)₂ ✓

C₄: [MnCl₄]²⁻ _____ (04)

D₁: CaCO₃ _____ (06)

D₂: CaO _____ (04)

D₃: Ca(OH)₂ _____ (04)

D₄: CaSO₄ _____ (04)

D₅: Ca(HCO₃)₂ _____ (04)

X: CO₂ _____ (03)

(ලකුණු 06 x 4 + ලකුණු 04 x 12 + ලකුණු 03 x 1)


9(a): ලකුණු 75

- (h) අයත් පයිරයිට්වල ඇති ප්‍රධාන සංයෝගය FeS_2 වේ. අයත් පයිරයිට් 1.50 g සාම්පලයක් විද්‍යාගාර තත්ව යටතේ ඔක්සිකරණය කර FeS_2 හි ඇති සල්ෆර් සියල්ල SO_4^{2-} බවට පරිවර්තනය කරන ලදී. මෙහිදී ලැබෙන SO_4^{2-} , BaSO_4 ලෙස අවක්ෂේප කරන ලදී. ලැබුණු BaSO_4 හි වියළි බර 4.66 g විය.

(i) අයත් පයිරයිට්වල ඇති FeS_2 හි බර ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

අයත් පයිරයිට් 20.0 g හි ඇති FeS_2 පාංශු ක්ෂුද්‍රීකරණය මගින් ස්වභාවික තත්ව යටතේ පැය 120 ක් ඔක්සිකරණයට භාජනය කරන ලදී.

මෙම ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව පහත සමීකරණයෙන් නිරූපණය කර ඇත.



පැය 120 කට පසුව මෙම ප්‍රතික්‍රියාවෙන් නිපදවෙන H_2SO_4 ප්‍රමාණාත්මකව වෙන් කරගෙන BaSO_4 ලෙස අවක්ෂේප කරන ලදී. ලැබුණු BaSO_4 හි වියළි බර 31.13 g විය.

$$\text{BaSO}_4 \text{ හි මවුලික ස්කන්ධය} = 137 + 32 + 64 = 233 \text{ g mol}^{-1} \quad (03)$$

$$\text{FeS}_2 \text{ හි මවුලික ස්කන්ධය} = 56 + 64 = 120 \text{ g mol}^{-1} \quad (03)$$

$$\text{BaSO}_4 \text{ හි මවුල} = \frac{4.66}{233} = 0.02 \text{ mol} \quad (03)$$

$$\text{FeS}_2 \text{ හි මවුල 1 ක් BaSO}_4 \text{ හි මවුල 2 ක් ලබා දෙයි} \quad (03)$$

$$\therefore \text{FeS}_2 \text{ හි මවුල} = \frac{0.02}{2} = 0.01 \text{ mol} \quad (03)$$


$$\therefore \text{FeS}_2 \text{ හි බර} = 0.01 \times 120 = 1.20 \text{ g} \quad (03)$$

$$\therefore \text{යකඩ පයිරයිට් වල FeS}_2 \text{ හි බර ප්‍රතිශතය} = \frac{1.20}{1.50} \times 100 \quad (03)$$

$$= 80\% \quad (04)$$

(9b(i): ලකුණු 25)

- (ii) පාංශු ක්ෂුද්‍රීකරණය මගින් පැය 120 කට පසුව අයත් පයිරයිට්හි ඇති FeS_2 , SO_4^{2-} බවට පරිවර්තනය වීමේ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.



$$\text{යකඩ පයිරයිට් 20.0g ක FeS}_2 \text{ ප්‍රමාණය} = 20.0 \times \frac{80}{100} \quad (03)$$

$$= 16.0 \text{ g} \quad (03)$$

BaSO_4 හි සෛධාන්තික ස්කන්ධය ගණනය කිරීම
සමීකරණයට අනුව

$$\text{FeS}_2 \text{ හි මවුල 4 ක් BaSO}_4 \text{ මවුල 8 ක් ලබා දෙයි} \quad (03)$$

$$\therefore \text{FeS}_2 \ 4 \times 120 \text{ g BaSO}_4 \ 8 \times 233 \text{ g ලබා දෙයි} \quad (03)$$

$$\therefore \text{FeS}_2 \ 16 \text{ g BaSO}_4 \ \frac{8 \times 233}{4 \times 120} \times 16 \text{ g ලබා දෙයි} \quad (03)$$

$$\text{BaSO}_4 \text{ හි සෛධාන්තික ස්කන්ධය} = 62.13 \text{ g} \quad (03)$$


$$\text{BaSO}_4 \text{ හි පරීක්ෂණාත්මක ස්කන්ධය} = 31.13 \text{ g}$$

$$\% \text{ පරිවර්තනය} = \frac{31.13}{62.13} \times 100 \quad (03)$$

$$= 50.1\% \quad (04)$$

(9b(ii): ලකුණු 25)

විකල්ප පිළිතුර 01



යකඩ පයිරයිට් 20.0 g ක FeS_2 ස්කන්ධය = $20.0 \times \frac{80}{100}$ (03)
 $= 16.0 \text{ g}$ (03)

BaSO_4 මවුල = $\frac{31.13}{233} \text{ mol}$

H_2SO_4 මවුල = $\frac{31.13}{233} \text{ mol}$ (03)


ප්‍රතික්‍රියා කළ $\text{FeS}_2 = \frac{1}{2} \times \frac{31.13}{233} \text{ mol}$ (03)

පරීක්ෂණාත්මක ප්‍රතික්‍රියා කළ FeS_2 ස්කන්ධය = $\frac{1}{2} \times \frac{31.13}{233} \text{ mol} \times 120 \text{ g mol}^{-1}$ (03)
 $= 8.016 \text{ g}$ (03)

% පරිවර්තනය = $\frac{8.016 \text{ g}}{16 \text{ g}} \times 100\%$ (03)
 $= 50.1\%$ (04)

(9b(ii): ලකුණු 25)

විකල්ප පිළිතුර 02



යකඩ පයිරයිට් 20.0g ක FeS_2 ස්කන්ධය = $20.0 \text{ g} \times \frac{80}{100}$ (03)
 $= 16.0 \text{ g}$ (03)

FeS_2 මවුල = $\frac{16.0}{120} \text{ mol}$ (03)


BaSO_4 හි සෛදාන්තික ස්කන්ධය = $\frac{16}{120} \times 2 \text{ mol} \times 233 \text{ g mol}^{-1}$ (03)
 $= 62.13 \text{ g}$ (03)

BaSO_4 හි පරීක්ෂණාත්මක ස්කන්ධය = 31.13 g (03)

% පරිවර්තනය = $\frac{31.13 \text{ g}}{62.13 \text{ g}} \times 100\%$ (03)
 $= 50.1\%$ (04)

(9b(ii): ලකුණු 25)

විකල්ප පිළිතුර 03



යකඩ පයිරයිට් 20.0g ක FeS_2 ස්කන්ධය = $20.0 \text{ g} \times \frac{80}{100}$ (03)
 $= 16.0 \text{ g}$ (03)

FeS_2 මවුල = $\frac{16.0}{120} \text{ mol}$ (03)

H_2SO_4 හි සෛදාන්තික මවුල = $\frac{16}{120} \times 2 \text{ mol}$

H_2SO_4 හි සෛදාන්තික ස්කන්ධය = $\frac{16}{120} \times 2 \text{ mol} \times 98 \text{ g mol}^{-1}$
 $= 26.13 \text{ g}$ (03)

BaSO_4 මවුල = $\frac{31.13}{233} \text{ mol}$

H_2SO_4 මවුල = $\frac{31.13}{233} \text{ mol}$

H_2SO_4 හි පරීක්ෂණාත්මක ස්කන්ධය = $\frac{31.13}{233} \text{ mol} \times 98 \text{ g mol}^{-1}$ (03)
 $= 13.09 \text{ g}$ (03)

% පරිවර්තනය = $\frac{13.09 \text{ g}}{26.13 \text{ g}} \times 100\%$ (03)
 $= 50.1\%$ (04)

(9b(ii): ලකුණු 25)

- (iii) පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් අයන් පයිරයිට්වල ඇති FeS_2 , SO_4^{2-} බවට පරිවර්තනය වන ප්‍රතිශතය 100% වන විට H_2SO_4 8 kg නිපදවීමට අවශ්‍ය වන අයන් පයිරයිට් ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.
(සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ : O = 16, S = 32, Fe = 56, Ba = 137)

$$\text{H}_2\text{SO}_4 = 8 \text{ kg} = 8000 \text{ g} \quad (03)$$

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ හි මවුලික ස්කන්ධය} = 98 \quad (03)$$

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ හි මවුල} = \frac{8000}{98} \quad (03)$$

පරිවර්තනය 100% නම්

$$\therefore \text{අවශ්‍ය } \text{FeS}_2 \text{ මවුල} = \frac{8000}{98} \times \frac{1}{2} \quad (03)$$

$$= 40.8 \text{ mol} / 40.82 \text{ mol} \quad (03)$$

$$= 40.8 \times 120 \text{ g}$$

$$= 4896 \text{ g} / 4898 \text{ g} / 4898.4 \text{ g} \quad (03)$$

$$\therefore \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ කිලෝග්‍රෑම් 8 ක් නිපදවීමට අවශ්‍ය යකඩ පයිරයිට් ප්‍රමාණය} = \frac{4896}{80} \times 100 \text{ g} \quad (03)$$

$$= 6120 \text{ g}$$

$$= 6.12 \text{ kg} / 6.122 \text{ kg} / 6.123 \text{ kg} \quad (04)$$

(9b(iii)): ලකුණු 25)

10. (a) පහත දී ඇති ප්‍රශ්න සොල්වේ ක්‍රියාවලිය මත පදනම් වේ.

- (i) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන ඵලය කුමක් ද?

Na_2CO_3 / සෝඩියම් කාබනේට් (04)

- (ii) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන අතුරුඵලය කුමක් ද?

CaCl_2 / කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් (04)

වෙලාවේදී ලියා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න.

- (iii) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ යොදාගන්නා අමුද්‍රව්‍යයන් (ආරම්භක ද්‍රව්‍යයන්) මොනවා ද?

NH_3 වායුව, (04)

CO_2 වායුව / CaCO_3 / කැල්සියම් කාබනේට් (04)

මුයින් (මුහුදු ජලයෙන් ලබාගන්නා Ca^{2+} , Mg^{2+} හා SO_4^{2-} ඉවත් කරන ලද පිරිසිදු කළ සාන්ද්‍ර NaCl ද්‍රාවණයයි) (04)

(10a(iii)): ලකුණු 12)

- (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් කුමන අමුද්‍රව්‍යය මෙම ක්‍රියාවලියේදී වැය නොවී, නැවත නැවතත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරෙන්නේ ද?

NH_3 වායුව (04)

වෙලාවේදී ලියා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න.

- (v) අමුද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ මැටි තහඩුවලින් සමන්විත අවටවක් තුළ මිශ්‍ර කරන සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ පළමු පියවර හඳුනාගන්න. මෙය පහළ උෂ්ණත්වයකදී සිදු කරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- ඇමෝනියාකරණය (ප්‍රතිප්‍රවාහ මූලධර්මය භාවිතයෙන් NH_3 වායුව හා මුයින් ද්‍රාවණය මිශ්‍ර කිරීම) — (02)

- ඇමෝනියාකරණය තාපදායක ක්‍රියාවකි. (03)

- උෂ්ණත්වය වැඩි වුවහොත් NH_3 වායුව මුයින් ද්‍රාවණයේ දියවීමේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ. එම නිසා පහළ උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගනී. (03)

හෝ

- NH_3 වායුව දියවීම තාපදායක ($\Delta H < 0$) සහ _____ (01)
 එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය (ΔS) සෘණ වේ. ($\Delta S < 0$) _____ (01)
 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ අනුව, _____ (01)
 ΔS සෘණ වන විට $-T\Delta S$ හි අගය ධන අගයකි. _____ (01)
 උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට හි ΔG හි සෘණ අගය අඩුවේ. _____ (01)
 NH_3 වායුව දියවීමේ කාර්යක්ෂමතාව අඩුවේ. එම නිසා පහළ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම වඩා සුදුසුය. _____ (03)

(vi) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන ඵලයේ භාවිත තුනක් දෙන්න.

- ජලයේ කඩිනමක්වය ඉවත් කිරීමට
- විදුරු කර්මාන්තයේදී භාවිතා කෙරේ.
- කඩදාසි කර්මාන්තයේ දී භාවිතා කෙරේ.
- සබන් හා ක්ෂාලක නිපදවීමේදී ශෝධන ක්‍රියාව වර්ධනය කිරීමට
- ප්‍රබල පිරිසිදු කාරක (රෙදි සෝඩා) ලෙස භාවිතා කිරීම
- CaCl_2 බාහිර ගුණිත.
- *sublimation ද්‍රව්‍ය ලෙස ඉතා භාවිත* (ඕනෑම තුනක් සඳහා ලකුණු 03 x 03 = ලකුණු 09)

(vii) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ආර්ථික ලාභදායීත්වය සඳහා දායක වන හේතු තුනක් දෙන්න.

- NaCl හා CaCO_3 අඩු වියදමකින් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිවීම
- NH_3 වැය නොවන අතර වක්‍රීකරණය මගින් නැවත නැවතත් භාවිතා කළ හැකිවීම
- CO_2 වලින් කොටසක් ද නැවත භාවිතා කළ හැකිවීම
- CaCl_2 ලැබීම (ලකුණු 03 x 03 = ලකුණු 09)

(h) පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශනය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(i) කෘෂිකර්මය ශෝලීය උණුසුමට දායක වේ.

කෘෂිකර්මාන්තයේ දී, N_2O හෝ CH_4 ලබා ගන්නා දූ. හි ජීවීන් සඳහා ලැබේ.

- ශෝලීය උණුසුමට දායක වන N_2O (ලකුණු 02) හා CH_4 (ලකුණු 02) වායු නිපදවයි.
- මෙම වායුන් දෙකම හරිතාගාර වායුන් වේ. *වායු 2න් 1න් පමණක් ලබා දුන් හි* (02)
- මෙම වායුන් හි සාන්ද්‍රණය භහල යාම් ශෝලීය උණුසුමට හේතු වේ. *දිගුකාලීනව වලට* (02)
ලැබේ 1 වැනි පමණක් ලැබේ

N_2O සෑදීම

- පොහොර වශයෙන් පසට එකතු කරන නයිට්‍රජන් සංයෝග මත _____ (02)
- නයිට්‍රිභාරී බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් N_2O නිපදවයි. _____ (02)

CH_4 සෑදීම

- වගුරු බිම් සහ ජලයෙන් යට වූ ප්‍රදේශවල වී වගාව _____ (02)
- කාබනික ද්‍රව්‍ය නිර්වායු විශෝජනය මගින් CH_4 නිපදවීමට හිතකර වේ. _____ (01)
- අවිධිමත් ලෙස බැහැර කරන කාබනික ද්‍රව්‍ය දිරාපත් වීම. _____ (02)
- නිර්වායු විශෝජනයට ලක් වී CH_4 නිපදවයි. _____ (01)
- වමාරා කෘත: හතුන්ගේ (එළදෙනුන්, එළුවන්, බැටළුවන්) බඩවැල්වල කාබනික/සෙලියුලෝස් ද්‍රව්‍ය ජීර්ණයේ දී සිදුවන නිර්වායු තත්වයන් යටතේ බැක්ටීරියා විශෝජනයේදී CH_4 නිපදවයි. _____ (02)

(10b(i): ලකුණු 20)

(ii) යකඩ නිස්සාරණය ගෝලීය උණුසුමට දායක වේ.

යකඩ නිස්සාරණයට අදාළව:

- CO_2 ගෝලීය උණුසුමට දායක වේ
- CO_2 හරිතාගාර වායුවක් වන අතර
- සාන්ද්‍රණය වැඩිවීම ගෝලීය උණුසුමට දායක වේ

CO_2 සෑදීම:

යකඩ නිස්සාරණය සඳහා භාවිතා කරන පොසිල ඉන්ධන සහ කෝක් දහනය කිරීමේදී CO_2 බවට පරිවර්තනය වේ

CaCO_3 හැර විඛණ්ඩනය

(0.2 + 0.2)

(10b(ii): ලකුණු 10)

(iii) ප්‍රවාහනය ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවට දායක වේ.

ඉහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශයේ දී ඇති පාරිසරික ආවරණවලට වගකිව යුතු රසායනික විශේෂය/විශේෂ සෑදෙන්නේ කෙසේදැයි ඔබගේ පිළිතුරෙහි දක්වන්න.

ප්‍රවාහනයට අදාළව:

ප්‍රකාශ රසායනික දූමාරයට දායක වන විශේෂ

NO සහ වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{CH}_3$, $n = 1-4$) (02x2)

- NO සහ වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන සුර්යාලෝකය හමුවේ ප්‍රතික්‍රියා වලට භාජනය වී වාෂ්පශීලී කෙටි දාම ඇල්ඩිහයිඩ් සහ අනෙකුත් විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය (PAN, PBN) නිපදවයි
- වායුගෝලයේ අවලම්බනය වන අංශු නිපදවීම සඳහා ඇල්ඩිහයිඩ් තවදුරටත් බහුඅවයවීකරණය වේ
- මෙම අංශු දූවිලි, ජල වාෂ්ප ආදිය තැන්පත් වීමෙන් විශාල අංශු සෑදිය හැක
- මෙම විශාල අංශු මගින් වායුගෝලයේ පාරදෘශ්‍යතාව/විනිවිදභාවය අඩු කරමින් සුර්ය ආලෝකය ප්‍රතිරණය කළ හැකි අතර පහළ වායුගෝලයේ ඵලදායී මෙන් දිස් වේ

(02 x 8 = 16)

(10b(iii): ලකුණු 20)

10(b): ලකුණු 50

(c) (i) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න විභාකිරී නිෂ්පාදනය මත පදනම් වේ.

I. ස්වභාවික විභාකිරී නිෂ්පාදනයේදී භාවිත කරන ක්‍රියාවලිය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය / ක්ෂුද්‍රජීවී පැසවීම (04)

II. ස්වභාවික විභාකිරීවල අඩංගු ක්‍රියාකාරී රසායනික සංඝටකයේ (active chemical ingredient) නම ලියන්න.

ඇසිටික් අම්ලය / ආහංගායන අම්ලය $*CH_3COOH$ හදුනා ගන්න (04)

III. ස්වභාවික විභාකිරීවල අඩංගු ක්‍රියාකාරී රසායනික සංඝටකය ප්‍රමාණාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීමේදී යොදාගන්නා අනුමාපකය සහ දර්ශකය නම් කරන්න.

අනුමාපකය - NaOH (04)

දර්ශකය - පිනෝල්තලීන් (Phenolphthalein) (04)

IV. ස්වභාවික විභාකිරී සහ කෘත්‍රීම විභාකිරීවල සංයුති අතර වෙනස කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

ස්වභාවික විභාකිරී වල ලවණ, සරල සීනි, එස්ටර් සහ මධ්‍යසාර කුඩා ප්‍රමාණවලින් අඩංගු වේ. (එහි එකතු වන ලවණ, සරල සීනි, එස්ටර් සහ මධ්‍යසාර කුඩා ප්‍රමාණවලින් අඩංගු වේ. (01x4)

කෙසේ වෙතත්, කෘතිම විභාකිරී වල අඩංගු වන්නේ ඇසිටික් අම්ලය පමණි. (02)

(ii) පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ඔබවලින් සහතික කෙරුම් නිස්සාරණය මත පදනම් වේ.

I. සහතික කෙරුම් නිස්සාරණයට භාවිත කළ හැකි ක්‍රම තුනක් නම් කරන්න.

හුමාල ආසවනය
ද්‍රාවක නිස්සාරණය
තෙරපීම

(ලකුණු 04 x 3 = ලකුණු 12)

II. ඉහත ක්‍රමවලින් ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමය යෙදීම මත පදනම් වූ ක්‍රමය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

හුමාල ආසවනය (ලකුණු 04)

III. පහත සඳහන් එක් එක් සහතික කෙරුම් අඩංගු ප්‍රධාන සංයෝගය නම් කරන්න.

- පැඟිරි තෙල් (Citronella oil)
- කුරුඳු මූල තෙල්
- කුරුඳු පත්‍ර තෙල්

පැඟිරි තෙල් - ජෙරනියෝල්
කුරුඳු මූල - කැම්පර්
කුරුඳු කොළ - ඉයුජිනෝල්

(ලකුණු 04 x 3 = ලකුණු 12)

10(c): ලකුණු 50

