




අ.පො.ස (උ.පෙළ) විභාගය - 2013

අැගයිමි වාර්තාව

02 - රසායන විද්‍යාව



පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව,
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව,
ජාතික අැගයිමි හා පරීක්ෂණ සේවාව.

2.1.3 I ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර
01.	5	26.	1
02.	5	27.	2
03.	4	28.	4
04.	3	29.	2
05.	2	30.	3
06.	1	31.	3
07.	4	32.	5
08.	3	33.	1
09.	1	34.	5
10.	2	35.	4
11.	5	36.	4
12.	2	37.	1 සහ 5
13.	5	38.	3
14.	2	39.	3
15.	1	40.	4 සහ 5
16.	4	41.	4
17.	3	42.	2
18.	4	43.	4
19.	5	44.	3
20.	2	45.	1 සහ 2
21.	2	46.	5
22.	2	47.	1
23.	3	48.	සියල්ලම
24.	2	49.	3 සහ 5
25.	1	50.	5

නිවැරදි එක් පිළිතුරකට ලකුණු 02 බැගින් ලකුණු 100කි.

2.1.6 I ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ සමස්ත නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :

පළමු ප්‍රශ්න 30 අතරින් නිවැරදි පිළිතුරු සපයා ඇති, ප්‍රතිශතය 40%ට වඩා අඩු ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව 9කි. 31 - 40 දක්වා ප්‍රශ්න අතරින් නිවැරදි පිළිතුරු සපයා ඇති, ප්‍රතිශතය 40%ට වඩා අඩු ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව 5කි. 41 - 50 දක්වා ප්‍රශ්න අතරින් ප්‍රශ්න 9කට 40%ට වැඩි ප්‍රතිශතයක් නිවැරදි පිළිතුරු සපයා ඇත.

නිවැරදි ව පිළිතුරු සැපයීම 40% හෝ ඊට වඩා අඩු මට්ටමක පැවති ප්‍රශ්න අංක හා ඒවාට අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍ර පහත දැක්වේ.

විෂය ක්ෂේත්‍රය	ප්‍රශ්න අංකය	ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව
භෞතික රසායනය	11, 14, 15, 22, 29, 33, 35, 38, 47	9
සාමාන්‍ය රසායනය	5, 7, 30	3
කාබනික රසායනය	3, 36	2
පරිසර හා කර්මාන්ත රසායනය	34	1

මේ අනුව සිසුන්ට වඩාත් ම අපහසු වී ඇති විෂය ක්ෂේත්‍රය භෞතික රසායනය බව පැහැදිලි ය. මෙයින් ද ප්‍රශ්න අංක 22 හා ප්‍රශ්න අංක 33ට නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමට හැකි වී ඇත්තේ පිළිවෙලින් 23% හා 25% අතර සිසුන් සංඛ්‍යාවකට වන අතර, මෙම ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කොට ඇත්තේ තාප රසායනය හා පරිපූර්ණ වායු සම්බන්ධ භෞතික රසායන විද්‍යාවේ සිද්ධාන්ත ආශ්‍රිතව ය. අදාළ භෞතික විද්‍යාත්මක සංකල්පවලට අදාළ ව ප්‍රශ්නයක ඇතුළත් දත්ත විශ්ලේෂණය කර ගණිතමය සංකේත බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාව සහ පිළිතුර ඉලක්ක කර ගනිමින් එම සංකේත උචිත පරිදි සංකලනය කර ගැනීමේ කුසලතා ප්‍රමාණවත් නොවීම මූලික වශයෙන් මෙයට හේතු වී ඇතැයි පෙනේ.

3 ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි වරණය වන (4) තෝරා ඇති ප්‍රතිශතය 40%කි. (2) වරණය තෝරා ඇති ප්‍රතිශතය 27%කි. මෙම ගැටලුව කාබනික රසායන විද්‍යාවේ IUPAC නාමකරණය මත පදනම් වී ඇත. ඇල්කිල් කාණ්ඩයට අදාළ උපසර්ග නාමයෙන් පසු කෙටි ඉරුක් නොයෙදෙන බව අවධාරණය විය යුතු ය.

4 ප්‍රශ්නයට 43%ක් නිවැරදි පිළිතුරු තෝරා ඇත. ඇසිටයිල් ක්ලෝරයිඩ් සමග පිරියම් කිරීමේ දී -OH කාණ්ඩයක හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව CH_3CO^- කාණ්ඩයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය වන බවත් එනමින් සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 42කින් වැඩි වන බවත් අවබෝධ කර ගැනීම වැඩි දෙනෙකුට අපහසු වී ඇත.

5 ප්‍රශ්නය සාමාන්‍ය රසායනයට අදාළ ප්‍රශ්නයකි. මෙම ප්‍රශ්නයට නිවැරදි වරණය වන (2) තෝරා ඇත්තේ 34%කි. (3) වරණය 33%ක ප්‍රතිශතයක් තෝරා ඇත. මෙම ප්‍රශ්නය ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ක්වොන්ටම් අංකනයට අදාළ වේ. නමුත් පහසුතාව අඩු වීමට හේතුව අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන ලද මෙම විෂය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ ව නිවැරදි අවබෝධයක් සිසුන්ට නොමැති වීමයි. ක්වොන්ටම් අංක කුලක පිළිබඳ සරල අභ්‍යාසවල සිසුවා නිරත කරවීම ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ දී ඉටු විය යුතු ය.

7 ප්‍රශ්නය සාමාන්‍ය රසායනයට අදාළ රසායනික ගණනය කිරීමකි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි වරණය (4) වේ. එම වරණය තෝරා ඇති පිරිස 28%ක් වන අතර, (3) වරණය තෝරා ඇති ශිෂ්‍ය ප්‍රතිශතය 33%කි. අදාළ ගණනය කිරීමේ දී දත්ත නිවැරදි ව ගොනු කර ගැනීමේ දුෂ්කරතාව හේතුවෙන් නිවැරදි වරණය තේරීම අපහසු වී ඇත. මෙබඳු ප්‍රශ්න සඳහා නිවැරදි ප්‍රතිචාරය සෙවීමේ නිවැරදි ක්‍රමය වන්නේ අදාළ ගැටලුව විසඳා පිළිතුර ගැලපීම මිස, තෝරාගත් පිළිතුරකින් ආරම්භ කර එය නිවැරදි දැයි පරීක්ෂා කිරීම නොවන බව සිසුන් අවබෝධ කර ගත යුතු ය.

8 ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර දී ඇති ප්‍රතිශතය 44%කි. ප්‍රතික්‍රියා කරන වායුමය ද්‍රව්‍යවල ආංශික පීඩන ඒවායේ මවුල ප්‍රමාණවලට සමානුපාතික බව ද, ෆ්ලවොරීන් ද්විපරමාණුක බැවින් පරමාණුක අනුපාත සැලකීමේ දී ඊට අදාළ සංඛ්‍යාව දෙගුණයක් විය යුතු බව ද බහුතරයකට ඒත්තු ගොස් නැත.

53%ක් 9 ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වන (1) තෝරා ඇත. 26%ක් ම (3) පිළිතුර තේරීමෙන් ගමා වන්නේ ලෙඩ් ඇසිටේට් කළු පැහැ ගන්නේ නම් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වායුව බව සිසුන් නොදැන සිටීම ය. නොඑසේ නම් සල්ෆයිට් - අම්ල ප්‍රතික්‍රියාවල එල පිළිබඳ ව ඔවුන් නොදැන සිටීම ය. මෙබඳු කරුණු සිසුන් තුළ ධාරණය වන්නේ අදාළ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් අසුරිනි. එහෙයින් හැකි සෑම අවස්ථාවක ම නිර්දේශිත ප්‍රායෝගික කටයුතුවල නිරත කරවීම ගුරුවරුන්ගේ වගකීමයි.

11 ප්‍රශ්නය භෞතික රසායනයට අදාළ ප්‍රශ්නයකි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි වරණය 5 වේ. එම වරණය සඳහා පහසුතාව 27%කි. මෙවැනි ගැටලුවල දී මූලික ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ස්ටොයිකියෝමිතිය සැලකිල්ලට ගත යුතු බව ද ඒ අනුව ආංශික උදාහරණයක් සිදු වී ඇති බව ද වටහා ගැනීමට සිසුන් අපොහොසත් වී ඇති බව පෙනේ. මෙහි දී ඇති වන ප්‍රභේද K_a ආශ්‍රිත සමතුලිතතාවේ පවතින බව පදනම් කොටගෙන ගොඩනගා ගන්නා සම්බන්ධතාව ඇසුරෙන් පිළිතුර පහසුවෙන් ලබාගත හැකි ය. මෙහි මූලික අවබෝධය සිසුන් ලැබිය යුත්තේ ප්‍රතික්‍රියාවල මූලික ස්ටොයිකියෝමිතිය පදනම් කොට ගැටලු විසඳන අවස්ථාවේ දී ය. ස්ටොයිකියෝමිතික අනුපාතය අනුව අඩුවෙන් ඇති ද්‍රව්‍යය සීමාකාරී ප්‍රතික්‍රියකය වන බව හා එලෙසේ ප්‍රමාණය එමගින් තීරණය වන බව සිසුන් අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය ය.

12 ප්‍රශ්නය සඳහා 71%ක් නිවැරදි පිළිතුර (2) තෝරා ගෙන ඇති නමුදු 14%ක ප්‍රතිශතයක් (5) තෝරා ඇත්තේ amine හා ammine අතර වෙනස පිළිබඳ නොදැනුම හෝ අනවධානය නිසා ය. නාමකරණයේ දී ඉතා සියුම් වෙනස්කම් පවා සැලකිල්ලට ගත යුතු බව සිසුන්ට අවධාරණය කළ යුතු ය.

14 ප්‍රශ්නය භෞතික රසායනයට අදාළ වූවකි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි වරණය 2 වන අතර පහසුතාව 34%කි. මෙම ප්‍රශ්නය පදනම් වී ඇත්තේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව හා පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය සංකල්පය කර නව සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගීම මත ය. මෙහි දී කාලයත් සමග ප්‍රතික්‍රියක මවුල ප්‍රමාණය වෙනස් වන බව ද, වේග සමීකරණය සඳහා අදාළ වන්නේ t කාලයේ දී පවත්නා නව සාන්ද්‍රණ බව ද ශීඝ්‍රතාව අවබෝධ කරගත යුතු වේ. තව ද පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය භාවිතයේ දී එහි n වලින් සංකේතවත් වනුයේ වායුමය මිශ්‍රණයේ මුළු වායු මවුල ප්‍රමාණය බව ද අවධාරණය විය යුතු ය. මෙම ප්‍රශ්නයේ t කාලයේ දී ප්‍රතික්‍රියා වූ A මවුල ප්‍රමාණය x ලෙස ගත් විට $Q = k \left(\frac{n-x}{v} \right) \left(\frac{n-x}{v} \right)$ බවත්, එමගින් මිශ්‍රණයේ මුළු වායු මවුල ප්‍රමාණය නිර්ණය කළ හැකි බවත් අවබෝධ කර ගත යුතු අතර පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය භාවිතයෙන් P නිර්ණය කළ හැකි වේ. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ දී මූලික සමීකරණ ඇසුරින් නව සම්බන්ධතා ගොඩ නැගීම පිළිබඳ නිපුණතා ප්‍රගුණ කළ යුතු ය.

15 වන ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 38%කි. භෞතික රසායනයට අදාළ මේ ප්‍රශ්නයට පදනම් වී ඇති සංකල්ප වනුයේ රළුම නියමය හා ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමයයි. දී ඇති දත්ත, යට කී නියමවලට අදාළ ගණිතමය ප්‍රකාශන ලෙස ලියූ විට පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා ලැබෙන බව ගැටලුව විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනාවරණය කර ගැනීමට සිසුන් අපොහොසත් වී ඇති බව පෙනේ.

$$\begin{aligned} P_T &= P_A^\circ \times 0.2 + P_B^\circ \times 0.8 & \text{----- (1)} \\ 2P_T &= P_A^\circ \times 0.6 + P_B^\circ \times 0.4 & \text{----- (2)} \end{aligned}$$

භෞතික රසායනයේ ගැටලු විසඳීමේ දී අදාළ විද්‍යාත්මක සංකල්ප නිවැරදි ව හඳුනා ගැනීමේ හා දත්ත විශ්ලේෂණය කර විසඳුමට තුඩු දෙන සම්බන්ධතා ගණිත සමීකරණ ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාව මෙහි ලා යළියළින් අවධාරණය කෙරේ.

17 වන ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුර 3 වන අතර, ඊට 42% ක් නිවැරදිව පිළිතුරු සපයන විට 30%ක් 4 වරණය තෝරා ඇත්තේ $LiAlH_4$ වල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් නොමැති බැවිනි. එබැවින් ප්‍රතිකාරක සහ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩවල ප්‍රතික්‍රියා පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

50%ක් 19 ප්‍රශ්නයට නිවැරදි වරණය වන 5 තෝරා ඇත්තේ, 25%ක් ම 4 විකේෂ්පය තේරීමෙන් පෙනී යන්නේ ඔවුන් කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් ජල විච්ඡේදනය වී කෂාරීය ද්‍රාවණයක් ලැබෙනැයි සිතන බව ය. ලවණයක් ව්‍යුත්පන්න වන අම්ලයේ හා හස්මයේ ස්වභාවය ඇසුරින් ලවණයේ ගුණ අපෝහනය කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය විය යුතු බව මෙයින් පෙනී යන්නේ ය.

22 වන ප්‍රශ්නය භෞතික රසායනයට අදාළ වේ. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි වරණය 2 වේ. නිවැරදි පිළිතුරු තෝරා පිරිස 25%කි. නමුත් 3 වරණය අයදුම්කරුවන්ගෙන් 42%ක් තෝරා ගෙන ඇත. වායු අණු සංඛ්‍යාව අඩු වන විට එන්ට්‍රොපිය අඩු වන බව තේරුම් ගැනීමට සිසුන් අපොහොසත් වී ඇත. තාපගතික ගුණ වන එන්තැල්පිය, එන්ට්‍රොපිය හා ගිබ්ස් ශක්තිය දෙන ලද විපර්යාසයක් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ව තර්කානුකූල ව යෙදීමේ හැකියාව මඳ බව පෙනේ. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ දී, දී ඇති උෂ්ණත්වයක දී යම් රසායනික විපර්යාසයක් සඳහා ΔH , ΔS හා ΔG විචලනය වන ආකාරය අන්තර්ගත අභ්‍යාසවල සිසුන් නිරත කළ යුතු ය.

23 වන ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර වන 3 වරණය තෝරා ඇති ප්‍රතිශතය 43%කි. මෙහි දී 20%ක්ම 1 වන වරණය තෝරා ඇත්තේ වික්‍රිය වන ස්ථානයට ආදේශය සිදු වේ යන වැරදි අවබෝධයෙනි.

25 වන ප්‍රශ්නයට 46%ක පිරිසක් නිවැරදි වරණය වන (1) තෝරා ඇත. පහසු ප්‍රශ්නයක් වුව ද 23%ක් ම (2) නිවැරදි සේ සලකා ඇත. මෙයට හේතුව, විශාලතම ශක්ති පරතරය සක්‍රියත ශක්තිය ලෙස වරදවා වටහා ගැනීම හෝ විමසා ඇත්තේ ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ සක්‍රියත ශක්තිය බව සැලකිල්ලට නොගැනීම විය හැකි ය.

29 වන ප්‍රශ්නය භෞතික රසායනය යටතේ වුවකි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි වරණය 2 වන අතර, 36%ක් නිවැරදි පිළිතුරු තෝරා ඇත. නමුත් අයදුම්කරුවන්ගෙන් 32%ක් 3 වරණය තෝරා ඇත. මෙය විද්‍යුත් විච්ඡේදනය පදනම් වූ පහසු ප්‍රශ්නයකි. අදාළ අයනයේ (Cu^{2+}) ආරෝපණය පිළිබඳ ව අවධානය යොමු නොකිරීම, සිසුන් 3 වරණය තේරීමට හේතු වී ඇත. විද්‍යුත් ප්‍රමාණය හා විසර්ජනය වන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අතර සම්බන්ධය, අර්ධ සමීකරණ ඇසුරින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය විය යුතු ය. වර්තමානයේ දී හුදෙක් ඓතිහාසික වටිනාකමකින් පමණක් යුත් ෆැරඩේ නියම මෙබඳු ගණන සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

30 ගණිතමය පියවර කිහිපයකින් සමන්විත ප්‍රශ්නයකි. අදාළ ස්ටොයිකියොමිතික සම්බන්ධතා භාවිත කර සංඛ්‍යාත්මක ගැටලුව විසඳීමත්, ලැබෙන පිළිතුර දී ඇති පිළිතුරු හා සැසඳීමත් මෙබඳු ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු දීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගය වේ.

33 වන ප්‍රශ්නය භෞතික රසායනයට අදාළ වූවකි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි වරණය 1 වන අතර, 23%ක පිරිසක් නිවැරදි පිළිතුරු තෝරා ඇත. අයදුම්කරුවන්ගෙන් 60%ක් 5 වරණය තෝරා ඇත. මෙය කලාප සමතුලිතතාව පිළිබඳ පහසු ප්‍රශ්නයක් වුව ද ප්‍රස්තාරයේ අක්ෂ හඳුන්වා ඇති ආකාරය පිළිබඳ ව අවධානය යොමු නොකිරීමත්, මෙය උෂ්ණත්ව-සංයුති ප්‍රස්තාරයක් සේ වරදවා වටහා ගැනීමත්, වැරදි වරණයකට යැමට හේතු වී ඇත.

34 වැනි ප්‍රශ්නය කර්මාන්ත රසායනය හා අදාළ වේ. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර 5 වන අතර, එහි පහසුතාව 33%කි. 31%ක් 4 වන වරණය තෝරා ඇත. මෙහි (a) ප්‍රකාශය පමණක් නිවැරදි ය. (d) ප්‍රකාශය කියවා තේරුම් ගැනීමේ දී ප්‍රතික්‍රියකය වන ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් හි >C=O කොටස පිළිබඳ ව සිතියට නැගේ. නමුත් ප්‍රශ්නය විමසා ඇත්තේ බහුඅවයවයක සම්බන්ධවයි. ෆීනෝල් ෆෝමැල්ඩිහයිඩ්හි දී >C=O කාණ්ඩය සංඝනන ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගි වීමෙන් ඉවත් වන නිසා බහුඅවයවයකයෙහි $\begin{matrix} \text{O} \\ || \\ \text{C} \end{matrix}$ කාණ්ඩය අඩංගු නොවේ. එබැවින් (d) ප්‍රකාශය වැරදි ය. කළ යුත්තේ සමස්ත ප්‍රශ්නය හොඳින් කියවා තේරුම් ගනිමින් හා එම වචන විශ්ලේෂණය කරමින් ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සෙවීමයි.

35 වැනි ප්‍රශ්නය භෞතික රසායනයට සම්බන්ධ වූවකි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි වරණය 4 වේ. එනම් 'a' හා 'd' නිවැරදි ප්‍රකාශ වේ. එම වරණය අයදුම්කරුවන්ගෙන් 37%ක් තෝරා ඇත. 29%ක් 5 වරණය තෝරා ඇත. මෙම ප්‍රශ්නය ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව හා සම්බන්ධ වේ. උත්ප්‍රේරකයක් යැයි ස්ථීර ව නොදන්නා x හි පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලයේ වැඩි වීම ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව ද අනිවාර්යයෙන් වැඩි කරනැයි වරදවා වටහා ගැනීම (c) වරණය සැලකිය යුතු පිරිසක් විසින් නිවැරදි ලෙස සලකනු ලැබීමට හේතු වී ඇත. මේ නිසා ප්‍රශ්නයට නිවැරදි වරණය තේරීම අපහසු වී ඇත.

36 වැනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමේ දී 32% නිවැරදි පිළිතුර වන (4) වරණය තෝරා ඇති අතර, 29%ක් (5) වන වරණය තෝරා ඇත. සිසුන් 29%ක් වැරදි පිළිතුරක් තෝරා ඇත්තේ ආම්ලික හෝ භාස්මික මාධ්‍ය යන දෙකේදී ම ෆීනෝල්, ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් සමඟ ක්‍රියා කරන බව නොදැන සිටීම නිසා ය. එබැවින් ෆීනෝල් ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරක අවධාරණය කළ යුතු වේ.

37 ප්‍රශ්නයේ (3) හා (4) වරණ ද 19%ක් විසින් නිවැරදි සේ සැලකීමෙන් පෙනී යන්නේ සංයෝගයේ බ්‍රෝමීන් පරමාණුව -OH කාණ්ඩයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය වූ විට ලැබෙන සංයෝගය ද ප්‍රකාශ සක්‍රිය බව සිසුන් තේරුම් ගෙන නොමැති බවයි. තව ද දෙන ලද සංයෝගය මද්‍යසාරීය KOH සමඟ පිරියම් කළ විට දී ලැබෙන ඵලය නිර්ණය කිරීමට හෝ එහි ත්‍රිමාන සමාවයවිකතාව ගැන අවබෝධ කර ගැනීමට අපහසුතාවක් ඇති බව පෙනේ. සිසුන් (3) හෝ (4) වරණ තේරීමෙන් පෙනී යන්නේ, ඔවුන්ට ප්‍රකාශ සක්‍රියතාව යන සංකල්පය හරිහැටි අවබෝධ වී නොමැති බවයි.

38 ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර තේරීමට සමත් වී ඇත්තේ 31%ක් පමණි. T උෂ්ණත්වය වෙනස් කිරීමෙන් දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා සියල්ල වුව ස්වයංසිද්ධ කළ හැකි වුවත් ප්‍රශ්නය T උෂ්ණත්වයට පමණක් අදාළ වේ. මේ පිළිබඳ අනවධානය සාවද්‍ය වික්ෂේප තේරීමට සිසුන් යොමු කර ඇත.

42 වැනි ප්‍රශ්නයට 42%ක් නිවැරදි පිළිතුර තෝරා ඇත. 24%ක් 1 ප්‍රතිචාරය තේරීමෙන් පෙනී යන්නේ අපේක්ෂකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු පිරිසකට බියුටනෝන්වල අන්තර්අණුක බල වඩා ප්‍රබල වීමට හේතුව පැහැදිලි ව අවබෝධ වී නොමැති බවයි. ද්‍රව්‍ය අණුවල ව්‍යුහමය ලක්ෂණ අන්තර්අණුක බල කෙරෙහි බලපාන ආකාරය නිදසුන් ඇසුරින් සාකච්ඡා කිරීම මෙබඳු දුර්වලතා මඟහරවා ගැනීම සඳහා යෝජනා කෙරේ.

43 වැනි ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුර ලෙස 1 හා 2 පිළිවෙළින් 18% හා 13% තෝරා ඇති අතර, ඔවුන් ප්‍රාථමික හා තෘතීයික මද්‍යසාර හා සාන්ද්‍ර HCl / ZnCl₂ අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා නොමැත. තව ද මෙම ප්‍රතික්‍රියාවල වේගවල වෙනසට හේතුව ද සිසුන්ට අවධාරණය කළ යුතු වේ.

46 ප්‍රශ්නයට බහුතරයක් (42%) නිවැරදි ප්‍රතිචාරය තෝරා ඇතත්, 26%ක් 4 ප්‍රතිචාරය තේරීමෙන් පෙනී යන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහවල ද්විත්ව බන්ධන සංඛ්‍යාව සමාන වෙනැයි ඔවුන් සිතන බවකි. මෙහි සාවද්‍යතාව සිසුන්ට පහදා දිය යුතු අතර සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහවල තිබිය යුතු අනිචාර්ය සමානකම් ඔවුන්ට පහදා දිය යුතු ය.

'මූලික ප්‍රතික්‍රියාව' යන්න සැලකිල්ලට නොගැනීමෙන් සැලකිය යුතු පිරිසක් 47 ප්‍රශ්නයේ දෙවැනි ප්‍රකාශය අසත්‍ය සේ සලකා ඇත.

50 ප්‍රශ්නය හුදු දැනුම පදනම් වූ සරල ප්‍රශ්නයක් වුව ද 28%ක් ම 2 නිවැරදි පිළිතුරක් සේ ගෙන ඇත්තේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හා කාබන් මොනොක්සයිඩ් අතර වෙනස සැලකිල්ලට නොගැනීමෙනි.

2.2.3. II ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය සහ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා

★ II පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ප්‍රස්තාර 2, 3, 4.1, 4.2. හා 4.3 ඇසුරෙන් සකස් කර ඇත.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

ප්‍රශ්න හතරට ම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 10 කි.)

1. (a) වරහන් තුළ දී ඇති ගුණය වැඩි වන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. හේතු අවශ්‍ය නොවේ.

(i) CO, CO₂, CO₃²⁻ (C—O බන්ධන දුර)



(ii) NO₂⁺, NO₃⁻, NH₃ (N පරමාණුවෙහි විද්‍යුත් සෘණතාව)



(iii) BeSO₄, MgSO₄, CaSO₄ (වියෝජන උෂ්ණත්වය, MSO₄ → MO + SO₃, M = ලෝහය)



(iv) Ne, Ar, Kr (තාපාංකය)



(v) S, F, Si, Cl (පරමාණුක අරය)




(05 × 5 = ලකුණු 25)

(01 (a) සඳහා ලකුණු 25)

(b) නයිට්‍රොසිඩ් (H₂N—NO₂) දුබල අම්ලයකි. හෂ්මයක් හමුවේ දී එය N₂O සහ H₂O බවට වියෝජනය වේ. නයිට්‍රොසිඩ් මත සදනම් වී ඇති (i) සිට (v) කොටස්වලට පිළිතුරු සපයන්න. එහි සැකිල්ල පහත දී ඇත.




(i) මෙම අණුව සඳහා චඩාත්ම පිළිගත හැකි ලූටස් ව්‍යුහය අඳින්න.



(ලකුණු 10)

(ii) මෙම අණුව සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ අඳින්න. හේතු දක්වමින්, ඒවායේ ස්ථායීතා පිළිබඳ අදහස් දක්වන්න.



A ස්ථායී (01) හේතුව : එක ළඟ පරමාණු මත විරුද්ධ ආරෝපණ ඇත. (01) වඩා විද්‍යුත් සෘණ ඔක්සිජන් මත සෘණ ආරෝපණයක් ඇත. (01)
B ස්ථායී (01) එක ළඟ පරමාණු මත විරුද්ධ ආරෝපණ ඇත. (01) වඩා විද්‍යුත් සෘණ ඔක්සිජන් මත සෘණ ආරෝපණයක් ඇත. (01)
C අස්ථායී (01) එක ළඟ පරමාණු මත ධන ආරෝපණ දෙකක් ඇත. (02)

(ලකුණු 21)


(i) හි අදින ලද ව්‍යුහය නිවැරදි නොවේ නම්, (iii) (iv) හා (v) කොටස් සඳහා ලකුණු හිමි නොවේ.

- (iii) පහත දී ඇති වගුවෙහි දක්වා ඇති
 I. පරමාණු වටා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලවල සැකසුම)
 II. පරමාණු වටා ඇති හැඩය
 III. පරමාණුවල මුහුම්කරණය
 සඳහන් කරන්න.

	H පරමාණු දෙකකට බැඳුණු N	O පරමාණු දෙකකට බැඳුණු N	
i. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය	වතුස්තලය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	(03 + 03)
ii. හැඩය	පිරමීඩය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	(03 + 03)
iii. මුහුම්කරණය	sp^3	sp^2	(03 + 03)

(iv) මෙම අණුව ප්‍රැවීය ද නැතහොත් නිර්ප්‍රැවීය ද..... ධ්‍රැවීය (ලකුණු 04)

(v) ඉහත (i) කොටසෙහි අදිත ලද ලුවීස් ව්‍යුහයෙහි පහත දක්වා ඇති බන්ධන සෑදීම සඳහා සහභාගී වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනා ගන්න. පහත දැක්වෙන පරිදි N පරමාණු 1 සහ 2 ලෙස නම් කර ඇත.



I. N^1 සහ N^2 sp^3 (මුහුම් කාක්ෂික) + sp^2 (මුහුම් කාක්ෂික) (03 + 03)

II. N^1 සහ H sp^3 (මුහුම් කාක්ෂික) + $1s$ (මුහුම් කාක්ෂික) (03 + 03)

සටහන : කාක්ෂික වර්ගය සඳහන් කිරීම අවශ්‍ය නැත. H සඳහා $1s$ ලෙස සඳහන් කර ඇත්නම් පමණක් පිළිගත හැකි ය.

(c) Xe, CH_3Cl , HF

ඉහත දක්වා ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින්, කුමන එක / ඒවාට, පහත දක්වා ඇති බල තිබේ ද?

(i) ද්විධ්‍රැව-ද්විධ්‍රැව බල CH_3Cl , HF (02 + 02)

(ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල HF (02)

(iii) ලන්ඩන් අසකිරණ බල Xe, CH_3Cl , HF (මින්ෆ් ම අනුපිළිවෙළකට) (02 + 01 + 01)


(01 (c) සඳහා ලකුණු 10)

(1 සඳහා මුළු ලකුණු 100)


02 ප්‍රශ්නය

2. (a) A මූලද්‍රව්‍යය s-ගොනුවට අයත් වේ. එහි පළමු අයනීකරණ ශක්තිය කාණ්ඩයේ වැඩි ම වේ. ජලය සමඟ A ප්‍රතික්‍රියා කර B වායුව මුදා හරියි. මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ දී සෑදෙන ද්‍රාවණය බන්සන් දල්ලකට රතු පැහැයක් ලබා දෙන අතර වාෂ්ප කිරීමේ දී ලෝහ ඔක්සයිඩය ලබා දෙයි. N₂(g) සමඟ A ප්‍රතික්‍රියා කර C සංයෝගය ලබා දෙයි. A, H₂(g) සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවේ දී ලවණ-ආකාර භාෂ්මක D සංයෝගය ලබා දෙයි. ජලය සමඟ පිරියම් (treat) කළ විට C රතු ලිට්මස් තිල් පැහැ ගන්වන E වායුවක් ලබා දෙයි.

(i) රසායනික සූත්‍ර දෙමින් A, B, C, D සහ E හඳුනාගන්න.



(ii) ඉහත විස්තර කර ඇති ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුළිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න.




(03 x 5 = ලකුණු 15)

(02 (a) සඳහා ලකුණු 30)


* සටහන :- 2(a) (i) හි A සඳහා පිළිතුර වැරදි නම් B, C, D, E සඳහා ද ලකුණු නොලැබේ.

(b) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න V සහ Cr නම් ආන්තරික ලෝහ සහ ඒවායෙහි සංයෝග මත පදනම් වී ඇත.


(i) V හි හුම් අවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය දෙන්න.



(ii) V හි ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථා සඳහන් කරන්න.



(iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථාවල දී V සාදන ඔක්සයිඩවල රසායනික සූත්‍ර දෙන්න. මෙම එක් එක් ඔක්සයිඩය ආම්ලික ද, උභයගුණී ද, භාෂ්මික ද යන වග දක්වන්න.



(02 x 8 = ලකුණු 16)

(iv) V මගින් සාදන ඔක්සොකැටායන දෙකක රසායනික සූත්‍ර දෙන්න. ආම්ලික ජලීය මාධ්‍යයේ දී මේවායෙහි වර්ණ සඳහන් කරන්න.



(01 x 4 = ලකුණු 04)

(v) ජලීය ද්‍රාවණයක දී ක්‍රෝමියම් මගින් සාදනු ලබන සරලම අයනය කුමක් ද? එහි වර්ණය සඳහන් කරන්න. මෙම අයනයෙහි ජලීය ද්‍රාවණයකට ඝන Na_2CO_3 එක් කළ විට, ඔබ නිරීක්ෂණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක් දැයි පුරෝකථනය කරන්න.

$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ - දම්/ නිල් දම් හෝ $\text{Cr}^{3+}(\text{aq})$ හෝ Cr^{3+} - කොළ / නිල් දම්

(04 + 4 = ලකුණු 08)

CO_2 මුක්ත වේ හෝ බුබුළු නිකුත් වේ හෝ කොළ අවක්ෂේපයක් / කොළ පැහැ ද්‍රාවණයක්

(ලකුණු 04)

සටහන : විශේෂය වැරදි නම් වර්ණය සඳහා ලකුණු නොලැබේ.

(vi) V ලෝහයෙහි එක් ප්‍රයෝජනයක් දෙන්න.

වානේහි මිශ්‍ර ලෝහයක් ලෙස හෝ මිශ්‍ර ලෝහවල සංඝටකයක් හෝ උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස (V_2O_5 පිළිගත හැකි ය.), ගුවන් යානා සෑදීමට

(ලකුණු 04)

(vii) CrCl_3 හි කොළ පැහැති ජලීය ද්‍රාවණයකට පහත සඳහන් දෑ සිඳු කළ විට ඔබට නිරීක්ෂණය කළ හැක්කේ කුමක් ද?

I. තනුක NaOH බීදු කිහිපයක් එක් කළ විට

කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක්

(ලකුණු 03)



II. වැඩිපුර තනුක NaOH සහ ඉන්පසු H_2O_2 එක් කර රත් කළ විට

කහ පැහැති ද්‍රාවණයක්

(ලකුණු 03)

(viii) සාන්ද්‍ර $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ද්‍රාවණයක් සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමග පිරියම් (treat) කළ විට ක්‍රෝමියම්හි දීප්තිමත් රතු ආම්ලික ඔක්සයිඩය X අවක්ෂේප වේ. X රත් කිරීමේ දී, කොළ පැහැති උභයගුණි ඔක්සයිඩය, Y ලැබේ. $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ රත් කළ විට ද, Y ලබා ගත හැකි ය.

X සහ Y හි රසායනික සූත්‍ර දෙන්න.



(03 + 3 = ලකුණු 06)

(ix) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ද්‍රාවණයකට තනුක NaOH එක් කළ විට ඔබට කුමක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි ද?

ද්‍රාවණය කහ පැහැති වේ හෝ තැඹිලි පැහැති ද්‍රාවණය කහ පැහැයට හැරේ.

(ලකුණු 03)

(x) අනුමාපන සඳහා $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ භාවිත කිරීමේ දී ලැබෙන එක් වාසියක් සහ එක් අවාසියක් දෙන්න.

වාසිය :- ප්‍රාථමික ප්‍රාමණිකයකි. හෝ ක්ලෝරයිඩ් අයන හමුවේ අනුමාපනය කළ හැකි ය.

(ලකුණු 03)

අවාසිය :- අන්ත ලක්ෂ්‍යයේ දී වර්ණ විපර්යාසය නිරීක්ෂණය කිරීමට අපහසු වේ හෝ එය ස්වයං දර්ශකයක් (self-indicator) නොවේ.

(ලකුණු 03)

(2 (b) සඳහා ලකුණු 70)

(2 සඳහා මුළු ලකුණු 100)

03 ප්‍රශ්නය




3. $M^{2+}(aq)$ ලෝහ අයනය $M^{3+}(aq)$ බවට ඔක්සිකරණය කිරීම සඳහා ක්ලෝරීන් වායුව ඔක්සිකාරකයක් ලෙස යොදා ගනී. පහත දත්ත සපයා ඇත.

ප්‍රතික්‍රියාව	25°C හිදී සම්මත එන්තැල්පි වෙනස ΔH° (kJ mol ⁻¹)
$M(s) \longrightarrow M^+(aq) + e$	- 32.5
$M(s) \longrightarrow M^{2+}(aq) + 2e$	- 48.5
$M(s) \longrightarrow M^{3+}(aq) + 3e$	- 82.5
$Cl_2(g) + 2e \longrightarrow 2Cl^-(aq)$	-334.0


$E^\circ_{M^{3+}/M^{2+}} = +0.77 \text{ V}$ $E^\circ_{Cl_2/Cl^-} = +1.36 \text{ V}$

ඉහත ඔක්සිකරණය විද්‍යුත් රසායනිකව සිදු කරනු ලැබේ.

(i) ඔක්සිකරණ හා ඔක්සිහරණ ක්‍රියාවලි සඳහා අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා ලියා දක්වා තෝරා ප්‍රතික්‍රියාව ව්‍යුත්පන්න කරන්න.



(ii) ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවෙහි E°_{cell} අගය මැනීම සඳහා අවශ්‍ය පරීක්ෂණාත්මක ඇවුලුම පහත රූපයෙහි දැක් වේ. අදාළ අවස්ථාවල දී ගෞතික අවස්ථාව, සාන්ද්‍රණය / පීඩනය සඳහන් කරමින් A සිට E හඳුනා ගන්න.



A : $Cl_2(g, 1 \text{ atm})$

B : ලවණ සේතුව

C : වෝල්ට්මීටරය (විභවමානය)

D : $Cl^-(aq, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})$

E : $M^{2+}(aq, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})$ සහ $M^{3+}(aq, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})$ මිශ්‍රණය

(05 x 5 = ලකුණු 25)

(iii) ඉහත කෝෂය සඳහා E_{cell}° ගණනය කරන්න.

$$E_{cell}^{\circ} = E_{Cl_2/Cl^-}^{\circ} - E_{M^{3+}/M^{2+}}^{\circ} \quad \text{හෝ} \quad E_{cell}^{\circ} = E_{cathode}^{\circ} - E_{anode}^{\circ}$$


$$\text{හෝ} \quad E_{cell}^{\circ} = E_{RHS}^{\circ} - E_{LHS}^{\circ} \quad (05)$$

$$\text{හෝ} \quad 1.36 \text{ V} - 0.77 \text{ V}$$

$$= 0.59 \text{ V}$$

(04 + 01)

(iv) (i) කොටසෙහි දී ඇති කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා 25°C හිදී සම්මත එන්තැල්පි වෙනස (ΔH°) ගණනය කරන්න.



සටහන : තාප රසායනික චක්‍රය දක්වා නැති නමුත් (eq - 1) හි ගණනය නිවැරදි නම් ලකුණු (18 + 03) ප්‍රදානය කරන්න.

$$\Delta H^{\circ} = 2 \times (-82.5 \text{ kJ mol}^{-1}) - 2 \times (-48.5 \text{ kJ mol}^{-1}) + (-334 \text{ kJ mol}^{-1}) \quad (\text{eq} - 1)$$

$$\Delta H^{\circ} = -402 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (03 + 01)$$

(v) කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සම්මත ගිබ්ස් ශක්ති වෙනස, ΔG° සහ E_{cell}° අතර සම්බන්ධය

$$\Delta G^{\circ} = -k E_{cell}^{\circ} \quad \text{මගින් දෙනු ලැබේ.}$$

මෙහි $k = 1.93 \times 10^5 \text{ J mol}^{-1} \text{ V}^{-1}$ වේ.

ඉහත කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා, 25°C හිදී සම්මත ගිබ්ස් ශක්ති වෙනස (ΔG°) ගණනය කරන්න.

$$\Delta G^{\circ} = -k E_{cell}^{\circ}$$

$$= -1.93 \times 10^5 (\text{J mol}^{-1} \text{ v}^{-1}) \times 0.59 (\text{V}) \quad (04 + 01)$$

$$= -113.87 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (04 + 01)$$

(vi) ඉහත කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා, 25°C හිදී සම්මත එන්තැල්පි වෙනස (ΔS°) ගණනය කරන්න.

$$\Delta G^{\circ} = \Delta H^{\circ} - T\Delta S^{\circ} \quad (\text{සම්මත අවස්ථා දක්වා නැත්නම් ලකුණු නොලැබේ.}) \quad (05)$$

$$-113.87 \text{ kJ mol}^{-1} = -402 (\text{kJ mol}^{-1}) - 298 (\text{K}) \Delta S^{\circ} \quad (04 + 01)$$

$$\Delta S^{\circ} = 288 \text{ kJ mol}^{-1} / (-298 \text{ K})$$



$$\Delta S^{\circ} = 0.97 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad (04 + 01)$$

(3 සඳහා මුළු ලකුණු 100)

04 ප්‍රශ්නය

4. (a) (i) A සංයෝගය ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය පෙන්වුම් කරන අතර එහි අණුක සූත්‍රය C₇H₁₆ වේ.

I. පහත දී ඇති කොටු තුළ A වලට තිබිය හැකි එකිනෙකට ප්‍රතිරූප අවයව නොවන ව්‍යුහ දෙකක් අඳින්න.



(10 + 10)


II. ඔබ අඳින ලද ව්‍යුහ දෙක අතර සමාවයවික සම්බන්ධතාවය සඳහන් කරන්න.

ව්‍යුහ සමාවයවික හෝ Constitutional සමාවයවික හෝ දෘම සමාවයවික


(03)

(ii) B හා C යනු ප්‍රකාශ අක්‍රිය, අණුක සූත්‍රය C₇H₁₄ වන සංයෝග වේ. B හා C යන දෙක ම ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. B හා C එකිනෙකෙහි ජ්‍යාමිතික සමාවයවික නොවේ. B හෝ C හි උත්ප්‍රේරක හයිඩ්‍රජනීකරනයෙන් එක ම A සංයෝගය ලැබේ.


I. A, B හා C වල ව්‍යුහයන් පහත සඳහන් කොටු තුළ අඳින්න. (ත්‍රිමාන සමාවයවික ආකාර ඇඳ දක්වීම අවශ්‍ය නැත.)



A



B



C

(10 + 10 + 10)

II. B හා C වල IUPAC නම් ලියන්න.

B : 3-methyl-2-hexene or 3-methylhex-2-ene (01)


C : 3-methyl-3-hexene (01)

(4 (a) සඳහා ලකුණු 55)


(b) පහත සඳහන් ප්‍රතික්‍රියා අනුපිළිවෙළ සලකන්න.




(i) P, Q, R හා S වල ව්‍යුහයන් පහත සඳහන් කොටුවල අඳින්න.




P



Q



R



S


(03 × 4)

(ii) A_N , A_E , S_N , S_E , E, AB ලෙස අදාළ කොටුවෙහි ලියමින් ඉහත ප්‍රතික්‍රියා අනුපිළිවෙලෙහි එක් එක් ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝපිලික ආකලන (A_N), ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආකලන (A_E), නියුක්ලියෝපිලික ආදේශ (S_N), ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදේශ (S_E), ඉවත් වීම (E) හෝ අම්ල හෂම (AB) ලෙස වර්ගීකරණය කරන්න.

ප්‍රතික්‍රියාව	1	2	3	4
ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය	A_E	E	AB	S_N


(03 × 4)

(iii) ප්‍රතික්‍රියාව 1 සඳහා යන්ත්‍රණය ලියන්න.




(12)

විකල්ප පිළිතුර :-



(iv) පෙරොක්සයිඩ් ඇසි විට ප්‍රතික්‍රියාව 1 හිදී කළේ නම් ලැබෙන T ඵලයේ ව්‍යුහය අඳින්න.



T

(03)

(v) ප්‍රතික්‍රියාව 1 හි දී ද, සුළු ඵලයක් ලෙස T සෑදෙන බව සොයාගෙන ඇත. ප්‍රතික්‍රියාව 1 හි ප්‍රධාන ඵලය T නොව, P වන්නේ මන්දැයි ප්‍රතික්‍රියාවේ යන්ත්‍රණය සලකමින් පැහැදිලි කරන්න.

<p>P සඳහා අතරමැදි කාබොකැටායනය</p> $\text{CH}_3 - \overset{+}{\text{C}} - \text{CH}_2\text{Br}$ <p>ද්විතීයික කාබොකැටායනයකි. වඩා ස්ථායී වේ.</p> <p>(වඩා ශීඝ්‍රයෙන් P සෑදේ.)</p>	<p>T සඳහා අතරමැදි කාබොකැටායනය</p> $\overset{+}{\text{C}}\text{H}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{Br}$ <p>ප්‍රාථමික කාබොකැටායනයකි.</p> <p>ස්ථායීතාව අඩු ය.</p>	<p>} (03)</p> <p>} (03)</p>
---	--	-----------------------------

* සටහන : ව්‍යුහය නොදක්වා ද්විතීයික කාබොකැටායනයක් බව සඳහන් කර ඇත්නම් හා ව්‍යුහය (iii) කොටසෙහි දක්වා ඇත්නම් මුළු ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.

(4 (b) සඳහා ලකුණු 45)

(4 සඳහා මුළු ලකුණු 100)

B කොටස — රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 15 බැගින් ලැබේ.)

5. (a) A හා B යනු වාෂ්පශීලී හා සම්පූර්ණයෙන් මිශ්‍ර වන ද්‍රව දෙකක් වන අතර ඒවා මිශ්‍ර කළ විට පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක් සෑදෙයි. A ද්‍රවයෙන් 1.0 mol හා B ද්‍රවයෙන් 1.0 mol අඩංගු මිශ්‍රණයක් සංවෘත බඳුනක තබන ලදී. මෙම පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට එළඹී විට වායු කලාපයේ පීඩනය, පරිමාව සහ මෙම කලාපයේ A/B මවුල අනුපාතය පිළිවෙළින් $1.0 \times 10^3 \text{ Pa}$, 0.8314 m^3 හා $2/3$ බව සොයා ගන්නා ලදී. පද්ධතිය 200 K හි පවත්වා ගන්නා ලදී. පහත සඳහන් දෑ ගණනය කරන්න.

- (i) වායු කලාපයේ ඇති මුළු මවුල ප්‍රමාණය.
- (ii) ද්‍රව කලාපයේ A හා B වල මවුල භාග.
- (iii) A හා B වල සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනයන්.

(ලකුණු 5.0 කි.)

(b) සංතෘප්ත Mn(OH)_2 ද්‍රාවණයක 25°C හිදී Mn^{2+} සාන්ද්‍රණය $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ වේ. 25°C හිදී Mg(OH)_2 හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය $1.0 \times 10^{-10} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ වේ. 25°C හිදී NH_4OH හි K_b අගය $1.6 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ වේ.

- (i) 25°C හිදී Mn(OH)_2 හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය ගණනය කරන්න.
- (ii) 25°C හිදී සාන්ද්‍රණය 0.01 mol dm^{-3} වූ NH_4OH ද්‍රාවණයක හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.
- (iii) සාන්ද්‍රණය $0.001 \text{ mol dm}^{-3}$ වූ MnSO_4 ද්‍රාවණයකින් Mn(OH)_2 අවක්ෂේප වීම පටන් ගැන්ම සඳහා අවශ්‍ය NH_4OH සාන්ද්‍රණය නිර්ණය කරන්න.
- (iv) සාන්ද්‍රණය 1.00 mol dm^{-3} වූ NH_4OH ද්‍රාවණයක 1.00 dm^3 පරිමාවක් තුළ NH_4Cl , 5.35 g දිය කර ඇත්නම් එම ද්‍රාවණයෙහි හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.
(H = 1.0, N = 14.0, Cl = 35.5)
- (v) 0.02 mol dm^{-3} $\text{Mg(NO}_3)_2$ ද්‍රාවණයක 0.50 dm^3 හා 0.20 mol dm^{-3} NH_4OH ද්‍රාවණයක 0.50 dm^3 මිශ්‍ර කිරීමෙන් සෑදීමට යන ද්‍රාවණයක Mg(OH)_2 අවක්ෂේප වීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය වන ඝන NH_4Cl මවුල සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
- (vi) කාණ්ඩ විශ්ලේෂණයේ දී NH_4Cl භාවිත කිරීම පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 10.0 කි.)

5. (a) (i)

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$n = \frac{1.0 \times 10^3 \text{ Pa} \times 0.8314 \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 200 \text{ K}} \quad (04 + 01)$$

$$n = 0.5 \text{ mol} \quad (04 + 01)$$

(5 (a) (i) සඳහා ලකුණු 10)

- (ii) වායු කලාපයේ A වල මවුල ගණන = n_A , වායු කලාපයේ B වල මවුල ගණන = n_B ,
 වායු කලාපයේ A වල මවුල භාගය = x_A , වායු කලාපයේ B වල මවුල භාගය = x_B ,
 ද්‍රව කලාපයේ A වල මවුල භාගය = x'_A , ද්‍රව කලාපයේ B වල මවුල භාගය = x'_B .

$$\frac{x_A}{x_B} = \frac{n_A}{n_B} = \frac{2}{3} \quad (03)$$

$$n = n_A + n_B = 0.5 \quad (03)$$

$$n_A = 0.2 \text{ mol} \quad (01 + 01)$$

$$n_B = 0.3 \text{ mol} \quad (01 + 01)$$

$$\text{ද්‍රව කලාපයේ ඉතිරි වන A ප්‍රමාණය} = (1.0 - 0.2) \text{ mol} = 0.8 \text{ mol} \quad (01 + 01)$$

$$\text{ද්‍රව කලාපයේ ඉතිරි වන B ප්‍රමාණය} = (1.0 - 0.3) \text{ mol} = 0.7 \text{ mol} \quad (01 + 01)$$

$$x'_A = \frac{0.8 \text{ mol}}{(0.8 + 0.7) \text{ mol}} = \frac{8}{15} = 0.533 \quad (03)$$

$$x'_B = \frac{0.7 \text{ mol}}{(0.8 + 0.7) \text{ mol}} = \frac{7}{15} = 0.467 \quad (03)$$

(පියවර එකතු කර ඇති නම් ඒ අනුව ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.)

(5 (a) (ii) සඳහා ලකුණු 20)

- (iii) A වල ආංශික පීඩනය = P_A , B වල ආංශික පීඩනය = P_B ,
 A වල සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය = P_A° , B වල සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය = P_B°

ඩෝල්ටන් නියමය යෙදීමෙන්,

$$P_A = P \times x_A = 1.0 \times 10^3 \text{ Pa} \frac{0.2 \text{ mol}}{0.5 \text{ mol}} \quad (02)$$

$$P_A = 4.0 \times 10^2 \text{ Pa} \quad (01)$$

ඒ පරිදි ම

$$P_B = P \times x_B = 1.0 \times 10^3 \text{ Pa} \frac{0.3 \text{ mol}}{0.5 \text{ mol}} \quad (02)$$

$$P_B = 6.0 \times 10^2 \text{ Pa} \quad (01)$$

රලාල් නියමය යෙදීමෙන්,

$$P_A^\circ = \frac{P_A}{x'_A} = \frac{4.0 \times 10^2 \text{ Pa}}{8/15} \quad (03 + 01)$$

$$= 7.5 \times 10^2 \text{ Pa} \quad (02 + 01)$$


$$P_B^\circ = \frac{P_B}{x'_B} = \frac{6.0 \times 10^2 \text{ Pa}}{7/15} \quad (03 + 01)$$

$$= 1.286 \times 10^3 \text{ Pa} \quad (02 + 01)$$

(5 (a) (iii) සඳහා ලකුණු 20)

(5 (a) සඳහා මුළු ලකුණු 50)

(b) (i) 25°C හි දී $Mn(OH)_2$ වල ද්‍රාව්‍යතාව = $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$




$$K_{sp} = [Mn^{2+}(aq)][OH^-(aq)]^2 \quad \text{(භෞතික අවස්ථා අත්‍යවශ්‍යයි.)} \quad (02)$$

$$K_{sp} = 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \times (2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3})^2 \quad (02 + 01)$$

$$K_{sp} = 4 \times 10^{-15} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9} \quad (02 + 01)$$

(5 (b) (i) සඳහා ලකුණු 10)



$$K_b = \frac{[NH_4^+(aq)][OH^-(aq)]}{[NH_4OH(aq)]} \quad \text{(භෞතික අවස්ථා අත්‍යවශ්‍යයි.)} \quad (01)$$


NH_4OH දුර්වල භස්මයක් බැවින් විසඳන ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා ය.

$$[NH_4^+(aq)] = [OH^-(aq)] \text{ සහ } [NH_4OH] = 0.01 \text{ mol dm}^{-3} \quad (02)$$

$$1.6 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = \frac{[OH^-(aq)]^2 (\text{mol dm}^{-3})^2}{0.01 \text{ mol dm}^{-3}} \quad (02 + 01)$$

$$[OH^-(aq)] = 4.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \quad (02 + 01)$$

(5 (b) (ii) සඳහා ලකුණු 10)




$$4 \times 10^{-15} (\text{mol}^3 \text{ dm}^{-9}) = 10^{-3} (\text{mol dm}^{-3}) \times [OH^-(aq)]^2$$

$$[OH^-(aq)]^2 = \frac{4 \times 10^{-15} (\text{mol}^3 \text{ dm}^{-9})}{10^{-3} (\text{mol dm}^{-3})} = 4 \times 10^{-12} (\text{mol dm}^{-3})^2 \quad (04 + 01)$$

$$[OH^-(aq)] = 2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$

$Mn(OH)_2$ අවකේෂ වීම ආරම්භ වීම සඳහා අවශ්‍ය $[OH^-(aq)] = 2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$, $[OH^-(aq)]$, $2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$ වීම සඳහා අවශ්‍ය වන $[NH_4OH] = x$ ලෙස උපකල්පනය කිරීමෙන්,



$$x - 2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \quad 2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \quad 2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$1.6 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = \frac{[2 \times 10^{-6}]^2 (\text{mol dm}^{-3})^2}{x - 2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}} \quad (04 + 01)$$

$$x = 2.25 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{හෝ} \quad (04 + 01)$$

$$1.6 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = \frac{[2 \times 10^{-6}]^2 (\text{mol dm}^{-3})^2}{x} \quad (04 + 01)$$

$$x = 2.2 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$


(5 (b) (iii) සඳහා ලකුණු 20)

(iv) NH_4Cl වල මවුලික ස්කන්ධය = $14.0 + 1.0 \times 4 + 35.5 = 53.5 \text{ g mol}^{-1}$

එමනිසා NH_4Cl ප්‍රමාණය = $5.35 \text{ g} / 53.5 \text{ g mol}^{-1} = 0.1 \text{ mol}$ (01 + 01)

ජලීය මාධ්‍යයක දී NH_4Cl සම්පූර්ණයෙන් විසඳනය වන බැවින්,
 $[\text{NH}_4^+(\text{aq})] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$ (01 + 01)

$[\text{NH}_4\text{OH}] = c \text{ mol dm}^{-3}$ ලෙස හා විසඳන ප්‍රමාණය \propto ලෙස ගත් විට



$[\text{NH}_4^+(\text{aq})] = (0.1 + c\alpha) \text{ mol dm}^{-3} = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$ (03 + 01)

$[\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq})] = (0.1 - c\alpha) \text{ mol dm}^{-3} = 1.0 \text{ mol dm}^{-3}$ (03 + 01)

සටහන : වගන්ති ලෙස ලියා ඇත්නම් ලකුණු (04) + (04) ප්‍රදානය කරන්න.

$$1.6 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = \frac{0.1 \text{ mol dm}^{-3} [\text{OH}^-(\text{aq})]}{1.0 \text{ mol dm}^{-3}} \quad (03 + 01)$$

$[\text{OH}^-(\text{aq})] = 1.6 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ (03 + 01)

(5 (b) (iv) සඳහා ලකුණු 20)

විකල්ප පිළිතුර

NH_4Cl වල අණුක ස්කන්ධය = $14.0 + 1.0 \times 4 + 35.5 = 53.5 \text{ g mol}^{-1}$

එමනිසා NH_4Cl ප්‍රමාණය = $5.35 \text{ g} / 53.5 \text{ g mol}^{-1} = 0.1 \text{ mol}$ (01 + 01)

ජලීය මාධ්‍යයක දී NH_4Cl සම්පූර්ණයෙන් විසඳනය වන බැවින්,

$[\text{NH}_4^+(\text{aq})] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$ (01 + 01)

$[\text{NH}_4^+(\text{aq})] = (0.1 + c\alpha) \text{ mol dm}^{-3} = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$ (03 + 01)

$[\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq})] = (0.1 - c\alpha) \text{ mol dm}^{-3} = 1.0 \text{ mol dm}^{-3}$ (03 + 01)

සටහන : වගන්ති ලෙස ලියා ඇත්නම් ලකුණු (04) + (04) ප්‍රදානය කරන්න.

$$pOH = pK_b + \log \left(\frac{[\text{salt}]}{[\text{base}]} \right) \quad (03 + 01)$$

$$pOH = -\log(1.6 \times 10^{-5}) + \log \left(\frac{[0.1 \text{ mol dm}^{-3}]}{[1.0 \text{ mol dm}^{-3}]} \right) \quad (03 + 01)$$

$pOH = 3.796$

$[\text{OH}^-] = 1.6 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ (03 + 01)

(5 (b) (iv) සඳහා ලකුණු 20)

(v) අවසාන ද්‍රාවණයේ $[Mg(NO_3)_2(aq)]$

$$= \frac{0.02 \text{ mol dm}^{-3} \times 0.50 \text{ dm}^3}{1.0 \text{ dm}^3} = 0.01 \text{ mol dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$

අවසන් මිශ්‍රණයේ (OH_3) අවකේෂ වීම වැළැක්වීම සඳහා පහත නිර්ණායක සම්පූර්ණ විය යුතු ය.

$Mg(NO_3)_2$, Mg^{2+} සහ NO_3^- අයනවලට සම්පූර්ණයෙන් විසඳවන වන බැවින්, අවසාන ද්‍රාවණයේ $[Mg^{2+}(aq)] = 0.01 \text{ mol dm}^{-3}$

අවසාන ද්‍රාවණයේ $Mg(OH)_2(s)$ අවකේෂ වීම වැළැක්වීම සඳහා,

$$K_{sp} \geq [Mg^{2+}(aq)] [OH^- (aq)]^2$$

$$1 \times 10^{-10} (\text{mol}^3 \text{ dm}^{-9}) \geq 10^{-2} (\text{mol dm}^{-3}) \times [OH^- (aq)]^2$$

$$[OH^- (aq)]^2 \leq \frac{1 \times 10^{-10} (\text{mol}^3 \text{ dm}^{-9})}{10^{-2} (\text{mol dm}^{-3})} = 1 \times 10^{-8} (\text{mol dm}^{-3})^2 \quad (04 + 01)$$

$$[OH^- (aq)] \leq 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$

අවසාන ද්‍රාවණයේ $[NH_4OH(aq)]$

$$= \frac{0.2 \text{ mol dm}^{-3} \times 0.50 \text{ dm}^3}{1.0 \text{ dm}^3} = 0.10 \text{ mol dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$

$[OH^- (aq)]$, $1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ ලෙස පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය $[NH_4Cl(aq)] = x$ ලෙස ගත්විට විසඳන ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා බැවින්, $[NH_4^+(aq)] = [NH_4Cl(aq)] = h$

$$1.6 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = \frac{x (\text{mol dm}^{-3}) \times 1 \times 10^{-4} (\text{mol dm}^{-3})}{0.1 \text{ mol dm}^{-3}} \quad (04 + 01)$$

$$x = 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$

$Mg(OH)_2(s)$ අවකේෂ වීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය

$$NH_4Cl \text{ ප්‍රමාණය} = 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \times 1.0 \text{ dm}^3 = 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad (04 + 01)$$

(5 (b) (v) සඳහා ලකුණු 35)

(vi) කාණ්ඩ වෙන් කිරීමේ දී III වන කාණ්ඩයේ දී $Mg(OH)_2$ (හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවකේෂ විය හැකි අනෙකුත් කැටායන) අවකේෂ වීම වැළැක්වීම සඳහා NH_4OH එකතු කිරීමට පෙර NH_4Cl එකතු කරයි හෝ IV කාණ්ඩයේ කැටායන අවකේෂ වීම වැළැක්වීමට (05)

(5 (b) (vi) සඳහා ලකුණු 05)

(5 (b) සඳහා මුළු ලකුණු 100)

(5 සඳහා මුළු ලකුණු 100)

සිසුන් බහුතරයක් (77%) මෙම ප්‍රශ්නය තෝරාගෙන තිබිණි. නමුත් B කොටසේ රචනා ප්‍රශ්න තුන අතරින් පහසුතාව අඩු ම ප්‍රශ්නය මෙයයි (පහසුතාව 38%). අයදුම්කරුවන්ගෙන් 57%ක් ම ලබා ගෙන ඇත්තේ ලකුණු 150ත් ලකුණු 370 අඩු ප්‍රමාණයකි. රචනා කොටසේ මූලික ම ඇති ප්‍රශ්නය හැම විට ම පහසුතම ප්‍රශ්නය නොවන බව සිසුන් තේරුම් ගත යුතු අතර, පිළිතුරු ලිවීම ආරම්භ කිරීමට පෙර ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවීම වඩා ප්‍රතිඵලදායී වන බව පෙන්වා දිය යුතු වේ.

a (i) කොටසින් බලාපොරොත්තු වූයේ පරිපූර්ණ වායු සමීකරණයේ යෙදීම්, රඳාල් නියමය හා ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමය ඇසුරෙන් ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමයි. පරිපූර්ණ වායු සමීකරණයේ යෙදීම් යන අරමුණ අපේක්ෂිත ඉලක්කය වෙත ළඟා වී ඇති නමුත්, ඉතිරි අරමුණු කරා ඵලභීමට හැකි වී ඇත්තේ අයදුම්කරුවන්ගෙන් 20%ක් වැනි අඩු සංඛ්‍යාවකට ය. ගැටලුවක් නිවැරදි ව විශ්ලේෂණය කර විසඳීමේ හැකියාව නොමැති වීම එයට හේතු වී ඇත.

b කොටසේ දී

1. ද්‍රාව්‍යතා ගුණිත ප්‍රකාශනයේ යෙදීම හා එය ආශ්‍රිත ගැටලු විසඳීම,
2. පොදු අයන ආචරණය,
3. කාණ්ඩ විශ්ලේෂණය හා එහි යෙදීම් පරීක්ෂා කර තිබිණි.

ඉහත පළමු අරමුණ ඉටු කර ගැනීම තරමක් දුරට සාර්ථක වී ඇති අතර, ඉතිරි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම අපහසු වී ඇති බව පෙනේ. මෙයට හේතු ලෙස, සමීකරණ නිවැරදි ව ලිවීමේ අපහසුතාව හා තුළිත නොකිරීම, භෞතික අවස්ථා නොලිවීම හා ඒකක නිවැරදි ව යොදමින් ගණනය නොකිරීම යනාදිය දැක්විය හැකි ය. (b) (i) හා (ii) මූලික දැනුම පරීක්ෂා කෙරෙන ඉතා පහසු කොටස් වුව ද ඒවායේ ලකුණු මට්ටම 43% නොඉක්මවීමෙන් පිළිබිඹු වන්නේ සැලකිය යුතු කොටසක් මූලික මූලධර්ම පිළිබඳ ව ද දැනුම්වත් නොවන බව ය.

කටපාඩමින් ගණනය කිරීමට වඩා තර්කානුකූල ව ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව සිසුන් තුළ වර්ධනය කිරීම මෙම අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට හේතු වනු ඇත.

6. (a) $mM + nN \longrightarrow cC$ ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.



මෙහි m, n හා c යනු පිළිවෙලින් M, N හා C වල ස්ටොයිකියෝමිතික සංගුණක වේ.

- (i) ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක් බව සලකමින් එහි සීඝ්‍රතාවය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න. (ප්‍රතික්‍රියාවෙහි සීඝ්‍රතා නියතය = k වේ.)
- (ii) ප්‍රතික්‍රියාවෙහි පෙළ සෙවීම සඳහා පරීක්ෂණ දෙකක් සිදු කරන ලදී.

පරීක්ෂණය 1: N හි සාන්ද්‍රණය නියතව පවත්වා ගනිමින් හා M හි සාන්ද්‍රණය වෙනස් කරමින් ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ආරම්භක සීඝ්‍රතාවය මනින ලදී.

පරීක්ෂණය 2: M හි සාන්ද්‍රණය 1.0 mol dm^{-3} ලෙස නියතව පවත්වා ගනිමින් හා N හි සාන්ද්‍රණය වෙනස් කරමින් ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ආරම්භක සීඝ්‍රතාවය මනින ලදී.


පරීක්ෂණ දෙක ම එක ම උෂ්ණත්වයේ දී සිදු කරන ලදී. පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල පහත ප්‍රස්ථාරවල දක්වා ඇත.



- I. M අනුබද්ධයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවෙහි පෙළ සොයන්න.
- II. N අනුබද්ධයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවෙහි පෙළ සොයන්න.
- III. ප්‍රතික්‍රියාවෙහි මුළු පෙළ කුමක් ද?
- IV. ප්‍රතික්‍රියාවෙහි සීඝ්‍රතා නියතය, k සොයන්න.

(ඔබගේ 6.0 ලකුණු)

(b) කරාමයකින් සම්බන්ධ කරන ලද P (පරිමාව = V) හා Q (පරිමාව = $2V$) යන දෘඪ බල්බ දෙකක් නියත උෂ්ණත්ව කුටියක පහත දක්වා ඇති පරිදි තබා ඇත.



ආරම්භයේ දී කරාමය වසා ඇත. P තුළ AB වායුව 1.0 mol අඩංගු වන අතර Q හිස්ව ඇත. පද්ධතියෙහි උෂ්ණත්වය 400 K දක්වා ඉහළ නැංවූ විට $AB(g), A(g)$ හා $B(g)$ බවට පහත දී ඇති සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවට අනුව විභේජනය වේ.



ඉහත සමතුලිතතාවය සඳහා සමතුලිතතා නියතය K_c වේ. පද්ධතිය සමතුලිතතාවය (පළමු සමතුලිතතාවය) කරා එළඹූ විට $A(g)$ ප්‍රමාණය $x \text{ mol}$ බව සොයා ගන්නා ලදී. කරාමය විවෘත කර පද්ධතිය නැවත සමතුලිතතාවයට (දෙවැනි සමතුලිතතාවය) පත් වීමට ඉඩ හරින ලදී. එවිට සෑදුණු $A(g)$ ප්‍රමාණය $y \text{ mol}$ බව සොයා ගන්නා ලදී.

(i) $K_c V (1-x) = x^2$ හා $3K_c V (1-y) = y^2$ බව පෙන්වන්න.

- (ii) $y = 0.5 \text{ mol}$ වේ නම්, x හි අගය ගණනය කරන්න.
- (iii) ලේවැටලියර් මූලධර්මය භාවිත කරමින් ඉහත (ii) හි ඔබගේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.
- (iv) පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය 600 K දක්වා වැඩි කරන ලදී. පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට (කෙටුණි සමතුලිතතාවය) එළඹී විට පද්ධතියේ පීඩනය, දෙවැනි සමතුලිතතාවයෙහි පීඩනය මෙන් 1.7 ගුණයක් විය. කෙටුණි සමතුලිතතාවයෙහි දී $A(g)$ ප්‍රමාණය $z \text{ mol}$ විය. z හි අගය ගණනය කරන්න.
- (v) $AB(g)$ හි වියෝජනය තාප අවශෝෂක බව පෙන්වන්න.
- (vi) ඔබගේ ගණනය කිරීම්වල දී භාවිත කරන ලද උපකල්පනය/උපකල්පන සඳහන් කරන්න.

(කෙළුම 9.0 ඩ.)

6. (a) (i) ශීඝ්‍රතාව $= k[M]^m[N]^n$ (10)
(6 (a) (i) සඳහා මුළු ලකුණු 10)

- (ii) I. පළමු වන ප්‍රස්තාරය අනුව ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව $[M]$ වලින් ස්වායත්ත වේ. එම නිසා M වලට සාපේක්ෂ ව ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ ගුණය ($m = 0$) වේ. (10)
 එම නිසා, ශීඝ්‍රතාව $= k[N]^n$ (05)

$$n = 0$$

- II. දෙවන ප්‍රස්තාරය අනුව, $N = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$ විට ශීඝ්‍රතාව $= 10 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$
 $N = 0.2 \text{ mol dm}^{-3}$ විට ශීඝ්‍රතාව $= 40 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$

සාන්ද්‍රණය දෙගුණ වන විට ශීඝ්‍රතාව හතර ගුණයකින් වැඩි වේ. එම නිසා N අනුබද්ධයෙන් පෙළ 2 වේ. (20)

හෝ

කුමන හෝ ලක්ෂ්‍ය දෙකක දත්ත භාවිතයෙන්,

$$10 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^n \dots\dots\dots (1) \quad (04 + 01)$$

$$40 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^n \dots\dots\dots (2) \quad (04 + 01)$$

$$\frac{(2)}{(1)} \quad \frac{40 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}}{10 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}} = \frac{(0.2 \text{ mol dm}^{-3})^n}{(0.1 \text{ mol dm}^{-3})^n} \quad (04 + 01)$$

$$4 = 2^n$$

$$n = 2 \quad (05)$$

සටහන : තර්කයෙන් පමණක්, උදා: ප්‍රස්තාරයෙන් වක්‍ර හැඩය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ $n = 2$ යන්න ලබා ගෙන ඇති නම් ලකුණු 10ක් පමණක් ප්‍රදානය කරන්න.

III. මුළු පෙළ $= n + m = 2 + 0 = 2$ (05)


IV. (1) වන සමීකරණයෙන්,

$$k = \frac{10 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}}{(0.1 \text{ mol dm}^{-3})^2} \quad (04 + 01)$$

$$= 1000 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 \text{ s}^{-1} \quad (04 + 01)$$

(6 (a) (ii) සඳහා මුළු ලකුණු 50)

(6 (a) සඳහා මුළු ලකුණු 60)




සමතුලිත වීට සාන්ද්‍රණය $\frac{1-x}{V}$ $\frac{x}{V}$ $\frac{x}{V}$

$$K_c = \frac{(x/V)(x/V)}{[(1-x)/V]} = \frac{x^2}{(1-x)V} \quad (05)$$

$$K_c V (1-x) = x^2$$

කරාමය විවෘත කල වීට පරිමාව 3V දක්වා වැඩි වන අතර, වියෝජනය වන ප්‍රමාණය y mol වේ.



සමතුලිත වීට සාන්ද්‍රණය $\frac{1-y}{3V}$ $\frac{y}{3V}$ $\frac{y}{3V}$

$$K_c = \frac{\left(\frac{y}{3V}\right)\left(\frac{y}{3V}\right)}{\left(\frac{1-y}{3V}\right)} = \frac{y^2}{(1-y)3V} \quad (05)$$

$$3K_c V (1-y) = y^2$$

(6 (b) (i) සඳහා ලකුණු 20)

(ii) අවස්ථා දෙකේ දී උෂ්ණත්වයේ වෙනසක් නොවන බැවින්, සමතුලිතතා නියතය K_c එක ම අගයක් ගනී. (05)

$$K_c = \frac{x^2}{(1-x)V} = \frac{y^2}{(1-y)3V} \quad (05)$$

$$y = 0.5 \text{ mol නම්}$$

$$\frac{x^2}{(1-x)V} = \frac{(0.5 \text{ mol})^2}{(1.0 \text{ mol} - 0.5 \text{ mol}) 3V} \quad (05)$$

$$\frac{x^2}{(1-x)} = \frac{(0.5 \text{ mol})^2}{3(0.5 \text{ mol})} = \frac{0.5 \text{ mol}}{3}$$

$$3x^2 - 0.5 \text{ mol} (1-x) = 0$$

$$(3x - 1 \text{ mol})(2x + 1 \text{ mol}) = 0$$

$$x = \frac{1}{3} \text{ mol} \quad \text{OR} \quad x = \frac{-1}{2} \text{ mol} \quad (\text{පිළිගත නොහැකි ය}) \quad (05)$$

$$x = 0.33 \text{ mol}$$

(6 (b) (ii) සඳහා ලකුණු 20)

(iii) පරිමාව V වීට, වියෝජනය වන ප්‍රමාණය = 0.33 mol; පරිමාව 3V දක්වා වැඩි කල වීට වියෝජනය වන ප්‍රමාණය = 0.5 mol; පරිමාව 3V දක්වා වැඩි කල වීට පීඩනය අඩු වන බැවින්, එය වළක්වා ගැනීම සඳහා AB(g) වැඩියෙන් වියෝජනය වේ. (10)

(6 (b) (iii) සඳහා ලකුණු 10)

- (iv) දෙ වන සමතුලිතතාව සඳහා $PV = nRT$ යෙදීමෙන්,
 $y = 0.5$
 $n = 1 + y = 1.5 \text{ mol}$ (4 + 1)

පරිමාව = $3V$, $T = 400 \text{ K}$

$$P_2 = 1.5 \frac{R \times 400 \text{ K}}{3V} \quad (05)$$

උෂ්ණත්වය 600 K දක්වා වැඩි කිරීමේ දී පීඩනය = $P_3 = 1.7 P_2$
 තෙවන සමතුලිතතාව සඳහා $PV = nRT$ යෙදීමෙන්,

$$n = (1 + z) \text{ mol} \quad (4 + 1)$$

පරිමාව = $3V$, $T = 600 \text{ K}$

$$P_2 = 1.7 \left(1.5 \frac{R \times 400 \text{ K}}{3V} \right) = \frac{(1+z) R \times 600 \text{ K}}{3V} \quad (05)$$

$$1+z = \frac{1.5 \times 400 \text{ K} \times 1.7}{600 \text{ K}} = 1.7$$

$$z = 0.7 \text{ mol} \quad (4 + 1)$$

(6 (b) (iv) සඳහා ලකුණු 25)

- (v) උෂ්ණත්වය 400 K සිට 600 K දක්වා (පරිමාව නියත ව ඇති විට) වෙනස් වන විට විශේෂය වන ප්‍රමාණය වැඩි වේ. එම නිසා තාපය සපයන විට ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව වැඩියෙන් සිදු වේ. එබැවින් ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාපාවශෝෂක වේ.

(10)

(6 (b) (v) සඳහා ලකුණු 10)

- (vi) සියලු ම වායු පරිපූර්ණ ව හැසිරේ. (05)

(6 (b) (vi) සඳහා ලකුණු 05)

(6 (b) සඳහා මුළු ලකුණු 90)

(6 සඳහා මුළු ලකුණු 150)

07 ප්‍රශ්නය


7. (a) ලැයිස්තුවෙහි දී ඇති රසායන ද්‍රව්‍ය පමණක් භාවිත කර ඔබ පහත සඳහන් පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වන්න.




රසායන ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව
 NaBH_4 , HgSO_4 , තනුක H_2SO_4 ,
 සාන්ද්‍ර H_2SO_4 , PCl_5 , Mg, ether

(ඉකුත් 4.0 ලි.)

(b) ආරම්භක කාබනික සංයෝගය ලෙස A පමණක් භාවිත කර B සංයෝගය සංශ්ලේෂණය කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වන්න.




A



B

(ඉකුත් 6.0 ලි.)

(c) පහත සඳහන් X සංයෝගය එකිනෙකින් වෙනස් වූ මාර්ග දෙකක් ඔස්සේ සංශ්ලේෂණය කළ හැක. එක් එක් මාර්ගය, නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෙස ලිවිය හැක.




X

- (i) එක් එක් මාර්ගය සඳහා ප්‍රතික්‍රියක ලියන්න.
- (ii) ඉහත එක් මාර්ගයක දී, X ට අමතරව, Y නම් වෙනත් සංයෝගයක් ද සෑදේ. මෙම මාර්ගයෙහි යෙදෙන ප්‍රතික්‍රියක හඳුනාගෙන Y හි ව්‍යුහය ලියන්න.
- (iii) Y සෑදෙන ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය කුමක් දැයි සඳහන් කරන්න.
- (iv) ඉහත (ii) හි ඔබ හඳුනාගත් ප්‍රතික්‍රියක, පියවර දෙකක ප්‍රතික්‍රියාවක් මගින් X සාදන්නේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. මෙම පියවර දෙක ලිවීමෙන් X සෑදෙන ආකාරය පෙන්වන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන චලනය දැක්වීමට වක්‍ර ඊතල යොදන්න.

(ඉකුත් 5.0 ලි.)


7. (a)



(03 × 12 + 04 = 40)


(7 (a) සඳහා ලකුණු 40)

(b)



(06 × 10 = 60)


7 (b) සඳහා පහත දී ඇති විකල්ප පිළිතුරු ද ලකුණු දිය හැකි ය.



(05 × 12 = 60)

(7 (b) සඳහා ලකුණු 60)

(c) (i)



සටහන : CH_3O^- සඳහා CH_3OH සමඟ Na පිළිගත හැකි ය. Cl වෙනුවට Br හෝ I තිබීම පිළිගත හැකි ය.

(7 (c) (i) සඳහා ලකුණු 24)

(ii)





(7 (c) (ii) සඳහා ලකුණු 08)

(iii) ඉවත් වීම

(06)

(7 (c) (iii) සඳහා ලකුණු 06)

(iv)



(7 (c) (iv) සඳහා ලකුණු 12)

(7 (c) සඳහා මුළු ලකුණු 50)


(7 සඳහා මුළු ලකුණු 150)

C කොටස — රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට බැගින් 15 බැගින් ලැබේ.)

8. (a) ආවර්තික වගුවේ 3d ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යයක සංයෝගවල ප්‍රතික්‍රියා පහත දී ඇත.

A, B, C, D, E, F, G සහ H විශේෂ හඳුනා ගන්න.



(බැගුණු 5.0 බ.)

(b) P අවරණ වායුව ජලය තුළට යවා සාදා ගන්නා ලද Z ජලීය ද්‍රාවණයක් සමඟ (1) සහ (2) පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. පරීක්ෂණ හා නිරීක්ෂණ පහත දක්වා ඇත.

පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
(1) එම ද්‍රාවණයට ආම්ලික K ₂ Cr ₂ O ₇ ද්‍රාවණයක් එක් කරන ලදී.	පැහැදිලි කොළ පැහැති ද්‍රාවණයක් ලැබුණි.
(2) එම ද්‍රාවණයට H ₂ O ₂ එක් කර රත් කරන ලදී. ඉන්පසු BaCl ₂ ද්‍රාවණයක් එක් කරන ලදී.	කහුක HCl හි අද්‍රාව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදුණි.

- (i) P වායුව හඳුනා ගන්න. (හේතු දැක්වීම අවශ්‍ය නැත.)
- (ii) (1) සහ (2) පරීක්ෂණයන්හි සිදු වන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න.
- (iii) Q වායුව Z ද්‍රාවණය තුළින් යැවූ විට ලා කහ පැහැති (සුදු ලෙස පෙනිය හැකි) ආවලතාවයක් ලැබුණි.
 - I. Q වායුව හඳුනා ගන්න. (හේතු දැක්වීම අවශ්‍ය නැත.)
 - II. මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණය දෙන්න.

(බැගුණු 5.0 බ.)

(c) විශ්ලේෂණය සඳහා දී ඇති නියැදියක NaOH, Na₂CO₃ හා ජලයෙහි ද්‍රවණය වන නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදී. මෙම නියැදියෙහි අඩංගු Na₂CO₃ ප්‍රතිශතය නිර්ණය කිරීමට පහත ක්‍රියා පිළිවෙළ භාවිත කරන ලදී.

සැ.යු.: නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යය පහත දී ඇති ක්‍රියා පිළිවෙළෙහි ප්‍රතික්‍රියාවලට සහභාගී නොවේ.

ක්‍රියා පිළිවෙළ:








නියැදියෙන් 42.40 g ක ස්කන්ධයක් 500 cm³ පරිමාමිතික ජලාස්කූචකට ප්‍රමාණාත්මකව දමා සලකුණ තෙක් ආඥුත ජලය එක් කරන ලදී. ජලාස්කූච හොදින් සොලවන ලදී (X ද්‍රාවණය).

(1) X ද්‍රාවණයෙන් 25.00 cm³ ක කොටසක් දර්ශකය ලෙස මෙහිල් මරේන්ජ් භාවිත කර, වර්ණය තැඹිලි සිට රතු දක්වා වෙනස් වන තුරු තනුක HCl ද්‍රාවණය සමග අනුමාපනය කරන ලදී. අන්ත ලක්ෂ්‍යයේ දී බියුරෙට්ටුවේ කියවීම 32.00 cm³ වේ.






(2) X ද්‍රාවණයෙන් 25.00 cm³ ක කොටසක් 70 °C තෙක් රත් කර, එයට මදක් වැඩිපුර 1% BaCl₂ ද්‍රාවණය එක් කරන ලදී. සෑදුණු BaCO₃ අවක්ෂේපය පෙරා, පෙරනය, දර්ශකය ලෙස පිනොජතලින් භාවිත කර, වර්ණය රෝස සිට අවර්ණ දක්වා වෙනස් වන තුරු තනුක HCl ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කරන ලදී. අන්ත ලක්ෂ්‍යයේ දී බියුරෙට්ටුවේ කියවීම 24.00 cm³ වේ.

(3) තනුක HCl ද්‍රාවණයෙහි 25.00 cm³ පරිමාවකට 5% KIO₃ සහ 5% KI වැඩිපුර එක් කරන ලදී. පිටවුණු I₂, දර්ශකය ලෙස පිෂ්ඨය භාවිත කර, 0.50 mol dm⁻³ Na₂S₂O₃ ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කරන ලදී. අන්ත ලක්ෂ්‍යයේ දී බියුරෙට්ටුවේ කියවීම 12.50 cm³ වේ.





- (i) HCl ද්‍රාවණයෙහි සාන්ද්‍රණය නිර්ණය කරන්න.
- (ii) නියැදියේ අඩංගු සෝඩියම් කාබනේට් ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.
- (iii) ඉහත ගණනය කිරීමේ දී කරන උපකල්පනයක් / උපකල්පන ඇතොත් ඒවා ප්‍රකාශ කරන්න.
(C = 12, O = 16, Na = 23) (ඉහළ 5.0 ලකුණ)



විකල්ප පිළිතුර (01)



විකල්ප පිළිතුර (02)



සටහන : සමීකරණය සමතුලිත කර නැත්නම් ලකුණු නොලැබේ.

අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා ලියා නොමැති නමුත් සම්පූර්ණ නිවැරදි ප්‍රතික්‍රියාව පමණක් දී ඇති නම්, මුළු ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න. i.e. (03 + 03 + 04)

(8 (b) (ii) සඳහා ලකුණු 24)




හෝ




(8 (b) (iii) සඳහා ලකුණු 16)

(8 (b) සඳහා ලකුණු 50)



සටහන : ඉහත ගණනය කිරීම සඳහා $\text{H}^+ \equiv \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ සම්බන්ධය ද භාවිත කළ හැකි ය.

(8 (c) (i) සඳහා ලකුණු 16)



NaOH හා Na_2CO_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය HCl මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{0.25}{1000} \times 32.0$ (03)

NaOH සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය HCl මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{0.25}{1000} \times 24.0$ (03)

එබැවින්, Na_2CO_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය HCl මවුල ප්‍රමාණය

= $\frac{0.25}{1000} \times 32.0 - \frac{0.25}{1000} \times 24.0$ (03)

= 0.008 - 0.006

= 0.002 (03)

එබැවින්, 25.0 cm³ හි Na_2CO_3 මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{0.002}{2}$ (03)

500.0 cm³ හි Na_2CO_3 මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{0.002 \times 20}{2} = 0.02$ (03)

Na_2CO_3 හි අණුක ස්කන්ධය = 106 g mol⁻¹

Na_2CO_3 හි ස්කන්ධය = 0.02 × 106 = 2.12 g (03)

නියැදියේ අඩංගු % Na_2CO_3 = $\frac{2.12}{42.4} \times 100\%$ (03)

= **5.0 %** (03)

(8 (c) (ii) සඳහා ලකුණු 29)

(iii) උපකල්පනය / උපකල්පන - වැඩිපුර BaCl_2 එක් කිරීමෙන් ද්‍රාවණයේ අඩංගු කාබනේට් සියල්ල ම BaCO_3 ලෙස අවක්ෂේප වේ.

(8 (c) (iii) සඳහා ලකුණු 05)


(8 (c) සඳහා ලකුණු 50)

(8 සඳහා මුළු ලකුණු 150)


09 ප්‍රශ්නය



9. (a) (i) I. ස්පර්ශ ක්‍රමය (*Contact Process*) මගින් H_2SO_4 නිෂ්පාදනය කිරීමේ දී උපයෝගී වන පියවර, ප්‍රතික්‍රියා තත්ත්ව සහිත තුලිත රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උපකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.
- II. මෙම ක්‍රමයට අදාළ භෞතික රසායන මූලධර්ම කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
- III. H_2SO_4 හි භාවිත දෙකක් දෙන්න.
- (ii) පහත පරිවර්තන කාර්මික ලෙස කළ හැක්කේ කෙසේ දැයි තුලිත රසායනික ප්‍රතික්‍රියා භාවිතයෙන් පෙන්වන්න.
- I. $C_2H_2 \rightarrow C_2H_4$
- II. $N_2 \rightarrow NaNO_2$
- සැ.ගු.: අදාළ අවස්ථාවන්හි ප්‍රතික්‍රියා තත්ත්ව දී ප්‍රතිකාරක / ප්‍රතික්‍රියක කාර්මික ලෙස ලබා ගන්නා අන්දම දක්වන්න.
- (iii) පහත දී ඇති ප්‍රශ්න සොල්වි ක්‍රමය (*Solvay Process*) මගින් Na_2CO_3 නිෂ්පාදනය කිරීම මත පදනම් වී ඇත.
- I. මෙම ක්‍රමයේ දී භාවිත කරන ආරම්භක ද්‍රව්‍ය සඳහන් කරන්න.
- II. I හි සඳහන් ද්‍රව්‍ය (*materials*) ලබා ගන්නේ කෙසේ දැයි දක්වන්න.
- III. මෙම ක්‍රමයේ දී ලැබෙන අවසාන අතුරු ඵලය දෙන්න.
- IV. මෙම ක්‍රමයේ දී අඩු උෂ්ණත්ව භාවිත කිරීම සඳහා හේතු දෙකක් දෙන්න.
- V. Na_2CO_3 හි භාවිත දෙකක් දෙන්න.
- VI. මුහුදු ජලය ස්වභාවික සම්පතක් ලෙස භාවිත කර III හි සඳහන් අවසාන අතුරු ඵලය, ඊස්සම් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න. (ඉකුත් 7.5 ලී.)

- (b) ඕසෝන් ස්ථරය ක්ෂය වීම අඩු කිරීම සඳහා ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් (CFCs) වලට ආදේශකයක් ලෙස හයිඩ්‍රෝක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් (HCFCs) හඳුන්වා දෙන ලදී. එනමුදු මෙම සංයෝග කාණ්ඩ දෙක ම ඕසෝන් ස්ථරය ක්ෂය කරනවා මෙන් ම අනෙකුත් පාරිසරික ප්‍රශ්නවලට ද දායක වේ.
- (i) තනි C පරමාණුවක් සහිත පියලුම CFCs හා HCFCs වල රසායනික ව්‍යුහ අදින්න. එකිනෙක CFC හෝ HCFC ලෙස නම් කරන්න.
- (ii) "සාමාන්‍ය වායුගෝලීය තත්ත්ව යටතේ HCFCs, CFCs වලට වඩා ප්‍රතික්‍රියාශීලී ය." මේ ප්‍රකාශය පිළිබඳ ව අදහස් දක්වන්න.
- (iii) CFCs හා HCFCs ආශ්‍රිත තවත් පාරිසරික ප්‍රශ්නයක් නම් කරන්න. මෙම පාරිසරික ප්‍රශ්නය කෙරෙහි ඒවායේ සාපේක්ෂිත දායකත්වය ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න.
- (iv) CFCs ශීතකාරක ලෙස භාවිත කිරීමට සුදුසු වීම සඳහා ඒවායේ ගුණ ඉහත් හඳුනා ගන්න.
- (v) ඕසෝන් ස්ථරය ක්ෂය වීම සඳහා CFCs දායක වන්නේ කෙසේදැයි පහදන්න.
- (vi) ඕසෝන් ස්ථරය ක්ෂය වීමේ ආදීනවය කෙටියෙන් පහදමින්, ඒ හා ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න ඉහත් හඳුනා ගන්න. (ඉකුත් 7.5 ලී.)



SO_2 නිෂ්පාදනය කිරීමේ දී වෙනත් ක්‍රම ද පිළිගත හැක.





සටහන : භෞතික අවස්ථා අවශ්‍ය නැත. **(9 (a) (i) (I) සඳහා ලකුණු 12)**

II. SO_2 හා O_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාව ප්‍රතිවර්තය **(01)** හා තාපදායක **(01)** වන අතර ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ දී අණු සංඛ්‍යාව අඩු වේ. **(01)** ලේඛනවලින් මූලධර්මයට අනුව **(01)** අඩු උෂ්ණත්ව **(01)** හා ඉහළ පීඩන **(01)** ප්‍රතික්‍රියාවට හිතකර වේ.

ඉහළ පීඩන භාවිතයෙන් ප්‍රතික්‍රියා ඉදිරියට යොමු කළ හැකි වුවත් එයින් ලැබෙන සුළු ප්‍රතිලාභය ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන උපකරණය සඳහා දැරිය යුතු අධික පිරිවැය නිසා ප්‍රයෝජනවත් නොවේ. **(01)** එබැවින් 1 - 2 atm පීඩන භාවිත වේ.

අඩු උෂ්ණත්වවල දී ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය අඩු **(01)**. පිළිගත හැකි ශීඝ්‍රතාවක් ලබා ගැනීම සඳහා 450 °C උෂ්ණත්වයක් භාවිත වේ. **(01)** සමතුලිත අවස්ථාවට ඉක්මනින් එළඹීම සඳහා **(01)** හා ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව වැඩි කිරීම සඳහා **(01)** උත්ප්‍රේරකයක් (V_2O_5), භාවිත වේ.


(9 (a) (i) (II) සඳහා ලකුණු 11)

III. පොහොර නිෂ්පාදයේ දී	රසායන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදයේ දී
වර්ණක (dyes) නිෂ්පාදනයේ දී	ඖෂධ නිෂ්පාදනයේ දී
පුපුරන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයේ දී	රථාවහන බැටරිවල / බැටරි
	අම්ල
ක්ෂාලක නිෂ්පාදනයේ දී	ලෝහ නිධිවලින් ලෝහ ලබා
	ගැනීමේ දී
මක්ෂිකාරකයක්	විජලකාරකයක් ලෙස
කෘතීම කෙඳි නිෂ්පාදනයේ දී	ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනයේ දී
තීන්ත හා වර්ණක (pigments) නිෂ්පාදනයේ දී	පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදු කිරීමේ දී
(වායු) වියලුම්කාරකයක්	

(ඕනෑම දෙකක් සඳහා 01 x 2 = 02)

(9 (a) (i) (III) සඳහා ලකුණු 02)

(9 (a) (i) සඳහා ලකුණු 25)



හෝ



(9 (a) (ii) (I) සඳහා ලකුණු 08)

(iii) I. ඔයින් (සාන්ද්‍ර NaCl ද්‍රාවණයක්) NH₃ හා CO₂ (02 + 02 + 02)

II. ඔයින් - මුහුදු ජලයෙන් (02)

NH₃ - හේබර් ක්‍රමයෙන් (02)

CO₂ - හුණුගල්වලින් (02)

III. CaCl₂ (02)

IV. - NaHCO₃ අවකේෂප කිරීම සඳහා (02)

- ඔයින් හි වායු ද්‍රවණය කිරීමට (02)

V. - විදුරු ක්‍ෂාලක, සබන්, සෝඩියම් සිලිකේට් හා කඩදාසි නිෂ්පාදනයේ දී


- කඩින ජලය මෘදු කිරීම සඳහා, ක්‍ෂාලකවල දෙවුම් සෝඩා / රෙදි සෝඩා ලෙස කාච ජලය සෑදීම / ගිනි නිවීමේ කාරකයක්

(මින් ඕනෑම දෙකක් 02 + 02)

VI. මුහුදු ජලයෙන් NaCl අවකේෂප කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වන මව් ද්‍රාවණයට

(mother liquor) CaCl₂ එක් කරනු ලැබේ. (01)

SO₄²⁻ සඳහා හොඳ ප්‍රභවයකි. (01)




(01)


(9 (a) (iii) සඳහා ලකුණු 25)

(9 (a) සඳහා ලකුණු 75)


(b) (i)




CFC




CFC




CFC



HCFC



HCFC



HCFC

(03 × 6 = 18)

(ව්‍යුහය පමණක් නම් 02, ව්‍යුහය හා හඳුනාගැනීම සඳහා 03)

(9 (b) (i) සඳහා ලකුණු 18)

(ii) ප්‍රකාශය නිවැරදි ය. (03)

C-F සහ C-Cl බන්ධනවලට සාපේක්ෂ ව C-H දුර්වල බන්ධනයකි. (03)

පාරිසරික රසායන හමුවේ ප්‍රතික්‍රියාවට භාජන වේ. (03)

(9 (b) (ii) සඳහා ලකුණු 09)

(iii) මිහිතලයේ උණුසුම් වීම. (03) CFC හා HCFCs යන දෙවර්ගය ම හරිතාගාර වායු (03)

වන අතර එමගින් වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වේ. (03) HCFCs ප්‍රතික්‍රියාශීලී නිසා

ඒවායේ වායුගෝලයේ ජීව කාලය අඩු ය. (03) එම නිසා මිහිතලය උණුසුම් වීමට දක්වන



දායකත්වය CFCs වලට වඩා අඩු ය. (03)

(9 (b) (iii) සඳහා ලකුණු 15)

- (iv) රසායනික ව ප්‍රතික්‍රියාශීලී නැත - ආහාරවලට හානි නොකරයි.
 භෞතික ව නිෂ්ක්‍රියයි - පරිභෝජනය කළත් හානිකර නොවේ.
 ගිනි නොගන්නා සුලු බව - ආරක්ෂිතයි.
 පහසුවෙන් සංකෝචනය හා - හොදින් ශීතකරණය කරයි.
 ප්‍රසාරණය කළ හැකි ය -
 අඩු දුස්ස්‍රාවිතාව - පහසුවෙන් සංසරණය කළ හැකි ය.
 අඩු තාපාංක - කාමර උෂ්ණත්වයේ දී වායු වේ.
 ඉහළ තාප ධාරිතාව

(ඕනෑම 03ක් 03 × 3 = 09)
(9 (b) (iv) සඳහා ලකුණු 09)

- (v) ඉහළ මට්ටම්වලදී CFCs, UV කිරණවලට නිරාවරණය වේ. UV කිරණ හමුවේ දී C-Cl හෝ C-F බන්ධන කැඩී (03) ක්ලෝරීන් (ජලුවොරීන්) මුක්ත බන්ධක සාදයි. (03) මෙම මුක්ත බන්ධක ඕසෝන් විනාශ කිරීම උත්ප්‍රේරණය කරයි. (03) මෙමගින් ඕසෝන් ස්තරය ක්ෂය වේ. (03)
 ඉහත පළමු ලකුණු 09 පහත දැක්වා ඇති ආකාරයට ද දැක්විය හැකි ය.



(9 (b) (v) සඳහා ලකුණු 12)

- (vi) ඕසෝන් ස්තරය ක්ෂයවීම නිසා UV කිරණ පොළොව කරා ළඟා වේ. (03) පාරජම්බුල කිරණ පහත දැක්වෙන ගැටලුවලට හේතු වේ.
 වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම.
 පොළොව මට්ටමේ දී ඕසෝන් සෑදීම.
 ඇසේ සුද ඇති වීම.
 හමේ පිළිකා ඇති වීම.
 වගාවන්ට හානි පැමිණවීම.

(ඕනෑ ම තුනක් සඳහා ලකුණු 03 බැගින්)






(9 (b) (vi) සඳහා ලකුණු 12)

(9 (b) සඳහා මුළු ලකුණු 75)

(9 සඳහා මුළු ලකුණු 100)

10 ප්‍රශ්නය

10. (a) පහත ප්‍රතික්‍රියා සඳහා එල පුරෝකථනය කර, තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න. ප්‍රතික්‍රියාවේ දී යටින් ඉරි ඇඳ ඇති විශේෂයේ ක්‍රියාව සඳහන් කරන්න.



(ඥාන 2.5 ක්.)

(b) T ද්‍රාවණය පිළියෙළ කර ඇත්තේ FeC_2O_4 0.300 g, තනුක H_2SO_4 හි ද්‍රාවණය කිරීමෙනි. ද්‍රාවණය 65°C දක්වා රත් කරන ලදී. මෙම තත්ත්ව යටතේ දී, FeC_2O_4 සමග සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය $0.025 \text{ mol dm}^{-3}$ KMnO_4 ද්‍රාවණයේ පරිමාව ගණනය කරන්න.

(C = 12, O = 16, Fe = 56)

සැ.යු. : T ද්‍රාවණයේ දී FeC_2O_4 , Fe^{2+} සහ $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ලෙස පවතී යයි සලකන්න.

(ඥාන 5.0 ක්.)

(c) ද්‍රවීකරණය කරන ලද පෙට්‍රෝලියම් වායුව (*LP gas*) ආහාර පිපීමේ දී ඉන්ධනයක් ලෙස බහුල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත වේ. එය අධි ජීවිතය යටතේ ඇති ද්‍රවීකරණය කරන ලද ප්‍රොපේන් හා බියුටේන්වල මිශ්‍රණයකි. පහත දත්ත සපයා ඇත.

ද්‍රව්‍යය	සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ΔH_f° , 25°C හිදී (kJ mol^{-1})
$\text{H}_2\text{O}(l)$	-286
$\text{CO}_2(g)$	-394
$\text{C}_3\text{H}_8(g)$	-104
$\text{C}_4\text{H}_{10}(g)$	-126

(i) 25°C හි දී ප්‍රොපේන් හා බියුටේන් වායුවල සම්මත දහන එන්තැල්පි අගයන් ගණනය කරන්න.

(ii) ජලය 400 g ක උෂ්ණත්වය 25°C සිට 85°C දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාප ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න (ජලයේ තාප ධාරිතාව $4.2 \text{ J g}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ වේ).

(iii) පූර්ණ දහනය වීමක් සිදු වන බව උපකල්පනය කරමින්, ඉහත (ii) ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට

I. ප්‍රොපේන් ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිත කළේ නම්,

II. බියුටේන් ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිත කළේ නම්,

පිටවන CO_2 ස්කන්ධයන් වෙන වෙනම ගණනය කරන්න.

(iv) ඉහත (iii) හි ඔබගේ ගණනය කිරීම් පදනම් කර ගනිමින් මින් කුමන ඉන්ධනය වඩා පරිසර හිතකාමී දැයි හඳුනාගෙන, එය එසේ වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.


(ඥාන 7.5 ක්.)



ඔක්සිකාරකයක් හෝ ඔක්සිකරණය වේ. (01)




ඔක්සිහාරකයක් හෝ ඔක්සිකරණය වේ. (01)



ඔක්සිහාරකයක් හෝ ඔක්සිකරණය වේ. (01)



ඔක්සිකාරකයක් හෝ ඔක්සිහරණය වේ හෝ අම්ලයක් ලෙස (01)



ඔක්සිකාරකයක් හෝ ඔක්සිහරණය වේ (01)

(10 (a) සඳහා ලකුණු 25)

(b) 1 ක්‍රමය

සිදුවන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා



FeC_2O_4 මවුලයක ස්කන්ධය = 144 g

FeC_2O_4 හි මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{0.300\text{g}}{144\text{g}}$ (03)

Fe^{2+} හි මවුල ප්‍රමාණය = $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ හි මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{0.300\text{g}}{144\text{g}} = 2.08 \times 10^{-3}$ (03)

KMnO_4 හි පරිමාව $V\text{ cm}^3$ ලෙස සැලකීමෙන්



MnO_4^- හි මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{0.025}{1000} \times V$ (03)

එබැවින්, Fe^{2+} හි මවුල ප්‍රමාණය = $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ හි මවුල ප්‍රමාණය = $\frac{0.025}{1000} \times V \times \frac{5}{3}$ (03 + 03 + 09)

= $\frac{0.025}{1000} \times V \times \frac{5}{3} = 2.08 \times 10^{-3}$ (07)

$V = 50.0\text{ cm}^3$ (04 + 01)

2 ක්‍රමය



$$\text{Fe}^{2+} \text{ හි මවුල ප්‍රමාණය} = \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ හි මවුල ප්‍රමාණය} = \frac{0.300\text{g}}{144\text{g}} = 2.08 \times 10^{-3} \quad (03 + 03)$$

(1) ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා MnO_4^- පරිමාව $V_1 \text{ cm}^3$ ලෙස සැලකීමෙන්

$$\text{MnO}_4^- \text{ හි මවුල ප්‍රමාණය} = \frac{0.025}{1000} \times V_1 \quad (03)$$

$$\text{එබැවින්, Fe}^{2+} \text{ හි මවුල ප්‍රමාණය} = \frac{0.025}{1000} \times V_1 \times 5 \quad (03)$$

$$= \frac{0.025}{1000} \times V_1 \times 5 = 2.08 \times 10^{-3} \quad (03)$$

$$V_1 = 16.67 \text{ cm}^3 \approx 16.7 \text{ cm}^3 \quad (03)$$

(2) ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා MnO_4^- පරිමාව $V_2 \text{ cm}^3$ ලෙස සැලකීමෙන්

$$\text{MnO}_4^- \text{ හි මවුල ප්‍රමාණය} = \frac{0.025}{1000} \times V_2 \quad (03)$$

$$\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ හි මවුල ප්‍රමාණය} = \frac{0.025}{1000} \times V_2 \times \frac{5}{2} \quad (03)$$


$$= \frac{0.025}{1000} \times V_2 \times \frac{5}{2} = 2.08 \times 10^{-3} \quad (03)$$

$$V_2 = 33.28 \text{ cm}^3 \approx 33.3 \text{ cm}^3 \quad (03)$$

$$\text{මුළු පරිමාව} = 16.67 \text{ cm}^3 + 33.28 \text{ cm}^3 \quad (01)$$

$$= 50.0 \text{ cm}^3 \quad (04 + 01)$$

හෝ





$$\Delta H_4 = 4(-286 \text{ kJ mol}^{-1}) + 3(-394 \text{ kJ mol}^{-1}) - (-104 \text{ kJ mol}^{-1})$$

$$(01 + 01) \quad (01 + 01) \quad (01 + 01)$$

(හෝ නිවැරදි එන්තැල්පි වෙනස්කම් රූපයේ දැක්වීම)

$$= -2222 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (02 + 01)$$

බියුටේන් දහනය සඳහා




$$\Delta H_4 = 5 \Delta H_1 + 4 \Delta H_2 - \Delta H_3$$

$$\Delta H_4 = 5(-286 \text{ kJ mol}^{-1}) + 4(-394 \text{ kJ mol}^{-1}) - (-126 \text{ kJ mol}^{-1})$$

$$(01 + 01) \quad (01 + 01) \quad (01 + 01)$$

$$= -2880 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (02 + 01)$$


හෝ



$$\Delta H_4 = 5 \Delta H_1 + 4 \Delta H_2 - \Delta H_3$$

$$= -2880 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (02 + 01)$$

හෝ



$$\Delta H_4 = 5 (-286 \text{ kJ mol}^{-1}) + 3 (-394 \text{ kJ mol}^{-1}) - (-126 \text{ kJ mol}^{-1})$$

(01 + 01) (01 + 01) (01 + 01)

(හෝ නිවැරදි එන්තැල්පි වෙනස්කම් රූපයේ දැක්වීම)

$$= -2880 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (02 + 01)$$

(10 (c) (i) සඳහා ලකුණු 30)

(ii) ජලය 400gක උෂ්ණත්වය 25 °C සිට 85 °C දක්වා වැඩිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාප ප්‍රමාණය

$$q = 400 \text{ g} \times 4.2 \text{ J g}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} \times (85 - 25) \text{ } ^\circ\text{C} \quad (04 + 01)$$

$$= 100.8 \text{ kJ} \quad (04 + 01)$$

(10 (c) (ii) සඳහා ලකුණු 10)

(iii) එම තාප ප්‍රමාණය නිපදවීමට අවශ්‍ය ප්‍රොපේන් ප්‍රමාණය

$$= 1/2222 \text{ kJ mol}^{-1} \times 100.8 \text{ kJ} = 4.54 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad (04 + 01)$$

$$\text{විමෝචනය වන CO}_2 \text{ ප්‍රමාණය} = 4.54 \times 10^{-2} \text{ mol} \times 3 = 1.36 \times 10^{-1} \text{ mol} \quad (04 + 01)$$

$$\text{විමෝචනය වන CO}_2 \text{ ස්කන්ධය} = 1.36 \times 10^{-1} \text{ mol} \times 44 \text{ g mol}^{-1} = 5.98 \text{ g} \quad (04 + 01)$$

එම තාප ප්‍රමාණය නිපදවීමට අවශ්‍ය බියුටේන් ප්‍රමාණය

$$= 1/2880 \text{ kJ mol}^{-1} \times 100.8 \text{ kJ} = 3.50 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad (04 + 01)$$

$$\text{විමෝචනය වන CO}_2 \text{ ප්‍රමාණය} = 3.50 \times 10^{-2} \text{ mol} \times 4 = 1.40 \times 10^{-1} \text{ mol} \quad (04 + 01)$$

$$\text{විමෝචනය වන CO}_2 \text{ ස්කන්ධය} = 1.40 \times 10^{-1} \text{ mol} \times 44 \text{ g mol}^{-1} = 6.16 \text{ g} \quad (04 + 01)$$

(10 (c) (iii) සඳහා ලකුණු 30)

(iv) එකම තාප ප්‍රමාණයක් නිපදවීමේ දී ප්‍රොපේන්වලින් විමෝචනය වන CO₂ ප්‍රමාණය

සාපේක්ෂ ව අඩු බැවින් එය පාරිසරික ව වඩා යෝග්‍ය වේ. (05)

(10 (c) (iii) සඳහා ලකුණු 05)

(10 (c) සඳහා මුළු ලකුණු 75)

10 සඳහා මුළු ලකුණු 150



LOL.Ik
Learn Ordinary Level

විභාග ඉලක්ක පහසුවෙන් ජයගන්න පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර



• Past Papers • Model Papers • Resource Books
for G.C.E O/L and A/L Exams



විභාග ඉලක්ක ජයගන්න
Knowledge Bank



Master Guide

WWW.LOL.LK



Whatsapp contact
+94 71 777 4440

Website
www.lol.lk

 **Order via
WhatsApp**

071 777 4440