

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව / இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் / Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 1997 අගෝස්තු (නව නිර්දේශය)
கல்விப் பொதுத் தராதரப்பத்திர(உயர் தர)ப் பரீட்சை, 1997 ஓகஸ்ட் (புதிய பாடத்திட்டம்)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 1997 (New Syllabus)

ව්‍යවහාරික ගණිතය I

பிரயோக கணிதம் I

Applied Mathematics I

06

S

I

පැය තුනයි / மூன்று மணி / Three hours

ප්‍රශ්න හයකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

අවශ්‍ය තත්ති දී ගුරුත්වජ ත්වරණය $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ ලෙස ගන්න.

1. කාලය $t = 0$ වන මොහොතේ දී බර අංශුවක් පොළවේ සිට u ප්‍රවේගයක් සහිත ව පිරිස් ලෙස උඩු අතට ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. අංශුව හා පොළොව අතර ප්‍රත්‍යාගතිය සංගුණකය e (< 1) නම්, $t \geq 0$ වන සියලු t අගයන් සලකා අංශුවේ චලිතය සඳහා ත්වරණ-කාල චක්‍රයේ ප්‍රවේග-කාල චක්‍රයේ දළ සටහන් අඳින්න.

- (අ) අංශුව පළමු වරට ඉහළ නැගීමත් හා පහළ බසීමත් කිහිප වීම පොළොවට ඉහළින් h උසක පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකට පසු කර යන්නේ t_1, t_2 වේලාවන්හි දී නම්,

$$t_1 t_2 = \frac{2h}{g}$$

බව පෙන්වන්න.

- (ආ) අංශුව නිශ්චලතාවට පැමිණීමට පෙර මග ගෙවා යන මුළු දුර ප්‍රවේග-කාල චක්‍රය භාවිතයෙන් සොයා සම්පූර්ණ චලිත කාලය තුළ අංශුවේ මධ්‍යක වේගය

$$\frac{u}{2(1+e)}$$

බව අපෝහනය කරන්න.

2. O නම් ලක්ෂ්‍යයක සිට නිරයට α කෝණයකින් u ආරම්භක ප්‍රවේගයක් සහිත ව ගුරුත්වය යටතේ අංශුවක් ප්‍රක්ෂේප කර ඇත්තේ, O මූලය යටුදායෙහි නිරය හා පිරිස් බන්ධාංක පිළිවෙලින් x හා y ලෙස පිහිටන P නම් ලක්ෂ්‍යයක් කරනා යන පරිදි ය.

$$y = x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{g x^2}{u^2} \sec^2 \alpha$$

බව පෙන්වන්න.

- P හි දී අංශුවේ පෙහෙහි දිශාව නිරය සමග β කෝණයක් සාදයි නම්

$$\tan \alpha + \tan \beta = \frac{2y}{x}$$

බව අපෝහනය කරන්න.

- P හරහා යන අංශුවට සිතිය හැකි මාර්ග දෙකක් වෙයි නම් හා P හි දී මෙම මාර්ග දෙක අතර කෝණය සාප්තකෝණයක් වෙයි නම්

$$x^2 + 2y^2 - \frac{u^2}{g} y = 0$$

බව සාධනය කරන්න.

(අ) P හා Q නම් කුඩා විදුරු බෝල දෙකක් පිළිවෙලින් $3i - j$ හා $ai - 3j$ ප්‍රවේග සහිතව Oxy තලයේ චලනය වෙමින් පවතී. මෙහි a යනු නියතයක් ද, i, j යනු පිළිවෙලින් Ox හා Oy අක්ෂ මස්ථයේ පිහිටන ඒකක දෘශික ද වේ. $t = 0$ වේලාවේ දී $A = (-3, -2)$ ලක්ෂ්‍යයෙහි P පිහිටන අතර $B = (2, 8)$ ලක්ෂ්‍යයෙහි Q පිහිටයි.

Q ට සාපේක්ෂව P හි පෙහෙහි සමීකරණයක් මෙම චලිතයේ දී විදුරු බෝල දෙක අතර ඇති වන කෙටිම දුරක් සොයන්න. එනමින් Q සමඟ P ගැටීම පිළි විය හැක්කේ $a = 2$ ම නම් පමණක් බව අපෝහනය කරන්න.

(ආ) m ස්කන්ධයෙන් යුතු අංශුවක් තොළොවේ සිට නිරන්තර ලෙස උඩු අතර μ ප්‍රවේගයකින් ප්‍රක්ෂේපණය කරනු ලැබේ. අංශුවෙහි මුළු ශක්තිය සමීපරණ චලිතය මස්ථය ම සංස්ථිතව පවතින බව පෙන්වන්න.

ස්කන්ධය M හා ආනතිය α ($< \frac{\pi}{2}$) වන කුඳුන්දයක් සර්ඝය සංශුණනය μ ($< \tan \alpha$) වන රළු තිරස් තලයක් මත තබා ඇත. ස්කන්ධය kM ($k \geq 1$) වන පුළුටු අංශුවක් කුඳුන්දයේ මුහුණත මත වැටීමේ බැවුම් රේඛාව දිගේ V ප්‍රවේගයකින් උඩු අතට ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. කුඳුන්දය චලනය වෙයි නම්, ඔහු ම මොහොතක අංශුව හා කුඳුන්දය අතර ප්‍රතික්‍රියාව

$$\frac{kMg(\cos \alpha + \mu \sin \alpha)}{1 + k \sin^2 \alpha - \mu k \sin \alpha \cos \alpha}$$

බව පෙන්වන්න.

T කාලයක දී අංශුව ප්‍රක්ෂේපණ ලක්ෂ්‍යය වෙත ආපසු පැමිණෙන්නේ නම්, μ සොයන්න.

$$\mu = \frac{1}{2} \tan \alpha \quad \text{නම්,}$$

$$T \geq \frac{4\sqrt{2}V}{g} \left[\frac{1}{k^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{k^{-\frac{1}{2}}} \right]^{-1}$$

බව අපෝහනය කරන්න.

m ස්කන්ධයකින් යුතු P නම් අංශුවක් පුළුටු තිරස් මේසයක් මත තබා, මේසය මත A, B, C නම් ලක්ෂ්‍ය තුනකට එය ඇදා ඇත්තේ ස්වභාවික දිග පිළිවෙලින් l_1, l_2, l_3 ද මාපාංක පිළිවෙලින් $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ද වන තන්තු තුනක් මගිනි.

ABC යනු පාදයක දිග a සහිත සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නම් ද, ත්‍රිකෝණයේ G කේන්ද්‍රයෙහි අංශුවට සමතුලිත ව නිශ්චලතාවේ පිහිටිය හැකි නම් ද

$$a \left(\frac{\lambda_1}{l_1} - \frac{\lambda_2}{l_2} \right) = (\lambda_1 - \lambda_2) \sqrt{3} \quad \text{බවත්,}$$

$$a \left(\frac{\lambda_2}{l_2} - \frac{\lambda_3}{l_3} \right) = (\lambda_2 - \lambda_3) \sqrt{3} \quad \text{බවත්}$$

පෙන්වන්න.

$\lambda_2 = \lambda_3$ ලෙස ගෙන, a හා සසඳා දෙන විට x නම් කුඩා දුරකින් අංශුව $\overline{AG}$ මස්ථයේ BC පාදය වෙතට විස්ථාපනය කොට නිශ්චලතාවේ සිට මුදු හැරීමේ නම්, මෙවිට

$$\frac{\lambda_1}{l_1} \left(\frac{a}{\sqrt{3}} + x - l_1 \right) + \frac{2\lambda_2}{l_2} (BP - l_2) \cos \widehat{APB} + m \frac{d^2x}{dt^2} = 0$$

බව පෙන්වන්න.

$\frac{x}{a}$ හි එකකට වඩා වැඩි බලයක් නොසලකා හැරීමෙන්

$$BP = \frac{a}{\sqrt{3}} - \frac{x}{2} \quad \text{බවත්}$$

$$\cos \widehat{APB} = \frac{3\sqrt{3}}{4a} x - \frac{1}{2} \quad \text{බවත්}$$

පෙන්වන්න.

$$\text{එනමින්,} \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2} + 2 \frac{l_1}{l_2} > \frac{3\sqrt{3}}{2a} l_1 \quad \text{බව දී ඇත්නම්,}$$

කුඩා x අගයන් සඳහා P අංශුවේ චලිතය සරල අනුවර්තී බව අපෝහනය කරන්න.

6. දෘඩ වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන සමාන්තර නොවන ඒකාකාර බල තුනක් මගින් එම වස්තුව සමතුලිතතාවේ පිහිටයි නම් එම බල තුන ලක්ෂණයක දී හමු විය යුතු බව පෙන්වන්න.

A සහ B කේන්ද්‍ර සහිතව වෙනස් දරයන් ඇති එක එකෙහි බර W වන ප්‍රමුඛ ඒකාකාර ගෝල දෙකක්, ශීර්ෂය යටි අතට සිටින සේ අවල ව. තබා ඇති ප්‍රමුඛ සෘජු වෘත්තාකාර තුනර කේතුවක් ඇතුළත සමතුලිතතාවේ පවතින්නේ එක් එක් ගෝලය

එක් ලක්ෂණයක දී පමණක් කේතුව ස්පර්ශ කරන පරිදි ය. කේතුවේ අඩ-පිරස් කෝණය $\frac{\pi}{3}$ වන අතර එහි අක්ෂය පිරස සමග β ($< \frac{\pi}{6}$) කෝණයක් සාදයි. AB රේඛාව උඩු පිරස සමග θ කෝණයක් සාදයි නම්,

$$\theta = \tan^{-1} \left(\cot 2\beta - \frac{1}{2} \operatorname{cosec} 2\beta \right)$$

බව පෙන්වන්න.

කේතුවේ පැතිවල ප්‍රතික්‍රියා සොයන්න.

7. (අ) $A_i \equiv (x_i, y_i)$ හි දී xOy තලයේ ක්‍රියා කරන (X_i, Y_i) යනුවෙන් සමන්විත බල පද්ධතියක් සාධාරණ ලෙසින් G_0 යුග්මයක් සමග O හි දී ක්‍රියා කරන (X_0, Y_0) තනි බලයට උභතය කළ හැකි බව පෙන්වන්න; මෙහි $i = 1, 2, \dots, n$ වේ,

$X_0^2 + Y_0^2 \neq 0$ නම්, පද්ධතිය R යනුවෙන් දක්වන තනි සම්ප්‍රසූක්ත බලයකට තුල්‍ය වන බව පෙන්වන්න.

R බලය $(-1, -1)$ හා $(4, -2)$ ලක්ෂණ හරහා යන්නේ නම් සහ $|R| = \frac{1}{2}$ බව ද සිතන විට X_0, Y_0 හා G_0 සොයන්න.

- (ආ) පද්ධතියක්, BC, CA, AB රේඛා දිගේ එම අකුරුවල අනුපිළිවෙලට පෙන්නුම් කෙරෙන දිසා ඔස්සේ ක්‍රියා කරන $P, \lambda P, \lambda^2 P$ බල තුනකින් සමන්විත වේ. සම්ප්‍රසූක්ත බලය ABC පූර්ණකෝණීය ත්‍රිකෝණයේ ලම්බකේන්ද්‍රය හරහා යයි නම්,

$$\frac{1}{\cos A} + \frac{\lambda}{\cos B} = \frac{\lambda^2}{\cos(A+B)}$$

බව පෙන්වන්න.

λ අනිවාර්යයෙන්ම සෘණ විය යුතු බව අපෝහණය කරන්න.

8. ඒකාකාර ප්‍රමුඛ දණ්ඩක් AB, BC හා CD නම් කැලි තුනකට කපා ඇත්තේ ඒවායේ දිග පිළිවෙලින් $l, 2l$ හා l වන පරිදි ය. මේවා B හි දික් C හි දික් ප්‍රමුඛ ලෙස යන්ඩි කොට කේන්ද්‍රය O හා අරය $2l$ වන අවල ප්‍රමුඛ ගෝලයක් මත නිශ්චලතාවේ තබා ඇත්තේ BC හි මධ්‍ය ලක්ෂණයක් A හා D අතර දෙකක් ගෝලය ස්පර්ශ කෙරෙන පරිදි ය. BC දණ්ඩ මත එහි මධ්‍ය ලක්ෂණයේ දී ප්‍රතික්‍රියාව $\frac{91W}{100}$ බව පෙන්වන්න; මෙහි W යනු දණ්ඩෙහි බර වේ.

C සන්ධියේ දී CD දණ්ඩ මත ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වය හා දිශාවක් එහි ක්‍රියා රේඛාවට OD හමු වන ලක්ෂණයක් සොයන්න.

9. h උසැති ඒකාකාර සෘජු වෘත්තාකාර සහ කේතුවක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කේතුවේ ශීර්ෂයේ සිට $\frac{3}{4}h$ දුරෙහිත් අක්ෂය මත පිහිටන බව පෙන්වන්න.

අරය r ද උස h ද වන ඒකාකාර සහ සෘජු වෘත්තාකාර පිලිත්තරයක් සිදුරු කර හැරීමෙන් අරය r හා උස $\frac{h}{2}$ වන සහ සෘජු වෘත්තාකාර කේතුවක් ඉවත් කරනු ලබන්නේ කේතුවේ ආධාරකය පිලිත්තරයේ එක් කෙළවරක් සමග සම්පාත වන පරිදි ය. ඉතිරි වෙන කොටසේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කේතුවේ ආධාරකයේ සිට අක්ෂය මත $\frac{23}{40}h$ දුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.

භාරත ලද පිලිත්තරය එහි ආධාරකය ශීර්ෂ තලයක් මත පිහිටන සේ තබනු ලැබේ. මෙම තලය ක්‍රමයෙන් උඩු අතට ඇල කෙරෙන විට ලිස්සා යාම් වැලැක්වීමට ප්‍රමාණවත් පරිදි තලය රළු නම්, භාරත ලද පිලිත්තරය ඇද වැටීම සඳහා ශීර්ෂ සමග තලයට සිසිය යුතු අඩු ම ආනතිය සොයන්න.

[අනෙක් පිට බලන්න.

10. AB, BC, CA, CD, DA යනු දිගු පහසු ඒවායේ A, B, C, D අන්තවල දී සුවල ලෙස සන්ධි කිරීමෙන් ලබා ගත් රාමු පැතිල්ලක් සිරස් තලයක තබා ඇත්තේ AB සිරස් ලෙසත් AC සිරස් ලෙසත් පිහිටන පරිදි ය.

මෙහි $AB = AC = 10$; $\widehat{BAD} = \frac{3\pi}{4}$ හා $\widehat{ACD} = \frac{2\pi}{3}$ වේ. රාමුපැතිල්ල D හි දී $1N$ සිරස් භාරයක් දරන අතර සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනෙන්නේ පිළිවෙළින් A හි දීත් B හි දීත් යෙදෙන P හා Q විශාලත්ව ඇති සිරස් බල දෙකක් මගිනි. $Q = \frac{1}{2} (3 + \sqrt{3}) N = 2.37 N$ බව පෙන්වන්න.

බෝ අංකනය භාවිත කොට මෙම රාමුපැතිල්ල සඳහා ප්‍රත්‍යාබල රූප සටහනක් අඳින්න. එනමින් දිගු පහසු ප්‍රත්‍යාබල නිර්ණය කොට ඒවා ආකෘතිද කෙරුම් ද යන වග දක්වන්න.

11. ස්ථිති විද්‍යාවෙහි එන "පීඨාකාරී සර්ඝණ බලය" යන පදය අර්ථ දක්වන්න.

පාපැදියක එක සමාන රෝද දෙකෙහි A හා B කේන්ද්‍රයා කෙරෙන රේඛාවේ දිග $2a$ වේ. පාපැදියේ හා පැද යන්නාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය AB රේඛාවේ සිට $h - r$ සිරස් උසකින් ද, පිටුපස රෝදයේ කේන්ද්‍රය වන A සිට AB රේඛාව දිගේ මතින වට $a - d$ ($d > 0$) සිරස් දුරෙකින් ද පිහිටයි. මෙහි r යනු එක් එක් රෝදයේ අරය වේ. ඉදිරිපස රෝදයට කිරීම යෙදූ විට පාපැදිය සහ පැද යන්නාව α ($< \frac{\pi}{2}$) ආනතියකින් යුතු රළු පාරක් මත නිශ්චලතාවයේ පිටීමට හැකි යයි පිහිටන්න. A ලක්ෂ්‍යයට අනෙළු B ලක්ෂ්‍යය සිටින සේ පාපැදියත් එය පැදයන්නාත් වැඩි කම බෑවුම් රේඛාව සහිත සිරස් තලයක පිහිටයි.

$$\alpha \leq \tan^{-1} \left[\frac{\mu(a-d)}{\mu h + 2a} \right]$$

බව පෙන්වන්න; මෙහි μ යනු පාර හා රෝද අතර සර්ඝණ සංගුණකය වේ.

$\mu < \frac{a-d}{h}$ බව උපකල්පනය කරමින්, පිටුපස රෝදයට කිරීම යෙදූ විට පාපැදිය හා පැද යන්නාව වැඩි කම බෑවුම් රේඛාව සහිත සිරස් තලයක රළු පාරක් මත නිශ්චලතාවේ පිහිටීම සඳහා පාරට කිබිය හැකි වැඩි ම-ආනතිය ද සොයන්න.

12. S නම් පරිමිත නියැදි අවකාශයෙහි එක හා සමාන ව පිදු විය හැකි සුමග පිද්ධි හරියට ම n කිබෙයි. සුමග පිද්ධි p ඇතුළත් වන්නා වූත් S ට අයත් වන්නා වූත් ඕනෑ ම පිද්ධියක් E යැයි පිහිටන්න. E පිද්ධියේ සම්භාවිතාව වන $P(E)$ අර්ථ දක්වන්න.

S ට ඇතුළත් A හා B නම් ඕනෑ ම පිද්ධි දෙකක් සඳහා, සුපුරුදු අංකනයකට අනුව

(i) $P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B)$ බවත්

(ii) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ බවත්

සාධනය කරන්න.

- (අ) $2p, p^2$ හා $4p-1$ සංස්ථිත සම්භාවිතා සහිත නියැදි ලක්ෂ්‍ය තුනකින් සමන්විත ව නියැදි අවකාශයක් පිහිටයි. පිළිගත හැකි p හි අගය සොයන්න.

- (ආ) පුද්ගලයින් 50 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක, 30 දෙනෙකු වයස අවුරුදු 35 ට අඩු වේදාවරු; 10 දෙනෙකු වයස අවුරුදු 35 ට වැඩි වේදාවරු; 4 දෙනෙකු වයස අවුරුදු 35 ට අඩු වේදාවරු නොවන අය වේ; 6 දෙනෙකු වයස අවුරුදු 35 ට වැඩි වේදාවරු නොවන අය වේ.

මෙම කණ්ඩායමේ වේදාවරුන්ගෙන් සැදි කුලකය A ලෙසත් වයස අවුරුදු 35 ට වැඩි පුද්ගලයින්ගෙන් සැදි කුලකය B ලෙසත් දක්වේ යැයි පිහිටු. අර්ථ දක්වම් භාවිත කොට ගෙන $P(A)$, $P(B)$ හා $P(A \cap B)$ සොයන්න.

$P(A \cup B)$ හි අගය අපෝහනය කොට, මෙහි ප්‍රතිඵලය වටහවලින් ලියා දක්වන්න.

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි]
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/
All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව / இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் / Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 1997 අගෝස්තු (පැරණි නිර්දේශය)
සම්මුඛ පොත තරාතිරම (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 1997 ஓகஸ்ட் (பழைய பாடத்திட்டம்)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 1997 (Old Syllabus)

ශුද්ධ ගණිතය I
தூய கணிதம் I
Pure Mathematics I

01	
S	I

පැය තුනයි / மூன்று மணி / Three hours

ප්‍රශ්න කයකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. (අ) $r \geq 1$ සඳහා,

$$u_r = \frac{\sqrt{r}}{(1+\sqrt{1})(1+\sqrt{2}) \dots (1+\sqrt{r})}$$

ගැලී දී ඇත.

$r > 1$ සඳහා $f(r-1) - f(r) = u_r$ වන පරිදි $f(r)$ සොයන්න.

$$\sum_{r=1}^n u_r = 2u_1 - \frac{u_n}{\sqrt{n}} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

$$\sum_{r=1}^{\infty} u_r \text{ යන්න 1 ට අසීමාරී වන බව පෙන්වීම සඳහා ඉහත ප්‍රතිඵලය යොදන්න.}$$

- (ආ) n යනු ධන නිඛිලයක් නම්, $2^{2n+2} + 3^{2n}$ යන්න 120 න් බෙදූ විට ශේෂය 25 බව ගණිත අනුක්‍රමයෙන් පෙන්වන්න.

2. (අ) සියලු තාත්ත්වික a, b සඳහා $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}(a+b)^2$ බව පෙන්වන්න.

ඉහත ප්‍රතිඵලය යෙදීමෙන් හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ, a, b තාත්ත්වික වීම

$$a+b+x=1$$

$$a^2+b^2+x^2=3$$

සම්කරණ දෙක සපුරාලන්නේ නැති තාත්ත්වික x හි අගය කුලකය සොයන්න.

- (ආ) $|5x-8| < (3x-2)$ වන පරිදි වූ x හි අගය කුලකය සොයන්න.

- (ඇ) a, b ධන නියත වන අතර y ප්‍රකාශනය, $y = \frac{x-a}{x^2-b^2}$ යන්නෙන් දෙනු ලැබේ. $b > a$ නම්, තාත්ත්වික x සඳහා

y ට ඕනෑම අගයක් ගත හැකි බව පෙන්වන්න.

තවද $a > b$ නම් එක්කරා ප්‍රාන්තරයක ඇති අගයයන් හැර අන් සියලුම අගයයන් y ගන්නා බව ද පෙන්වන්න.

3. (අ) a, b, c තාත්ත්වික සංඛ්‍යා වීම, $(a+b+c)^5 - a^5 - b^5 - c^5$ හි සාධක සොයන්න.

- (ආ) $f(x)$ බහුපදය, $f(x) = x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 3x + 1$ යන්නෙන් දෙනු ලැබේ.

(i) $(x-1)$ හෝ $(x+1)$, $f(x)$ හි සාධකයක් නොවන බව පෙන්වන්න.

(ii) (x^2-1) මගින් $f(x)$ බෙදූ විට ශේෂය සොයන්න.

(iii) (x^2+1) මගින් $f(x)$ බෙදූ විට ශේෂය 2 බව පෙන්වා, එයින් $f(x) = 2$ හි එක් තාත්ත්වික මූලයක් ලබා ගන්න.

[අනෙක් පිට බලන්න.

4. වන නිවැරදිකයක් සඳහා ද මූලාසන ප්‍රමේයය ප්‍රකාශ කර ආධනය කරන්න.

$(\cos \theta + i \sin \theta)^8$ සැලකීමෙන්,

$$\cos 8\theta = 128 \cos^8 \theta - 256 \cos^6 \theta + 160 \cos^4 \theta - 32 \cos^2 \theta + 1$$

බව පෙන්වන්න.

$$\text{එනමින්, } \cos^2 \frac{\pi}{16}, \sin^2 \frac{\pi}{16}, \cos^2 \frac{3\pi}{16} \text{ සහ } \sin^2 \frac{3\pi}{16} \text{ සංඛ්‍යා } 128x^4 - 256x^3 + 160x^2 - 32x + 1 = 0$$

සමීකරණයේ මූල බව පෙන්වන්න.

5. z_1, z_2 සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙක පිළිවෙලින් P_1 සහ P_2 ලක්ෂ්‍යවලින් ආරම්භ කර සටහනෙහි නිරූපණය වේ නම්, $z_2 - z_1$ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව ආරම්භ කර සටහනෙහි නිරූපණය කළ හැක්කේ කෙසේ දැයි පෙන්වන්න.

ආරම්භ කර සටහනෙහි P_0, P සහ P' ලක්ෂ්‍ය අනුරූප වන්නේ පිළිවෙලින් z_0, z සහ z' සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවලට ය.

$P_0 P = P_0 P'$ බව දී ඇත. $P_0 P$ සිට වාමාවර්ත අතට මැණූ විට $P' P_0 P$ කෝණය θ නම්

$$(z' - z_0) = (z - z_0)(\cos \theta + i \sin \theta)$$

බව පෙන්වන්න.

$A_0 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6 A_7$ යනු සවිධි අක්ෂරයක් වන අතර A_0, A_4 ශීර්ෂ පිළිවෙලින් z_0, z_4 සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවලට අනුරූප වේ. A_1, A_2, A_3, A_5, A_6 සහ A_7 ශීර්ෂවලට අනුරූප සංකීර්ණ සංඛ්‍යා

$$\frac{1}{2}(z_0 + z_4) + \frac{1}{2}(z_0 - z_4)(\cos \alpha \pm i \sin \alpha)$$

ආකාරයට ප්‍රකාශ කළ හැකි බව පෙන්වන්න; මෙහි α සඳහා අගයයන් තුනක් නිර්ණය කළ යුතුය.

6. (අ) "COEFFICIENT" වචනයෙහි අක්ෂර 11 න් සෑදෙන විවිධ සංකරණ සංඛ්‍යාව සොයන්න.

තවද, COEFFICIENT වචනයෙහි අක්ෂර 11 න් සෑදිය හැකි, අක්ෂර හතරක් අඩංගු එකිනෙකට වෙනස් කේෂි සංඛ්‍යාව ද සොයන්න.

- (ආ) A බැගයෙහි සුදු බෝල 8 ක් සහ කළු බෝල 6 ක් තිබෙන අතර B බැගයෙහි සුදු බෝල 6 ක් සහ කළු බෝල 3 ක් තිබේ.

(i) බෝල 6 ම එකම බැගයෙන් ලැබේ නම්

(ii) කළු බෝල, බැග් දෙකෙන් ඕනෑම එක් බැගයකින් සුදු බෝල අනෙක් බැගයෙන් ලැබේ නම්

(iii) බෝල ලැබෙන බැග සම්බන්ධයෙන් කිසිම සීමා කිරීමක් නොමැති නම්

එක් එක් අවස්ථාව සඳහා, සුදු බෝල 4 ක් සහ කළු බෝල 2 ක් ඇතුළත් වන සේ බෝල 6 කින් යුත් කාණ්ඩ කොපමණක් තෝරා ගත හැකි ද?

7. n යනු ධන නිඛිලයක් වුව, $(1+x)^n$ සඳහා ද්විපද ප්‍රසාරණය ප්‍රකාශ කොට, සාධනය කරන්න.
- a, b යනු කාන්තවික නියත වුව, $(a+b)^n$ සඳහා ප්‍රසාරණය අපොහොසත් කරන්න.

$$(i) 1. {}^nC_1 a^1 b^{n-1} + 2. {}^nC_2 a^2 b^{n-2} + \dots + r. {}^nC_r a^r b^{n-r} + \dots + n. {}^nC_n a^n$$

රේඛාය වර්ග ක්‍රමයකින් ගණනය කර $a+b=1$ වුව එම රේඛාය na ව සමාන බව පෙන්වන්න.

- (ii) $a+b=1$ වන සේ දී ඇති ධන a, b සඳහා, ${}^nC_r a^r b^{n-r}$ හි වැඩිතම අගය $r=r_0$ හි දී ලැබේ නම්
- $$an-b \leq r_0 \leq an+a, 0 \leq r_0 \leq n$$
- බව පෙන්වන්න.

$a=b=\frac{1}{2}$ යැයි සලකා $n=4$ සඳහා ද $n=5$ සඳහා ද r_0 නිර්ණය කරන්න.

r_0 හි අනන්‍යතාව සාකච්ඡා කරන්න.

8. (අ) (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \frac{1}{x} \right)$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{\tan^2 4x - x^2}$

සොයන්න.

- (ආ) ප්‍රමුච්චරම මගින්, x විෂයයෙන්, $x \cos x$ හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

(ඇ) $y = [\ln(x + \sqrt{1+x^2})]^2$ නම්,

$$(1+x^2) \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} = 2$$

බව පෙන්වන්න.

9. (අ) $\int x (\ln x)^2 dx$ අනිශ්චිත අනුකලය සොයන්න.

(ආ) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2 dx}{3 \sin 2x + 4 \cos 2x} = \frac{1}{5} \ln 6$ බව පෙන්වන්න.

(ඇ) $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx$

බව පෙන්වන්න.

එනමින් හෝ අනු අපූරේකින් හෝ I අගයන්න.

[අනෙක් පිට බලන්න.

10. (අ) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ සඳහා ආසන්න අගයක් ලබා ගැනීමට, පිටි - ඉලක්කම් ගණිත වගු භාවිත කිරීමෙන්, කොටස 5

සහිතව ක්‍රියාත්මක කිරීම යොදන්න.

(ආ) $\ln(1+x^2)$ සඳහා x^5 හි පදය සහ එය දක්වා වූ පද ඇතුළත් මැක්ලෝරීන් ප්‍රසාරණය ලබා ගන්න.

(ඇ) $f(x) = \frac{x^2 + 3x}{(1+x)(1-x)^2}$ යන්න. $\frac{A}{1+x} + \frac{B}{1-x} + \frac{C}{(1-x)^2}$ ආකාරයට ප්‍රකාශ කරන්න;

මෙහි A, B, C යනු නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ.

එනමින්, r මගින් a_r හි අගය දෙමින්, $\sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r$ ආකාරයට $f(x)$ ප්‍රකාශ කරන්න.

11. xy තලයේ වූ, C වක්‍රයක්

$$x = \frac{1}{t+2}, \quad y = \frac{1}{t^2+4}$$

මගින් දෙනු ලැබේ; මෙහි t යනු -2 හැර අන් සියළුම තාත්කල්පික අගයන් ගන්නා පරාමිතියකි.

එකම රූපයෙහි,

(i) t ට එරෙහිව x

(ii) t ට එරෙහිව y

චක්‍රවල දළ සටහන් අඳින්න.

t ඇසුරෙන් $\frac{dy}{dx}$ ලබාගෙන, y හි හැරුම් ලක්ෂණ (කිබි නම්) සොයන්න.

C වක්‍රයේ දළ සටහනක් අඳින්න.

12. පිළිවෙළින් $3y = 2x(4-x)$ සහ $x^2 + y^2 - 5x + 2 = 0$ සමීකරණවලින් දෙනු ලබන C_1 සහ C_2 චක්‍රවල දළ සටහන් එකම

රූ සටහනෙක අඳින්න.

C_1 සහ C_2 අතර හා $y = 2$ රේඛාවට ඉහළින් පිහිටි S පෙදෙසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

x අක්ෂය වටා සෘජුකෝණ හතරකින් S භ්‍රමණය කිරීමෙන් ලැබෙන පරිභ්‍රමණ ඝනයේ පරිමාව $\frac{1043}{270} \pi$ බව

පෙන්වන්න.