


**අ.පො.ස.(ල.පෙළ) විභාගය - 2013**

## **අභ්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වාර්තාව**

# **10 - සංයුත්ත ගණිතය**



පරෝපරා හා සංවර්ධන කාබාව  
ජාතික අභ්‍යන්තර හා පරීක්ෂණ සේවාව,  
හි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව.

- 2.1.3 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි ප්‍රශ්න සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ, නිගමන හා යෝජනය

### (10) සංයුක්ත ගණිතය I පත්‍රය - A කොටස

#### 1 වන ප්‍රශ්නය

1. ගණිත අභ්‍යන්තර මූලධර්මය හාවිතයෙන්, සියලු  $n \in \mathbb{Z}^+$  සඳහා  $\sum_{r=1}^n (2r+1) = n(n+2)$  බව සාධනය කරන්න.

$$n = 1 \text{ විට, } \text{ව. පැ.} = \sum_{r=1}^1 (2r+1) = 3 \quad \text{හා}$$

$$\text{ද. පැ.} = 1(1+2) = 3$$

$$\therefore n = 1 \text{ විට ප්‍රතිථිලය සත්‍ය වේ. } \quad (5)$$

මිනැම  $k$  ධන නිඩිලයක් ගෙන,  $n = k$  සඳහා දී ඇති ප්‍රතිථිලය සත්‍ය යැයි උපකල්පනය කරමු.

$$\text{එනම් } \sum_{r=1}^k (2r+1) = k(k+2) \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \text{දැන් } \sum_{r=1}^{k+1} (2r+1) &= \sum_{r=1}^k (2r+1) + [2(k+1)+1] = k(k+2) + 2k + 3 \quad (5) \\ &= k^2 + 4k + 3 = (k+1)(k+3) \quad (5) \end{aligned}$$

$\therefore$  දී ඇති ප්‍රතිථිලය  $n = k$  ට සත්‍ය නම්, එය  $n = k+1$  ට ද සත්‍ය වේ.  $n = 1$  සඳහා දී ඇති ප්‍රතිථිලය සත්‍ය බව ඉහත පෙන්වා ඇති. ගණිත අභ්‍යන්තර මූලධර්මය අනුව සියලු ධන නිඩිලය  $n$  සඳහාම ප්‍රතිථිලය සත්‍ය වේ. (5)

25

#### 1 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ හා නිගමන :

අයදුම්කරුවන්ගෙන් 95%ක්ම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 51%කට සිමා වී තිබේ. එනම් එම අපේක්ෂකයින්ට සාමූහිකව හිමි කර ගත හැකිව ඇත්තේ ලැබිය හැකිව තිබූ උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් අඩංගු ආසන්න ප්‍රමාණයක් පමණි. සමහර අයදුම්කරුවන් සපයා තිබූ පිළිතුරුවල කැපී පෙනෙන දුර්වලතාවක් වූවේ  $n = k$  (මෙහි  $k$  ධන නිඩිලයකි.) සඳහා ප්‍රතිථිලය සත්‍ය යැයි උපකල්පනය කිරීමේදී  $\sum_{r=1}^k (2r+1) = k(k+2)$  වෙනුවට  $\sum_{r=1}^k (2k+1) = k(k+2)$  ලෙස සඳහාවේව ලියා තිබේ. තවද සාධනය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පිළිතුරු අවසානයේදී “ගණිත අභ්‍යන්තර මූලධර්මය අනුව දී ඇති ප්‍රකාශය සත්‍ය බව” ලිවිය යුතුව තිබූණ ද බොහෝ පිළිතුරුවල ඒ බව සඳහන් නොවීම නිසා මුළු ලකුණු අනිමි වී තිබෙනු දක්නට ලැබේ. “ගණිත අභ්‍යන්තර මූලධර්මය” යොදා ගනීන් දී ඇති ප්‍රතිථිලයක් ඕනෑම ධන නිඩිලයක් සඳහා සත්‍ය බව සාධනය කිරීමේ හැකියාව අයදුම්කරුවන් සතුව තිබූණ ද, එම ක්‍රියාවලියට අයත් පියවර සියල්ල නිවැරදිව, තර්කානුකුලව හා අනුපිළිවෙළින් ඉදිරිපත් කිරීමට සිසුන් තුළුවේ නොතිබේ මෙම තත්ත්වයට හේතුවිය හැකිය. “ගණිත අභ්‍යන්තර මූලධර්මය” යනු කුමක් දැයි සිසුනට නිවැරදිව අවබෝධ කරවීමේ වැදගත්කම විෂයය ඉගැන්වීමේදී අවධානයට යොමු විය යුතු වේ.

## 2 වන ප්‍රශ්නය

2.  $\frac{2x+1}{3x-1} \geq 1$  අසමානතාව සපුරාලන නිය සියලු තාත්ත්වික අගය සොයන්න.

$$\frac{2x+1}{3x-1} \geq 1 \Leftrightarrow \frac{2x+1}{3x-1} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2x+1-(3x-1)}{3x-1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2-x}{3x-1} \geq 0 \quad (5)$$

(5)

(5)

(5)

	$x < \frac{1}{3}$	$\frac{1}{3} < x < 2$	$2 < x$
$2-x$	(+)	(+)	(-)
$3x-1$	(-)	(+)	(+)
$\frac{2-x}{3x-1}$	(-)	(+)	(-)

$$\text{විසඳුම් කුලකය} = \{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{3} < x \leq 2\} \quad (5)$$

25

## 2 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ හා නිගමන :

අයදුම්කරුවන්ගේ වැඩිම ප්‍රතිගතයක් එනම් 96%ක් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ මෙම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 27%කට සිමා වී තිබේ. විෂ්ය අසමානතා විසඳීම පිළිබඳ මූලධර්ම ඇසුරෙන් මෙම ප්‍රශ්නයට ඉතා පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් පිළිතුරු සපයා, රට හිමි ලකුණු 25ම ලබා ගත හැකිව තිබුණ ද, විෂ්ය අසමානතා විසඳීමේදී නිවැරදිව හා තාර්කිකව පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යාමේ අවශ්‍යතාව නොසැපිරීම, ලකුණු අඩුවීමට හේතු වී තිබු බව දක්නට ලැබුණි. නිසැකයෙන්ම ධන ව නොපවතින රාජියකින් අසමානතාවක දෙපසම ගුණ කිරීම (හරස් ගුණ කිරීම) බොහෝ අයදුම්කරුවන් විසින් කරන ලද බරපතල වරදකි. දී ඇති අසමානතාව විසඳීමේදී  $3x-1=0$  වන විට එහි වම් පස අර්ථ විරහිත වන නිසා  $3x-1 > 0$  වන අවස්ථාවන්  $3x-1 < 0$  වන අවස්ථාවන් (එනම්  $x > \frac{1}{3}$  සහ  $x < \frac{1}{3}$ ) වෙන වෙනම සැලකීම අත්‍යවශ්‍ය වෙයි.  $x = \frac{1}{3}$  වන විට අසමානතාව නොපවතින බව සමහර අයදුම්කරුවන්ගේ අවධානයට යොමුව නැති නිසා විසඳුම් කුලකය ලිවීමේදී පවා  $x = \frac{1}{3}$  ද විය හැකි ලෙස ගෙන තිබුණි.  $x \neq \frac{1}{3}$  විය යුතු බව අවබෝධ කරගෙන නොතිබීම රට හේතුව වෙයි. ලකුණු දීමේ පටිපාටියේ දැක්වෙන ඉහත ක්‍රමයට අමතරව වෙනත් ක්‍රම හාවිත කිරීමෙන් වුව ද අසමානතාවෙහි විසඳුම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබුණි. ව්‍යුත්පන්න කර ගනු ලබන ප්‍රකාශයෙහි විවෘත පිරික්සීමෙන් අනතුරුව නිවැරදි විසඳුම් කුලකය පිළිතුරු ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට සිසුන් පුරුදු වීම ද අවශ්‍ය වේ.

### 3 වන ප්‍රශ්නය

3. සියලු  $n \in \mathbb{Z}^+$  සඳහා අපරිමිත ග්‍රේණියක පළමු පද  $n$  හි එකතුව  $6 - \frac{2^{n+1}}{3^{n-1}}$  මගින් දෙනු ලැබේ.

මෙම ග්‍රේණියෙහි  $n$  වෙති පදය සෞයා, ග්‍රේණිය, අහිසාරී ගුණෝත්තර ග්‍රේණියක් බව පෙන්වන්න.

$$n \in \mathbb{Z}^+ \text{ සඳහා } \text{ග්‍රේණියේ } n \text{ වෙති පදය } a_n \text{ සහ } S_n = 6 - \frac{2^{n+1}}{3^{n-1}} \text{ ලෙස ගනිමු.}$$

$$\text{එවිට } a_n = S_n - S_{n-1} \quad (5)$$

$$= \left\{ 6 - \frac{2^{n+1}}{3^{n-1}} \right\} - \left\{ 6 - \frac{2^n}{3^{n-2}} \right\}$$

$$= \frac{2^n}{3^{n-2}} \left\{ -\frac{2}{3} + 1 \right\} \quad (5)$$

$$= \frac{2^n}{3^{n-2}} = 2 \times \left[ \frac{2}{3} \right]^{n-1} \quad (5)$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  යනු පළමුවන පදය 2 සහ පොදු අනුපාතය  $\frac{2}{3}$  වන ගුණෝත්තර ග්‍රේණියකි. (5)

$$\left| \frac{2}{3} \right| < 1 \text{ බැවින් ග්‍රේණිය අහිසාරී වේ. (5)}$$

25

### 3 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ හා නිගමන :

අපේක්ෂකයින්ගෙන් අවම ප්‍රතිගතයක් එනම් 73%ක් පමණක් පිළිතුරු සපයා තිබූ මෙම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව ද 9% තරම් අවම මට්ටමකට පත්ව තිබීම දැඩි අවධානයට යොමු වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම ප්‍රශ්නය තුළ අඩංගු ගැටලුව ලෙස සැලකිය හැකිකේ මුල් පද  $n$  හි එක්‍යය ඇසුරෙන් ප්‍රකාශිත ග්‍රේණියක ලාක්ෂණික හදුනාගැනීමයි. ග්‍රේණියක මුල් පද  $n$  හි එක්‍යය දී ඇති විට  $n$  වන පදය සෞයා ගැනීමේ සරල උපක්‍රමය, එනම්,  $S_n - S_{n-1} = T_n$  යන්න හාවිත කළ හැකි බව දැන සිටීම ඒ සඳහා අවශ්‍ය වේ. අනතුරුව, ග්‍රේණියේ  $n$  වන පදය  $T_n$  යන්න  $ar^{n-1}$  ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කළ විට අපරිමිත ග්‍රේණිය ගුණෝත්තර ග්‍රේණියක් වන බව ද එහි පොදු අනුපාතය  $r, |r| < 1$  අසමානතාව සපුරාලන විට ගුණෝත්තර ග්‍රේණිය අහිසාරී වන බව ද අපේක්ෂකයින් දැන සිටිය යුතු අතර එහි නොවක් හාවිතයක් ලෙස මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සැලකිය හැකි වේ.

සමහර අපේක්ෂකයන් ග්‍රේණියේ පදවල එකතුවට පිළිවෙළින්  $n = 1, n = 2, n = 3, n = 4$  ආදේශයෙන්  $S_1, S_2, S_3, S_4$  සෞයා එමගින් ග්‍රේණියේ මුල් පද තුන ලබාගෙන, එම ග්‍රේණිය ගුණෝත්තර ග්‍රේණියක් බවට කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබූ තමුදු එය ප්‍රමාණවත් සාධනයක් ලෙස නොසැලකිය හැකි වේ. සමහර අපේක්ෂකයන්  $n \xrightarrow{\lim} \infty S_n = 6$  (පරිමිත) බව පෙන්වීම මගින් ග්‍රේණිය අහිසාරී බව පෙන්වීම පිළිගත හැකි වේ.

#### 4 වන ප්‍රශ්නය

4.  $a \in \mathbb{R}$  යැයි ගනිමු.  $\left[ x + \frac{a}{x^3} \right]^{20}$  හි ද්වීපද ප්‍රසාරණයෙහි  $x$  වලින් ස්වායත්ත පදය  $\frac{969}{2}$  වේ.  $a$  හි අගය සෞයන්න.

ද්වීපද ප්‍රමේණයට අනුව,

$$\begin{aligned} \left[ x + \frac{a}{x^3} \right]^{20} &= \sum_{r=0}^{20} {}^{20}C_r x^{20-r} \left( \frac{a}{x^3} \right)^r \text{ මෙහි } r = 0, 1, 2, \dots, 20 \text{ සඳහා } {}^{20}C_r = \frac{20!}{r!(20-r)!} \text{ වේ.} \\ &= \sum_{r=0}^{20} {}^{20}C_r a^r x^{20-4r} \end{aligned} \quad (5)$$

$x$  වලින් ස්වායත්ත පදය සඳහා  $20 - 4r = 0$

$$\therefore r = 5 \quad (5)$$

$$x$$
 වලින් ස්වායත්ත පදය  $\frac{969}{2}$  නිසා,  ${}^{20}C_5 a^5 = \frac{969}{2} \quad (5)$

$$\Leftrightarrow \frac{20!}{15!5!} a^5 = \frac{969}{2} \Leftrightarrow a^5 = \frac{1}{32} \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$(5)$$

$$(5)$$

25

#### 4 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

අයදුම්කරුවන්ගෙන් 85%ක් මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයා තිබූ නමුදු එහි පහසුතාව 33%කට සිමා වී තිබේ. බොහෝ අපේක්ෂකයන් ප්‍රසාරණයෙහි සාධාරණ පදය නිවැරදිව ලියා තිබූ නමුත් එහි සාධාරණ පදය  ${}^{20}C_r a^r x^{20-4r}$  බව නිවැරදිව ලබා නොගැනීමත්,  $x$  වලින් ස්වායත්ත පදය සඳහා  $r = 5$  බව නිවැරදිව ලබාගත් සමහර අපේක්ෂකයක් පවා  ${}^{20}C_5$  යන්න නිවැරදිව සූළු නොකිරීමත් නිසා ලකුණු අහිමි කර ගෙන තිබේ. ඉතා අඩු පියවර ගණනකින් නිවැරදි පිළිතුරු කරා ඉක්මනින් ලතා විය හැකි මෙවැනි ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයා උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් උපයා ගැනීම කෙරෙහි අපේක්ෂකයන් යොමු විය යුතු වේ.

## 5 වන ප්‍රශ්නය

5.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2}$  බව පෙන්වන්න.

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \times \left[ \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} \right] \quad (5) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \left[ \frac{x}{2} \right]}{2x^2} \left( \sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \right) \quad (5) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \left[ \frac{x}{2} \right]}{4 \left[ \frac{x}{2} \right]^2} \left( \sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \right) \quad (5) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4} \left( \frac{\sin \left[ \frac{x}{2} \right]}{\left[ \frac{x}{2} \right]} \right)^2 \left( \sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \times 1^2 \times (2) = \frac{1}{2} \\
 (5) & \qquad (5)
 \end{aligned}$$

25

5 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා අපේක්ෂකයන්ගේන් 94%ක්ම පිළිතුරු සපයා තිබූ අතර පහසුතාව 51%ක් විය. මෙය පහසුතාව වැඩිනම ප්‍රශ්න දෙක අතුරෙන් එකකි. විෂ්ය හා ත්‍රිකෝණම්තික සංයුක්ත ග්‍රිතයක සීමාව සෙවීම පිළිබඳ දැනුම හාවිතයෙන් පිළිතුරු සැපයිය යුතු මෙම ප්‍රශ්නයේදී සීමාව පිළිබඳ නීති නිවැරදිව හාවිත කර නොතිබීම සාර්ථක පිළිතුරු නොලැබීමට හේතුවක් විය. සීමාව පිළිබඳ මූලික ප්‍රමේයවල හාවිත ඇතුළත් අභ්‍යාසවලදී එම එක් එක් ප්‍රමේයය යොදා ගැනෙන අවස්ථා පැහැදිලිව නිරුපණය වන සේ ග්‍රිතය සකස් කර ගැනීමේ පියවර පටිපාටිය නිවැරදිව ලියා දැක්විය යුතු වුව ද බොහෝ සිසුන්ගේ පිළිතුරුවල ඒ බව දක්නට නොලැබීම අඩුපාඩුවක් මෙන්ම මුළු ලක්ෂණ නොලැබීමට හේතුවක් ද විය. පිළිතුරෙහි අන්තර්ගත පියවර අනුකූලය මගින්, නිගමනවලට එළඹීම සඳහා හාවිත ප්‍රමේය අනුපිළිවෙළින් නිරුපණය කෙරෙන මෙවැනි අභ්‍යාසවලදී විධිමත් ලෙස පිළිතුර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් උපරිම ලක්ෂණ ලබා ගැනීම කෙරෙහි අයදුම්කරුවන්ගේ අවධානය යොමු විය යුතු වේ.

## 6 වන ප්‍රශ්නය

6.  $\frac{d}{dx} \left\{ x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \right\} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$  බව පෙන්වන්න.

ඒ තයින්,  $\int \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx$  සොයන්න.

(5)

(5)

$$\frac{d}{dx} \left\{ x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \right\} = \frac{x}{(x + \sqrt{x^2 + 1})} \left( 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$= \frac{x}{(x + \sqrt{x^2 + 1})} \cdot \frac{(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1}} + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (5)$$

$$= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\frac{d}{dx} \sqrt{x^2 + 1} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad \text{බැවින්,}$$

$$\frac{d}{dx} \left\{ x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) - \sqrt{x^2 + 1} \right\} = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (5)$$

$$\therefore \int \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx = x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) - \sqrt{x^2 + 1} + C, \text{ මෙහි } C \text{ යනු අහිමත නියතයකි.}$$

(5)


25

## 6 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ හා නිගමන :

අපේක්ෂකයන්ගෙන් 90%ක් පිළිතුරු සපයා ඇති මෙම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 36%කි. අවකලනයෙහි එන දාම නීතිය පිළිබඳව අවබෝධය ප්‍රමාණවත් නොමැතිවීම නිසා පූර්ණ වශයෙන් සාර්ථක පිළිතුරු ඉදිරිපත් කර තිබුණේ අල්ප වශයෙහි. අනුකලනයේ ඇති සම්මත ආකාර පිළිබඳ දැනුම අල්ප වීම ද ලකුණු අඩුවීමට බලපා ඇති තවත් කරුණකි. අනුකලනය කළ යුතු ප්‍රකාශනය සුදුසු පරිදි සකස් කර ගැනීමට නොහැකි වීම ද සාර්ථක පිළිතුරු නොලැබීමට හේතු වී තිබේ. තවද අනිශ්චිත අනුකලනයකදී අහිමත නියතය සඳහන් කර නොතිබීම නිසා ද බොහෝ අපේක්ෂකයන්ට උපරිම ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි විය. අවකලනයක විලෝෂ්මය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙන සරල අනුකල ආග්‍රිත අභ්‍යාසවල නිරතවීමෙන් සිසුන් ලබන අත්දැකීම මෙවැනි ප්‍රශ්නවලට සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයීම සඳහා ඉතා ප්‍රයෝගනවත් වේ.

## 7 වන ප්‍රග්‍රහය

7.  $(3, 1)$  ලක්ෂණයෙහි  $x + 2y + a = 0$  සරල රේඛාව මත ප්‍රතික්මිතය  $\left(\frac{3}{5}, b\right)$  ලක්ෂය වේ. මෙහි  $a$  හා  $b$  නියත වේ.  $a$  හා  $b$  හි අගයන් සොයන්න.



$AB$  රේඛාවේ මධ්‍ය ලක්ෂණය  $C$  නම්,

$$C = \left[ \frac{3 + \frac{3}{5}}{2}, \frac{1+b}{2} \right] \quad (5)$$

$$C \text{ ලක්ෂණය } l \text{ රේඛාව මත පිහිටන බැවින් \ } \frac{9}{5} + (1+b) + a = 0 \quad (5)$$

$$AB \perp l \text{ എൽക്കും, } \left( \frac{b-1}{\frac{3}{5}-3} \right) \times \left( -\frac{1}{2} \right) = -1 \quad (5)$$

$$\therefore b - 1 = - \frac{24}{5}$$

$$b = -\frac{19}{5} \quad \textcircled{5}$$

$$(1) \Rightarrow a = 1 \quad \text{5}$$

25


7 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ හා නිගමන :

අයදුම්කරුවන්ගේන් 89%ක් පිළිතුරු සපයා තිබූ මෙම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 32%කි. විෂය ජ්‍යාමිතියෙහි එන සරල සිද්ධාන්ත ඇසුරෙන් පිළිතුරු සැපයීය හැකිව තිබූ මෙම ප්‍රශ්නයෙහිදී  $C$  හි බණ්ඩාක බ ඇසුරෙන් නිවැරදිව ලබාගෙන තිබුණ ද එම බණ්ඩාක  $x + 2y + a = 0$  හි ආදේශ කළ පසු  $a$  හා  $b$  අතර අනෙක් සම්බන්ධතාව ගොඩ නාගා ගැනීමට නොහැකිවීම හෝ නිවැරදිව සුළු කර නොතිබීම හෝ හේතුවෙන්  $a$  සහ  $b$  හි නිවැරදි අගය ලබා ගැනීමට බොහෝ අයදුම්කරුවන්ට නොහැකි වී තිබේ. සරල රේබාවක පරාමිතික නිරුපණය භාවිතයෙන් ද මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා ගත හැකිවේ. සරල රේබාව පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්ත පුරු කරවීම සඳහා සරල අභ්‍යාසවල නිරතකරවීමෙන් මෙම දුර්වලතාව මත හරවා ගත හැකිය. මෙයට පිළිතුරු සැපයීමේදී අයදුම්කරුවන් මතකයේ තිබූ ප්‍රතිච්මිතය පිළිබඳ සූත්‍රය යොදා ගෙන විසඳා තිබූ අතර එයට වඩා මෙම ප්‍රශ්නයෙහි දී ඇති කරුණු අනුව රේබාවක දෙපස ලක්ෂ්‍ය දෙක පිහිටන විට සපුරාලන අවශ්‍යතාව යොදා කිහිම විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ කිරීම මැනවි.

## 8 වන ප්‍රශ්නය

8.  $x = 2\cos\theta, y = 2\sin\theta$ , මගින් දෙනු ලබන වකුය  $C$  යැයි ගනිමු. මෙහි  $\theta$  යනු පරාමිතියකි.  $C$  වකුයට  $\theta = \frac{\pi}{4}$  ට අනුරූප ලක්ෂණයෙහි දී වූ අහිලම්බයට,  $C$  වකුය නැවත  $\theta = \alpha$  ට අනුරූප ලක්ෂණයෙහි දී හමුවේ.  $2\sin\alpha - 8\cos\alpha + 3\sqrt{2} = 0$  බව පෙන්වන්න.

$$x = 2\cos\theta, y = 2\sin\theta$$



$\theta = \frac{\pi}{4}$  ට අනුරූප ලක්ෂණය  $P$  නම්,

$$P = \left( \sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = 2\sin\theta, \frac{dy}{d\theta} = \cos\theta \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-\cos\theta}{2\sin\theta}$$
(5)
(5)

$$P \text{ ලක්ෂණයේදී වකුයට ඇදි ස්ථානයකයේ අනුකුමණය} = -\frac{1}{2} \cot \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2} \quad (5)$$

$$\therefore P \text{ ලක්ෂණයේදී වකුයට ඇදි අහිලම්හයේ අනුකුමණය} = 2$$

$$P \text{ ලක්ෂණයේදී වකුයට ඇදි අහිලම්හයේ සම්කරණය} : y - \frac{1}{\sqrt{2}} = 2(x - \sqrt{2}) \quad (5)$$

( $2\cos\alpha, \sin\alpha$ ) ලක්ෂණය මෙම රේඛාව මත පිහිටන බැවින්,

$$\sin\alpha - \frac{1}{\sqrt{2}} = 2(2\cos\alpha - \sqrt{2})$$

$$2\sin\alpha - 8\cos\alpha + 4\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$$

$$2\sin\alpha - 8\cos\alpha + 3\sqrt{2} = 0 \quad (5)$$

25

## 8 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ හා නිගමන :

අපේක්ෂකයින්ගෙන් 77%ක් පමණක් පිළිතුරු සපයා තිබූ මෙම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 31%කි. මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමේදී, දෙනු ලබන වතුයට එය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යකදී ඇදි අහිලම්බයේ සමිකරණය ලබා ගැනීමත්, දී ඇති වෙනත් ලක්ෂ්‍යක් හරහා එම අහිලම්බය ගමන් කිරීම හේතුවෙන් එම ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාක මගින් අහිලම්බයේ සමිකරණය තාප්ත කිරීමත් හාවිතයෙන් දී ඇති සම්බන්ධතාව ගොඩ නැගිය යුතුව තිබිණි. මෙය ඉගෙනුම ක්‍රියාවලිය තුළ නිතර හමුවන හාවිත අවස්ථාවක් ව්‍යව ද, පරාමිතික අවකලනය නිවැරදිව කර නොතිබීමත් පරාමිතියක් ඇසුරින් බණ්ඩාක දෙනු ලැබූ ලක්ෂ්‍යක් හරහා යන, දන්නා අනුක්‍රමයක් සහිත සරල රේඛාවේ සමිකරණය ලබා ගැනීමේ දැනුම අඩවිමත් පිළිතුරු සඳහා වන ලකුණු අඩවිමට හේතු වී තිබිණි.

## 9 වන ප්‍රශ්නය

9. අරය ඒකක 1ක් වූ ද, කේත්දය  $x + y = 0$  සරල රේඛාව මත වූද,  $C$  වෘත්තයක්,  $x^2 + y^2 + 4y + 3 = 0$  වෘත්තය ප්‍රාග්‍රහීන ව ජ්‍යෙෂ්ඨනය කරයි.  $C$ හි කේත්දයේ බණ්ඩාක සෞයන්න.

අවශ්‍ය කරන වෘත්තයේ කේත්දය  $x + y = 0$  රේඛාව මත පිහිටන බැවින් එය  $t$  පරාමිතියක් ඇසුරින්  $(t, -t)$  ලෙස ලිවිය හැකිය. මෙහි  $t \in \mathbb{R}$ . 5

කේත්දය  $(t, -t)$  සහ අරය ඒකක 1 වන වෘත්තයේ සමිකරණය,

$$(x - t)^2 + (y + t)^2 = 1 \quad (5)$$

$$x^2 + y^2 - 2tx + 2ty + 2t^2 - 1 = 0 \quad (5)$$

මෙය  $x^2 + y^2 + 4y + 3 = 0$  වෘත්තය ප්‍රාග්‍රහීන ජ්‍යෙෂ්ඨනය කරන බැවින්,

$$2(t)(2) = (2t^2 - 1) + 3 \quad (5)$$

$$\text{එනම්, } 2t^2 - 4t + 2 = 0 ; (t - 1)^2 = 0$$

$$\therefore t = 1 \text{ බැවින්, කේත්දය } = (1, -1) \quad (5)$$

25

## 9 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ හා නිගමන :

අපේක්ෂකයින්ගෙන් 85%ක් පිළිතුරු සපයා තිබූ මෙම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 31%ක් විය. ලකුණු දීමේ පටිපාටියේ අපේක්ෂිත ආකාරයට සපයන ලද පිළිතුරු ඉතාමත් දුර්ලහ විය. බොහෝ අපේක්ෂකයන් කේත්දයේ බණ්ඩාක සහ අරය ඇසුරින් වෘත්තයේ සමිකරණය ලබාගෙන තිබිණි. එහෙත් වෘත්ත දෙක ප්‍රාග්‍රහීන වීමට තිබිය යුතු අවශ්‍යතාව නිවැරදිව හාවිත කර නොතිබීම සාර්ථක පිළිතුරු අඩවිමට හේතු වී තිබිණි.

## 10 වන ප්‍රශ්නය

10.  $\sin \theta = -\frac{1}{3}$  හා  $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$  නම්,  $\sin 2\theta = \frac{4\sqrt{2}}{9}$  හා  $\tan 2\theta = \frac{4\sqrt{2}}{7}$  බව පෙන්වන්න.

$$\sin \theta = -\frac{1}{3} \text{ සහ } \pi < \theta < \frac{3\pi}{2} \text{ යැයි ගනිමු.}$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \text{ බැවින්, } \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \text{ සහ } \cos \theta = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\pi < \theta < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \cos \theta < 0 \text{ බැවින්, } \cos \theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \quad (5)$$

$$\text{දැන } \sin 2\theta = 2\cos \theta \sin \theta = 2 \left( -\frac{2\sqrt{2}}{3} \right) \left( -\frac{1}{3} \right) = \frac{4\sqrt{2}}{9} \quad (5)$$

$$\text{තවද, } \cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9} \quad (5)$$

$$\tan 2\theta = \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} = \left( \frac{4\sqrt{2}}{9} \right) \left( \frac{9}{7} \right) = \frac{4\sqrt{2}}{7} \quad (5)$$

25

10 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීකුණ හා නිගමන :

අපේක්ෂකයින්ගෙන් 84%ක් පිළිතුරු සැපයා තිබූ මෙම ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 29%කට සීමා වී තිබේ. අපේක්ෂකයන් බොහෝ දෙනෙකු  $\theta$  කේත්‍ය තුන්වන වෘත්ත පාදයේ කේත්‍යක් බව හඳුනා නොගෙන එය සුළු කේත්‍යක් ලෙස සලකා සාපුළුකේත්‍යේ ත්‍රිකේත්‍යක් ඇදිමෙන් එහි කේසයින් අය ලබා ගෙන තිබේ. එක් ත්‍රිකේත්‍යම්තික අනුපාතයක් දී ඇති විට තවත් ත්‍රිකේත්‍යම්තික අනුපාතයක් සෙවීමේදී  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$  සර්වසාම්‍ය හාවිත කිරීමට මෙන්ම  $\theta$  කේත්‍ය කුමන ප්‍රාන්තරයක පවතීද යන්න සලකා බලා ඒ අනුව එක් එක් ත්‍රිකේත්‍යම්තික අනුපාතයෙහි අගය ලබා ගැනීමේදී එම අගය දන (+) ද (-) ද යන්න තීරණය කිරීමට ද සිපුන් පුරු කරවීමෙන් මෙම අඩුපාඩුව මග හරවා ගත හැකිය. වෘත්ත පාද නිවැරදිව හඳුනාගෙන නොතිබීම සාර්ථක පිළිතුරු නොලැබීමට හේතුවක් වී තිබේ.

තවද බොහෝ අපේක්ෂකයන් ත්‍රිකේත්‍යම්තික සර්වසාම්‍ය යෙදීම වෙනුවට සාපුළුකේත්‍යේ ත්‍රිකේත්‍යක්, දෙන ලද කේත්‍යක් සඳහා නිර්මාණය කර එමගින් ඉතිරි ත්‍රිකේත්‍යම්තික අනුපාත සෙවීම සාමාන්‍ය පුරුද්දක් බවට පත්වී තිබේ. දෙන ලද කේත්‍ය සුළුකේත්‍යක් වන විට සාපුළුකේත්‍යේ ත්‍රිකේත්‍යයක් ඇසුරෙන් අනෙක් අනුපාත ලබා ගැනීම සුදුසු වන අතර අනෙකුත් කේත්‍ය සඳහා එය පවතින වෘත්ත පාදකය අනුව සාපුළුකේත්‍යක ත්‍රිකේත්‍ය සැලකිය හැකිය.

(10) සංයුක්ත ගණීතය I - B කොටස

11 වන ප්‍රශ්නය

11.(a)  $f(x) = ax^3 + bx^2 - 11x + 6$  යැයි ගනිමු. මෙහි  $a, b \in \mathbb{R}$  වේ.

$(x-1)$  යන්න  $f(x)$  හි සාධකයක් වේ නම් හා  $f(x)$  යන්න  $(x-4)$  න් බෙදු විට ලැබෙන ගේෂය  $-6$  නම්,  $a$  හා  $b$  වල අගයන් සෞයන්න.

$f(x)$  හි අනෙක් ඒකඡ සාධක දෙකත් සෞයන්න.

(b)  $\alpha$  හා  $\beta$  යනු  $x^2 + bx + c = 0$  සම්කරණයේ මූල යැයි ද,  $\gamma$  හා  $\delta$  යනු  $x^2 + mx + n = 0$  සම්කරණයේ මූල යැයි ද ගනිමු. මෙහි  $b, c, m, n \in \mathbb{R}$  වේ.

(i)  $b$  හා  $c$  ඇසුරෙන්  $(\alpha - \beta)^2$  සෞයා ඒ නයින්,  $m$  හා  $n$  ඇසුරෙන්  $(\gamma - \delta)^2$  ලියා දක්වන්න.

$\alpha + \gamma = \beta + \delta$  නම්  $b^2 - 4c = m^2 - 4n$  බව අපෝහනය කරන්න.

(ii)  $(\alpha - \gamma)(\alpha - \delta)(\beta - \gamma)(\beta - \delta) = (c - n)^2 + (b - m)(bn - cm)$  බව පෙන්වන්න.

$x^2 + bx + c = 0$  හා  $x^2 + mx + n = 0$  සම්කරණවලට පොදු මූලයක් ඇත්තේ  $(c - n)^2 = (m - b)(bn - cm)$  ම නම් පමණක් බව අපෝහනය කරන්න.

$x^2 + 10x + k = 0$  හා  $x^2 + kx + 10 = 0$  සම්කරණවලට පොදු මූලයක් ඇත; මෙහි  $k$  යනු තාත්ත්වික නියතයකි.  $k$  හි අගයන් සෞයන්න.

(10)

(a)  $x - 1$  යන්න  $f(x)$  හි සාධකයක් බැවින්,  $f(1) = a + b - 11 + 6 = 0$ ,  $\therefore a + b = 5$  — (1)

$f(x)$  යන්න  $(x-4)$  න් බෙදු විට ගේෂය  $-6$  බැවින්,  $f(4) = 64a + 16b - 44 + 6 = -6$  (10)

$\Rightarrow 4a + b = 2$  — (2)

(1) හා (2) න්,  $a = -1, b = 6$  (5)

25

(10)

$$\text{තෙන්, } f(x) = -x^3 + 6x^2 - 11x + 6 = (x-1)(-x^2 + 5x - 6) = -(x-1)(x^2 - 5x + 6) \\ = -(x-1)(x-2)(x-3)$$

5

මේ අනුව අනෙක ඒකඡ සාධක දෙක වන්නේ  $(x-2)$  හා  $(x-3)$  වේ. (5)

20

(b)(i)  $\alpha$  හා  $\beta$  යනු  $x^2 + bx + c = 0$  වර්ගජ සම්කරණයේ මූල බැවින්  $\alpha + \beta = -b$  හා  $\alpha\beta = c$  වේ.

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = b^2 - 4c$$

5

5

5

5

20

$$\text{සැසදීමෙන්, } (\gamma - \delta)^2 = m^2 - 4n$$

5

05

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta \text{ බැවින්, } \alpha - \beta = -(\gamma - \delta) \Rightarrow (\alpha - \beta)^2 = (\gamma - \delta)^2 \Rightarrow b^2 - 4c = m^2 - 4n$$

5

5

5

15

$$\begin{aligned}
 (b)(ii) \quad & (\alpha-\gamma)(\alpha-\delta)(\beta-\gamma)(\beta-\delta) = [\alpha^2 - \alpha(\gamma+\delta) + \gamma\delta][\beta^2 - \beta(\gamma+\delta) + \gamma\delta] \quad (5) \\
 & = [\alpha^2 + m\alpha + n][\beta^2 + m\beta + n] \quad (5) \\
 & = \alpha^2\beta^2 + \alpha\beta(\alpha+\beta)m + n(\alpha^2+\beta^2) + \alpha\beta m^2 + mn(\alpha+\beta) + n^2 \quad (5) \\
 & = c^2 - bcm + n(b^2 - 2c) + cm^2 - mnb + n^2 \quad (5) \\
 & = (c^2 - 2cn + n^2) + (b^2n - bcm - mnb + cm^2) \\
 & = (c-n)^2 + (b-m)(bn - cm) \quad (5)
 \end{aligned}$$

25

$x^2 + bx + c = 0$  හා  $x^2 + mx + n = 0$  යන වර්ගඡ සමීකරණවලට පොදු මූලයක් පවතින්නේ,

$(\alpha = \gamma$  හෝ  $\delta)$  හෝ  $(\beta = \gamma$  හෝ  $\delta)$  ම නම් පමණි. 5

$$\begin{aligned}
 \Leftrightarrow \quad & (\alpha-\gamma)(\alpha-\delta)(\beta-\gamma)(\beta-\delta) = 0 \quad (5) \\
 \Leftrightarrow \quad & (c-n)^2 + (b-m)(bn - cm) = 0 \quad (5) \\
 \Leftrightarrow \quad & (c-n)^2 = (m-b)(bn - cm) \quad (5)
 \end{aligned}$$

20

$x^2 + 10x + k = 0$  හා  $x^2 + kx + 10 = 0$  යන සමීකරණවලට පොදු මූලයක් පවතින්නේ නම් ම පමණක්  $(c-n)^2 = (m-b)(bn - cm)$  5

මෙහි  $b = 10, c = k, m = k$  සහ  $n = 10$  වේ. 5

$$\begin{aligned}
 (k-10)^2 &= (k-10)(100-k^2) \\
 \Leftrightarrow \quad & (k-10)[k^2 + k - 110] = 0 \\
 \Leftrightarrow \quad & (k-10)(k-10)(k+11) = 0 \quad (5)
 \end{aligned}$$

එමගින්  $k = 10$  හෝ  $k = -11$  5

20

## 12 වන ප්‍රශ්නය

**12. (a)** සිපුන් 15 ක ගිණා සහාවක් විද්‍යා සිපුන් 3 දෙනකුගෙන්, කලා සිපුන් 5 දෙනකුගෙන් හා වාණිජ සිපුන් 7 දෙනකුගෙන් සමන්විත ය. ව්‍යාපෘතියක වැඩ කිරීම සඳහා මෙම ගිණා සහාවෙන් සිපුන් 6 දෙනකු තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය ව ඇත.

- (i) සිපුන් 15 දෙනාම තෝරා ගැනීම සඳහා සුදුසු නම්,
- (ii) කිසියම් සිපුන් දෙදෙනකුට එකට වැඩ කිරීම සඳහා අවසර නොමැති නම්,
- (iii) එක් එක් විෂය ධාරාවෙන් සිපුන් දෙදෙනකු බැංශින් තෝරීමට අවශ්‍ය නම්,  
මෙය සිදු කළ හැකි වෙනස් ආකාර ගණන සොයන්න.

ඉහත (iii) යටතේ තෝරා ගත් කණ්ඩායමක්, එම කණ්ඩායමෙහි විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් වූ සිපුන් දෙදෙනාට එක ලිය වාචියීමට අවසර නොමැති නම්, වෙත්තාකාර මේසයක් වෙටුව වාචි කළ හැකි වෙනස් ආකාර ගණන සොයන්න.

$$(b) \quad r \in \mathbb{Z}^+ \text{ සඳහා } U_r = \frac{3(6r+1)}{(3r-1)^2(3r+2)^2} \text{ හා } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ සඳහා } S_n = \sum_{r=1}^n U_r \text{ යැයි ගනිමු.}$$

$$r \in \mathbb{Z}^+ \text{ සඳහා } U_r = \frac{A}{(3r-1)^2} + \frac{B}{(3r+2)^2} \text{ වන පරිදි } A \text{ හා } B \text{ නියතවල අගයන් සොයන්න.}$$

$$\text{එහි නයින්, } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ සඳහා } S_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{(3n+2)^2} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

$$\sum_{r=1}^{\infty} U_r \text{ අපරිමිත ග්‍රේණිය අනිසාරි වේ ද? ඔබගේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.}$$

$$\left| S_n - \frac{1}{4} \right| < 10^{-6} \text{ වන පරිදි වූ } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ හි කුඩාතම අගය සොයන්න.}$$

**(a)**    S        A        C

3        5        7

$$(i) \quad {}^{15}C_6 = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 91 \times 55 = 5005$$

5

5

5

15


$$(ii) \text{ විශේෂ සිපුන් දෙදෙනාම අන්තර්ගත වන පරිදි } \\ \text{ තෝරා ගත හැකි එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන } \left. \right\} = {}^{13}C_4 = 715 \quad (5) \\ (10)$$

$$(iii) \text{ විශේෂිත සිපුන් දෙදෙනාම එකවර } \\ \text{ අන්තර්ගත නොවන පරිදි තෝරා ගත } \left. \right\} = {}^{15}C_6 - {}^{13}C_4 = 5005 - 715 = 4290 \\ \text{ හැකි එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන } \quad (5) \quad (5) \quad [25]$$


---

$$(iv) \text{ එක් එක් විෂය බාරාවෙන් සිපුන් } \\ \text{ දෙදෙනකු බැහිත් තෝරා ගත හැකි } \left. \right\} = {}^3C_2 \times {}^5C_2 \times {}^7C_2 = 3 \times 10 \times 21 = 630 \\ \text{ එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන } \quad (10) \quad (5) \quad [15]$$


---



$$\text{කළා සිපුන් දෙදෙනකු හා වාණිජ සිපුන් දෙදෙනකු } \\ (\text{එනම් විද්‍යා නොවන සිපුන් හතර දෙනා}) \text{ වෘත්තාකාර } \left. \right\} = 3! \quad (5) \\ \text{ මේසයක් වටා වාචි කරවිය හැකි එකිනෙකට වෙනස් \\ ආකාර ගණන }$$

$$\text{ ඉහත සිපුන් හතර දෙනා අතර විද්‍යා සිපුන් දෙදෙනාට } \\ \text{ මේසය වටා වාචි විය හැකි ස්ථාන හතරක් ඇත. එම } \left. \right\} = {}^4C_2 \times 2 \quad (5) \\ \text{ සිපුන් දෙදෙනාට වාචි විය හැකි වෙනස් ආකාර ගණන }$$

$$\therefore \text{ අවශ්‍ය එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන } = 3! \times {}^4C_2 \times 2 = 72 \quad (5) \\ (5) \quad [20]$$


---

වෙනත් ක්‍රමයක්

$$\text{ සිපුන් 6 දෙනාටම වෘත්තාකාර මේසය වටා වාචි විය හැකි එකිනෙකට } \left. \right\} = 5! \quad (5) \\ \text{ වෙනස් ආකාර ගණන }$$

$$\text{ විද්‍යා සිපුන් දෙදෙනා එකළුග සිටින පරිදි සිපුන් 6 } \left. \right\} = 4! \times 2 \quad (5) \\ \text{ දෙනාට මේසය වටා වාචි විය හැකි එකිනෙකට } \\ \text{ වෙනස් ආකාර ගණන } \quad (5)$$

$$\therefore \text{ අවශ්‍ය එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන } = 5! - 4! \times 2 = 120 - 48 = 72 \quad (5) \quad [20]$$


---

$$(b) \quad \frac{3(6r+1)}{(3r-1)^2(3r+2)^2} = \frac{A}{(3r-1)^2} + \frac{B}{(3r+2)^2} ; \quad r \in \mathbb{Z}^+$$

$$\Leftrightarrow 3(6r+1) = (A+B)9r^2 + (12A-6B)r + (4A+B); \quad r \in \mathbb{Z}^+ \quad (5)$$

$r^2$  සංග්‍රහක සමාන කිරීමෙන් :  $A+B=0$

$r$  සංග්‍රහක සමාන කිරීමෙන් :  $12A-6B=18 \quad (10)$

$r^0$  සංග්‍රහක සමාන කිරීමෙන් :  $4A+B=3$

$$\therefore A=1 \quad (5) \quad \text{හා} \quad B=-1 \quad (5)$$

25

$$f(r) = \frac{1}{(3r-1)^2} \quad \text{යැයි ගනිමු. එවිට } f(r+1) = \frac{1}{(3r+2)^2}$$

$$\therefore U_r = f(r) - f(r+1)$$

$$\begin{aligned} r &= 1 \text{ විට } U_1 = f(1) - f(2) \\ r &= 2 \text{ විට } U_2 = f(2) - f(3) \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} r &= n-1 \text{ විට } U_{n-1} = f(n-1) - f(n) \\ r &= n \text{ විට } U_n = f(n) - f(n+1) \end{aligned} \quad (5)$$

$$\sum_{r=1}^n U_r = f(1) - f(n+1) \quad (5)$$

$$S_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{(3n+2)^2} \quad (5)$$

20

මට ! 5

05

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4} \quad \text{මක් තිසාද} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(3n+2)^2} = 0 \quad (5)$$

$\therefore$  අපරිමිත ග්‍රේණිය අහිසාරි වේ.

10

$$\left| S_n - \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{(3n+2)^2} < 10^{-6} \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow (3n+2)^2 > 10^6 \text{ හා } n \in \mathbb{Z}^+$$

$$\Leftrightarrow 3n+2 > 10^3 \text{ හා } n \in \mathbb{Z}^+$$

$$\Leftrightarrow 3n > 998 \text{ හා } n \in \mathbb{Z}^+$$

$$\Leftrightarrow n > 332 \frac{2}{3} \text{ හා } n \in \mathbb{Z}^+ \quad (5)$$

$$\therefore n \text{ හි කඩාම නිඩ්ලමය අගය} = 333 \quad (5)$$

**15**

### 13 වන ප්‍රශ්නය

13. (a)  $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  යැයි ගනිමු.

$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \lambda \mathbf{I}$  වන පරිදි වූ  $\lambda \in \mathbb{R}$  හි අගය සොයන්න; මෙහි  $\mathbf{Q}^T$  යනු  $\mathbf{Q}$  නාංසයෙහි පෙරවැම්වන අතර  $\mathbf{I}$  යනු  $2 \times 2$  ඒකක නාංසය වේ.

එ නයින්,  $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$  නාංසයෙහි ප්‍රතිලෝමය සොයන්න.

$\mathbf{A}$  යනු  $\mathbf{AP} = \mathbf{PD}$  වන පරිදි වූ  $2 \times 2$  නාංසයක් යැයි ගනිමු. මෙහි  $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$  ඕව.  $\mathbf{A}$  සොයන්න.

(b)  $z = x + iy$  යනු සංකීරණ සංඛ්‍යාවක් යැයි ගනිමු. මෙහි  $x, y \in \mathbb{R}$  වේ.  $z$  හි මාපාංකය  $|z|$  හා  $z$  හි සංකීරණ ප්‍රතිබඳය යුතු ඇත්තා දක්වන්න.

$$|z|^2 = z\bar{z} \text{ හා } z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z \quad \text{බව පෙන්වන්න.}$$

$$\text{එ නයින්, } |z - 3i|^2 = |z|^2 - 6\operatorname{Im} z + 9 \text{ හා } |1 + 3iz|^2 = 9|z|^2 - 6\operatorname{Im} z + 1 \quad \text{බව පෙන්වන්න.}$$

$|z - 3i| > |1 + 3iz|$  වන්නේ  $|z| < 1$  ම නම් පමණක් බව අපෝහනය කරන්න.

$|z - 3i| > |1 + 3iz|$  හා  $\operatorname{Arg} z = \frac{\pi}{4}$  අවශ්‍යතා සපුරාලන පරිදි වූ  $z$  සංකීරණ සංඛ්‍යා නිරුපණය කරන ලක්ෂණ ආගන්ධි සටහනක ඇදින්න.

(a)  $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

5

$$\text{මෙවිට } \mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2\mathbf{I}$$

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \lambda \mathbf{I}, \text{ මෙහි } \lambda = 2 \text{ ඕව. } 5$$

10

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2\mathbf{I} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \mathbf{I}$$

10

$$\therefore \mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} 5$$

15

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ യേജി ഗനിം. } \quad (5)$$

$$\mathbf{AP} = \mathbf{PD} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$\Leftrightarrow$ $\begin{aligned} \frac{a+b}{\sqrt{2}} &= \frac{2}{\sqrt{2}} \\ \frac{-a+b}{\sqrt{2}} &= \frac{-8}{\sqrt{2}} \\ \frac{c+d}{\sqrt{2}} &= \frac{2}{\sqrt{2}} \\ \frac{-c+d}{\sqrt{2}} &= \frac{8}{\sqrt{2}} \end{aligned}$	$\Leftrightarrow$ $\begin{aligned} a+b &= 2 \\ -a+b &= -8 \\ c+d &= 2 \\ -c+d &= 8 \end{aligned}$	$a = 5$ $b = -3$ $c = -3$ $d = 5$
--	--	--

(10)

$$\therefore \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \quad (5)$$

30

ഉപരി ക്രമയക്

$$\mathbf{AP} = \mathbf{PD} \implies \mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1} \quad (10)$$

$$\therefore \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \quad (10)$$

30

$$(b) |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (5) \quad \text{ഈ} \quad \bar{z} = x - iy \quad (5)$$

10

$$|z|^2 = x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy) = z \bar{z} \quad (5)$$

$$z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy = 2i \operatorname{Im} z \quad (5)$$

20

$$\begin{aligned}
 |z - 3i|^2 &= (z - 3i)(\overline{z - 3i}) \quad (5) \\
 &= (z - 3i)(\bar{z} + 3i) \quad (5) \\
 &= z\bar{z} + 3i(z - \bar{z}) + 9 \quad (5) \\
 &= |z|^2 - 6\operatorname{Im}z + 9 \quad (5)
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 |1 + 3iz|^2 &= (1 + 3iz)(\overline{1 + 3iz}) \\
 &= (1 + 3iz)(1 - 3i\bar{z}) \\
 &= 1 + 3i(z - \bar{z}) + 9z\bar{z} \\
 &= 9|z|^2 - 6\operatorname{Im}z + 1 \quad (10)
 \end{aligned}$$

30

$$\begin{aligned}
 |z - 3i| &> |1 + 3iz| \\
 \Leftrightarrow |z - 3i|^2 &> |1 + 3iz|^2 \quad (5) \\
 \Leftrightarrow |z|^2 - 6\operatorname{Im}z + 9 &> 9|z|^2 - 6\operatorname{Im}z + 1 \quad (5) \\
 \Leftrightarrow 8(|z|^2 - 1) &< 0 \\
 \Leftrightarrow |z|^2 &< 1 \quad (5) \\
 \Leftrightarrow |z| &< 1 \quad (5)
 \end{aligned}$$

20

$$|z - 3i| > |1 + 3iz| \Leftrightarrow |z| < 1$$



15

## 14 වන ප්‍රශ්නය

14. (a)  $x \neq 1$  සඳහා  $f(x) = \frac{x^2}{x^3 - 1}$  යැයි ගනිමු.


$$x \neq 1 \text{ සඳහා } f'(x) = -\frac{x(x^3 + 2)}{(x^3 - 1)^2} \text{ බව පෙන්වා, } y = f(x) \text{ ප්‍රස්ථාරයට } (0, 0) \text{ හා } \left(-2^{1/3}, -\frac{4}{3}\right)$$

හිදී හැරුම් ලක්ෂ්‍ය පවතින බව අපෝහනය කරන්න.

හැරුම් ලක්ෂ්‍ය හා ස්පර්ශෝන්මුඩ දක්වමින්,  $y = f(x)$  ප්‍රස්ථාරයෙහි දළ සටහනක් අදින්න.

(b) මායිම සෘජුකෝෂික ලෙස හමුවන සරල රේඛා බණ්ඩ අවකින් සමන්විත ගෙවත්තක් රුපසටහනෙහි දැක්වේ. ගෙවත්තේ මාන මිටරවලින් එහි දක්වා ඇත. ගෙවත්තේ වර්ගතලය  $800 \text{ m}^2$  බව දී ඇත.  $x$  ඇසුරෙන්  $y$  ප්‍රකාශ කර, මිටරවලින් මතින ලද ගෙවත්තේ පරිමිතිය  $P$  යන්න  $P = \frac{800}{x} + 10x$  මගින් දෙන ලබන බව ද, පරිමිතිය සඳහා වන මෙම සූත්‍රය වලංගු වන්නේ  $0 < x < 10$  සඳහා පමණක් බව ද පෙන්වන්න.

ශේ නයින්, ගෙවත්තේ පරිමිතියෙහි අවම අගය සොයන්න.



(a)  $f(x) = \frac{x^2}{x^3 - 1} ; x \neq 1$

$$f'(x) = \frac{(x^3 - 1) 2x - x^2 \cdot 3x^2}{(x^3 - 1)^2} \quad (10)$$

$$= \frac{-x^4 - 2x}{(x^3 - 1)^2} = \frac{-x(x^3 + 2)}{(x^3 - 1)^2} \quad (5)$$

15

5

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ හේ } x^3 = -2$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ හේ } x = (-2)^{\frac{1}{3}} \quad (5)$$

$x$	$x < -2^{\frac{1}{3}}$	$-2^{\frac{1}{3}} < x < 0$	$0 < x < 1$	$x > 1$
$f'(x)$ හි ලකුණ	(-)	(+)	(-)	(-)

$f(x)$  අඩුවේ.  $f(x)$  වැඩිවේ.  $f(x)$  අඩුවේ.  $f(x)$  අඩුවේ.

$$x = 0 \quad \xi \quad f(0) = 0$$

$$x = (-2)^{\frac{1}{3}} \quad \xi \quad f(-2^{\frac{1}{3}}) = \frac{(-2^{\frac{1}{3}})^2}{-2 - 1} = -\frac{4}{3}$$

15

$$\therefore \text{හැරුම් ලක්ෂණය} = (0, 0) \text{ හා } \left(-2, -\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{3}} \text{ වේ.}$$

(5)

(5)

35


$$x \rightarrow +\infty \text{ විට } f(x) \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \text{ විට } f(x) \rightarrow 0$$

$x = 1$  සිදු  $f(x)$  අර්ථ නොදැක්වේ.

$$x \rightarrow 1^- \text{ විට } f(x) \rightarrow -\infty$$

$$x \rightarrow 1^+ \text{ විට } f(x) \rightarrow +\infty$$



25

$$(b) \text{ රූපයේ අයුරු ගෙවන්නේ පරිමිතිය ; } P = 18x + 4y \rightarrow (1) \quad (5)$$

$$\text{ගෙවන්නේ වර්ගීය ; } 800 = 4xy + 8x^2 \rightarrow (2) \quad (5)$$

$$(2) \text{ න්, } y = \frac{200}{x} - 2x \quad (5)$$

$$\therefore P = 18x + 4 \left( \frac{200}{x} - 2x \right)$$

$$= 10x + \frac{800}{x} \quad (5)$$

20

$$y = \frac{2(100 - x^2)}{x} \quad (5)$$

(5)

(5)

$$y > 0 \text{ සහ } x > 0 \text{ බැවින්, } 100 - x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 100 \Rightarrow x < 10 ; (x > 0 \text{ හිසා})$$

$$\therefore 0 < x < 10$$

15


$$\frac{dP}{dx} = 10 - \frac{800}{x^2} \quad (10)$$

$$(5) \frac{dP}{dx} = 0 \Leftrightarrow 10 - \frac{800}{x^2} = 0 \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 80$$

$$\Leftrightarrow x = 4\sqrt{5} \quad (5) \quad ; \quad 0 < x < 10$$

25



$x$	$0 < x < 4\sqrt{5}$	$4\sqrt{5} < x < 10$
$\frac{dP}{dx} = 10 - \frac{800}{x^2}$ හි ලකුණ	(-)	(+)
$P$ අඩු වේ.		$P$ වැඩි වේ.

(10)

$\therefore x = 4\sqrt{5}$  විට අවම අගයක් ගනී.

$$\begin{aligned} \therefore \text{අවම පරිමිතිය} &= 10 \times 4\sqrt{5} + \frac{800}{4\sqrt{5}} \\ &= 40\sqrt{5} + 40\sqrt{5} \\ &= 80\sqrt{5} \text{ m} \end{aligned} \quad (5)$$

15

## 15 වන ප්‍රශ්නය

15. (a) කොටස් වගයෙන් අනුකලනය හාවිතයෙන්  $\int x^2 \sin^{-1} x \, dx$  සොයන්න.

(b) සින්න හාග හාවිතයෙන්  $\int \frac{x^2 + 3x + 4}{(x^2 - 1)(x + 1)^2} \, dx$  සොයන්න.

(c)  $a^2 + b^2 > 1$  වන පරිදි  $a, b \in \mathbb{R}$  යැයි ද,

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{a + \cos x}{a^2 + b^2 + a \cos x + b \sin x} \, dx \quad \text{හා} \quad J = \int_0^{\pi/2} \frac{b + \sin x}{a^2 + b^2 + a \cos x + b \sin x} \, dx$$

යැයි ද ගනිමු.

$$aI + bJ = \frac{\pi}{2} \quad \text{බව පෙන්වන්න.}$$

$bI - aJ$  සැලකීමෙන්  $I$  හා  $J$  හි අගයන් සොයන්න.

$$(a) \int x^2 \sin^{-1} x \, dx = \int \sin^{-1} x \, d\left(\frac{x^3}{3}\right) \quad (5)$$

$$= \frac{x^3}{3} \sin^{-1} x - \frac{1}{3} \int x^3 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \quad (5) \quad (10)$$

$$= \frac{x^3}{3} \sin^{-1} x + \frac{1}{3} \int x^2 \, d(\sqrt{1-x^2}) \quad (10)$$

$$= \frac{x^3}{3} \sin^{-1} x + \frac{1}{3} \left[ x^2 \sqrt{1-x^2} - \int \sqrt{1-x^2} \cdot 2x \, dx \right] \quad (5) \quad (5)$$

$$= \frac{x^3}{3} \sin^{-1} x + \frac{1}{3} x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{2}{9} (1-x^2)^{3/2} + C \quad (5)$$

$C$  යනු අභිමත නියතයකි.

50

$$(b) \frac{x^2+3x+4}{(x^2-1)(x+1)^2} = \frac{x^2+3x+4}{(x-1)(x+1)^3} \quad (5)$$

$$\frac{x^2+3x+4}{(x-1)(x+1)^3} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+1)} + \frac{C}{(x+1)^2} + \frac{D}{(x+1)^3} \quad (10)$$

$$x^2 + 3x + 4 = A(x+1)^3 + B(x+1)^2(x-1) + C(x-1)(x+1) + D(x-1)$$

$$x = 1; \quad 1 + 3 + 4 = 8A \quad \Rightarrow \quad A = 1$$

$$x = -1; \quad 1 - 3 + 4 = -2D \quad \Rightarrow \quad D = -1$$

$x^3$  හි සංගුණක සැසදීමෙන් ;  $0 = A + B \Rightarrow B = -A = -1$

$$x^2 හි සංගුණක සැසදීමෙන් ; 1 = 3A - B + 2B + C \Rightarrow C = -1 \quad (10)$$

$$\therefore \frac{x^2 + 3x + 4}{(x^2 - 1)(x+1)^2} = \frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{(x+1)} - \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x+1)^3}$$

$$\int \frac{x^2 + 3x + 4}{(x^2 - 1)(x+1)^2} dx = \int \frac{1}{(x-1)} dx - \int \frac{1}{(x+1)} dx - \int \frac{1}{(x+1)^2} dx - \int \frac{1}{(x+1)^3} dx \quad (5)$$

$$= \ln|x-1| - \ln|x+1| + \frac{1}{(x+1)} + \frac{1}{2(x+1)^2} + C \quad (20)$$

C යනු අම්මත නියතයකි.

50

$$(c) \quad aI + bJ = \int_0^{\pi/2} \frac{a^2 + b^2 + a \cos x + b \sin x}{a^2 + b^2 + a \cos x + b \sin x} dx = \int_0^{\pi/2} dx = x \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} \longrightarrow (1) \quad (5) \quad (5)$$

$$bI - aJ = \int_0^{\pi/2} \frac{ba + b \cos x - ab - a \sin x}{a^2 + b^2 + a \cos x + b \sin x} dx \longrightarrow (2) \quad (5)$$

$$= \ln(a^2 + b^2 + a \cos x + b \sin x) \Big|_0^{\pi/2}, \quad (10) \quad a^2 + b^2 > 1 ත්වර,$$

$$= \ln(a^2 + b^2 + b) - \ln(a^2 + b^2 + a) \quad (10)$$

$$= \ln \left( \frac{a^2 + b^2 + b}{a^2 + b^2 + a} \right)$$

$$(1) \times a + (2) \times b \Rightarrow I = \frac{1}{a^2 + b^2} \left\{ a \frac{\pi}{2} + b \ln \left( \frac{a^2 + b^2 + b}{a^2 + b^2 + a} \right) \right\} \quad (5)$$

$$(1) \times b + (2) \times a \Rightarrow J = \frac{1}{a^2 + b^2} \left\{ b \frac{\pi}{2} - a \ln \left( \frac{a^2 + b^2 + b}{a^2 + b^2 + a} \right) \right\} \quad (5)$$

50

## 16 වන ප්‍රශ්නය

16. (a)  $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$  සමිකරණය මගින් දෙනු ලබන  $S$  වෘත්තයේහි කේන්ද්‍රයේ බණ්ඩාක හා අරය සොයා,  $xy$  තලය මත  $S$  වෘත්තයේහි දළ සටහනක් අදින්න.

$P$  යනු  $S$  වෘත්තය මත  $O$  මූලයේහි සිට ඇතින් ම පිහිටි ලක්ෂණය යැයි ගනිමු.  $P$  ලක්ෂණයේ බණ්ඩාක ලියා දක්වා  $S$  වෘත්තයට  $P$  ලක්ෂණයේහිදී වූ ස්පර්ශක රේඛාව වන  $l$  හි සමිකරණය  $x + y = 2 + \sqrt{2}$  මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.

$l$  රේඛාව ස්පර්ශ කරන  $S'$  වෘත්තයක්,  $S$  වෘත්තය  $P$  ගෙන් ප්‍රහිත්ත ලක්ෂණයකදී බාහිර ව ස්පර්ශ කරයි.  $(h, k)$  යනු  $S'$  වෘත්තයේහි කේන්ද්‍රයේ බණ්ඩාක යැයි ගනිමු.  $l$  රේඛාව අනුබද්ධයෙන්  $O$  හා  $S'$  හි කේන්ද්‍රයේ පිහිටිම සලකා බැලීමෙන්,  $h + k < 2 + \sqrt{2}$  බව පෙන්වන්න.


$S'$  හි කේන්ද්‍රයේ බණ්ඩාක  $h^2 - 2hk + k^2 + 4\sqrt{2}(h+k) = 8(\sqrt{2}+1)$  සමිකරණය සපුරාලන බව තවදුරටත් පෙන්වන්න.

5

$S \equiv x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$  වෘත්තයේ සමිකරණය  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$  ලෙස ලිවිය හැකිය.

∴ කේන්ද්‍රය  $= (1, 1)$  5 අරය  $= 1$  5

15



10

$$OP = OC + CP = \sqrt{2} + 1 \text{ සහ } P \equiv (OP \cos \frac{\pi}{4}, OP \sin \frac{\pi}{4}) \text{ වන නිසා}$$

$$P = (1 + \frac{1}{\sqrt{2}}, 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}) \text{ ඕ. } 5$$

20

$CP$  රේඛාවේ අනුකූලතය  $= 1$ ,  $(5)$   $OP \perp l$  නිසා  $l$  රේඛාවේ අනුකූලතය  $= -1$   $(5)$

$$\therefore l \text{ රේඛාවේ සමීකරණය } \left[ y - \left( 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] = -1 \left[ x - \left( 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] \quad (10)$$

$$\Rightarrow x + y = 2 + \sqrt{2} \quad (5)$$

25

$(0, 0)$  හා  $(h, k)$  ලක්ෂ්‍ය දෙක  $l : x + y - (2 + \sqrt{2}) = 0$  රේඛාවේ එකම පැන්තේ පිහිටයි.  $(5)$

$$\therefore -(2 + \sqrt{2}) [ h + k - (2 + \sqrt{2}) ] > 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow h + k < 2 + \sqrt{2} \quad (5)$$

15

$C' \equiv (h, k)$  සිට  $l$  රේඛාවට ලමිල දුර  $d$  නම්,

$$d = \frac{|h + k - (2 + \sqrt{2})|}{\sqrt{2}} \quad (10)$$

$$d = \frac{(2 + \sqrt{2}) - (h + k)}{\sqrt{2}} \quad (5) \quad (h + k < 2 + \sqrt{2} \text{ නිසා})$$

$S'$  වෘත්තය  $l$  රේඛාව ස්ථාපිත කරන බැවින් ඉහත ලමිල දුර  $S'$  හි අරයට සමාන විය යුතුය.  $(10)$

$S$  හා  $S'$  වෘත්ත දෙක බාහිරව ස්ථාපිත වන බැවින්

$$CC' = 1 + d \quad (10)$$

$$\Rightarrow CC'^2 = (1 + d)^2$$

$$\Rightarrow (h - 1)^2 + (k - 1)^2 = \left[ 1 + \frac{(2 + \sqrt{2}) - (h + k)}{\sqrt{2}} \right]^2 \quad (10)$$

$$\Rightarrow 2h^2 + 2k^2 - 4h - 4k + 4 = [2 + 2\sqrt{2} - h - k]^2$$

$$(5) \qquad \qquad \qquad = (2 + 2\sqrt{2})^2 - 2(2 + 2\sqrt{2})h - 2(2 + 2\sqrt{2})k + 2hk + h^2 + k^2 \quad (10)$$

$$\Rightarrow h^2 - 2hk + k^2 + 4\sqrt{2}(h + k) = 8(\sqrt{2} + 1) \quad (5)$$

65

17. (a)  $\cos \alpha + \cos \beta - \cos \gamma - \cos(\alpha + \beta + \gamma) = 4 \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \sin \frac{1}{2}(\beta + \gamma) \sin \frac{1}{2}(\gamma + \alpha)$  සහ සාමාජ සාධනය කරන්න.

(b)  $f(x) = 2 \sin^2 \frac{x}{2} + 2\sqrt{3} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 4 \cos^2 \frac{x}{2}$  යැයි ගනිමු.  $f(x)$  යන්න  $a \sin(x + \theta) + b$  ආකාරයට ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි  $a (> 0)$ ,  $b$  හා  $\theta (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$  නිර්ණය කළ යුතු තියතා වේ.  
 $1 \leq f(x) \leq 5$  බව අපෝගනය කරන්න.

$$-\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{11\pi}{6} \text{ සඳහා } y = f(x) \text{ හි ප්‍රස්ථාරයෙහි දළ සටහනක් අදින්න.}$$

(c)  $p > 2q > 0$  යැයි ගනිමු.

$ABC$  ත්‍රිකේරුණයක  $BC$ ,  $CA$  හා  $AB$  පාදවල දිග පිළිවෙළින්  $p + q$ ,  $p$  හා  $p - q$  වේ.

$\sin A - 2 \sin B + \sin C = 0$  බව පෙන්වා  $\cos \frac{A-C}{2} = 2 \cos \frac{A+C}{2}$  බව අපෝගනය කරන්න.

(a)  $\cos \alpha + \cos \beta - \cos \gamma - \cos(\alpha + \beta + \gamma)$

$$= \cos \alpha + \cos \beta - (\cos \gamma + \cos(\alpha + \beta + \gamma)) \quad (5)$$

$$= 2 \cos \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right) - 2 \cos \left( \frac{\alpha + \beta + 2\gamma}{2} \right) \cos \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \quad (5) + (5)$$

$$= 2 \cos \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \left[ \cos \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right) - \cos \left( \frac{\alpha + \beta + 2\gamma}{2} \right) \right] \quad (5)$$

$$= 2 \cos \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) 2 \sin \left( \frac{\alpha + \gamma}{2} \right) \sin \left( \frac{\beta + \gamma}{2} \right) \quad (5)$$

$$= 4 \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \sin \frac{1}{2}(\alpha + \gamma) \sin \frac{1}{2}(\beta + \gamma)$$

25

(b)  $f(x) = 2 \sin^2 \frac{x}{2} + 2\sqrt{3} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 4 \cos^2 \frac{x}{2}$

$$= (1 - \cos x) + \sqrt{3} \sin x + 2(1 + \cos x) \quad (10)$$

$$= \sqrt{3} \sin x + \cos x + 3$$

$$= 2 \left[ \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right] + 3 \quad (5)$$

$$= 2 \left[ \cos \frac{\pi}{6} \sin x + \sin \frac{\pi}{6} \cos x \right] + 3 \quad (5)$$

$$= 2 \sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right) + 3 \quad (5)$$

$$a = 2, \quad b = 3, \quad \theta = \frac{\pi}{6} \quad (10)$$

35


$$-1 \leq \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1 \quad (5)$$

$$-2 \leq 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 2 \quad (5)$$


$$-2 + 3 \leq 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3 \leq 2 + 3$$

$$1 \leq f(x) \leq 5 \quad (5)$$

15



20



സിന് നീതിയ യെറിമേൻ,

$$\frac{\sin A}{p+q} = \frac{\sin B}{p} = \frac{\sin C}{p-q} = k \quad \text{യെറി സിനമു.} \quad (5)$$

(5) (5)

$$\Rightarrow \sin A - 2 \sin B + \sin C = k(p+q) - 2kp + k(p-q) = 0 \quad (10)$$

25

$$\sin A + \sin C = 2 \sin B$$

(5)

$$2 \sin \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin(\pi - \overline{A+C}) \quad (10)$$

$$\sin \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} = \sin(A+C) \quad (5)$$

$$\sin \left( \frac{A+C}{2} \right) \cos \left( \frac{A-C}{2} \right) = 2 \sin \left( \frac{A+C}{2} \right) \cos \left( \frac{A+C}{2} \right) \quad (5)$$

$$\cos \left( \frac{A-C}{2} \right) = 2 \cos \left( \frac{A+C}{2} \right) \quad (5)$$

$$\left( 0 < \frac{A+C}{2} < \frac{\pi}{2} \quad \therefore \quad \sin \left( \frac{A+C}{2} \right) > 0 \right)$$

30


2.2.3. II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි ප්‍රශ්න සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරික්ෂණ, නිගමන භා යෝජනා

**(10) සංයුත්ත ගණිතය II - A කොටස**

1 වන ප්‍රශ්නය

1. අංගුවක්  $O$  ලක්ෂයක සිට තිරසට  $\frac{\pi}{3}$  කෝණයකින් ආනතව  $u$  වේගයකින් ගුරුත්වය යටතේ ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. අංගුව  $k$  දුරක් තිරස්ව ගමන් කළ විට  $O$  හි මධ්‍යමව ඉහළින් එහි සිරස් දුර  $h$  යැයි ගනීමු.

$$\sqrt{3k} = h + \frac{2gk^2}{u^2} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$



*O* සිට *A* දක්වා  $s = ut + \frac{1}{2} at^2$  යොදීමෙන,

$$\uparrow \quad h = \frac{\sqrt{3}u}{2}T - \frac{1}{2}gT^2 \quad \dots \dots \dots \quad (2) \quad \textcircled{10}$$

$$(1) \text{ ଏହା } (2) \text{ ଏହା, } h = \sqrt{3}k - \frac{1}{2}g \left( \frac{2k}{\mu} \right)^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{3k} = h + \frac{1}{2}g \frac{4k^2}{\mu^2}$$


$$\Rightarrow \sqrt{3}k = h + \frac{2gk^2}{u^2}$$

25

## 2 වන ප්‍රශ්නය

2. පළල  $b$  වූ වැන් රථයක් ඒකාකාර  $u$  ප්‍රවේගයෙන් සෑදු පාරක් දිගේ පදිංචි වේදිකාවට සමාන්තරව එහි ගැටී නොගැටී ගමන් කරයි. පිරිමි ලමයක් වැන් රථයට  $d$  දුරක් ඉදිරියෙන් පදිංචි වේදිකාවේ සිට පාරට බැස, වැන් රථයේ වලින දිගාව සමග  $\alpha$  සුළු කෝණයක් සාදන දිගාවට  $v (< u \sec \alpha)$  ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ඇවිධි යයි. ලමයා, වැන් රථයෙහි නොහැඳි, යන්තමින් බේරෙයි නම්,  $bu = (b \cos \alpha + d \sin \alpha) v$  බව පෙන්වන්න.

$B$  - පිරිමි ලමය  
 $V$  - වැන් රථය



$$\text{Vel}(B, E) = \begin{array}{c} \alpha \\ \nearrow v \end{array}$$

$$\text{Vel}(V, E) = \begin{array}{c} u \\ \uparrow \end{array}$$

$$\text{Vel}(B, V) = \begin{array}{c} \theta \\ \searrow \end{array} \quad (5)$$

$$\text{Vel}(B, V) = \text{Vel}(B, E) + \text{Vel}(E, V) \quad (5)$$

$$= \begin{array}{c} \alpha \\ \nearrow v \end{array} + \begin{array}{c} \downarrow u \end{array} = \begin{array}{c} v \sin \alpha \\ \downarrow u - v \cos \alpha \end{array}$$

$$\tan \theta = \frac{v \sin \alpha}{u - v \cos \alpha} \quad (5)$$


$$\Rightarrow \frac{b}{d} = \frac{v \sin \alpha}{u - v \cos \alpha} \quad (5)$$

$$\Rightarrow bu = (b \cos \alpha + d \sin \alpha) v$$

25

### 3 වන ප්‍රශ්නය

3. ස්කන්ධය  $m$  වූ අංගුවක්, සුමත තිරස් මෙසයක් මත නිසල ව ඇත. එක එකක ස්කන්ධය  $2m$  වූ අංගු දෙකක් මෙසය මත ප්‍රතිවිරැද්‍ය දිකාවලට  $u$  හා  $2u$  වේගවලින්, නිසල ව තිබෙන අංගුව දෙසට වලනය වෙමින් එය සමග එකවිට ගැටී හා වේ. ගැටුම්වලට පසු සංපුක්ත අංගුවේ වේගය සොයා, ගැටුම් නිසා සිදුවන වාලක ගක්ති හානිය  $\frac{23}{5} mu^2$  බව පෙන්වන්න.



$$\text{පද්ධතියට } \mathbf{I} = \Delta(m\mathbf{v}) \text{ යොදීමෙන්,}$$

$$\longrightarrow 0 = 5mv - (2m \times 2u - 2mu) \quad (10)$$

$$\therefore v = \frac{2u}{5} \quad (5)$$

$$\Delta T = \frac{1}{2} (5m)v^2 - \frac{1}{2} (2m)(2u)^2 - \frac{1}{2} (2m)u^2 \quad (5)$$

$$= \frac{1}{2} (5m) \left( \frac{2u}{5} \right)^2 - 4mu^2 - mu^2$$



$$= \frac{2mu^2}{5} - 5mu^2 = - \frac{23}{5} mu^2 \quad (5)$$

$$\therefore \text{වාලක ගක්ති හානිය} = \frac{23}{5} mu^2$$

25

#### 4 වන ප්‍රශ්නය

4. ස්කන්ධය  $m$  වූ අංශුවක් තිරසට ආනතිය  $\alpha$  වූ අවල සුම්මත තලයක් මත නිසලව ඇති අතර එය, තලයේ ඉහළ ම කෙළවරෙහි වූ කුඩා සුම්මත කප්පීයක් මතින් යන සැහැල්ල අවිතනය තන්තුවක් මගින්, නිදහසේ එල්ලන  $M$  ( $M > m \sin \alpha$ ) ස්කන්ධයකට සම්බන්ධ කර ඇත. රුපයේ දක්වා ඇති පරිදි,  $M$  ස්කන්ධය කප්පීය ආසන්නයේ තබා ආනත තලයේ උපරිම බැවුම් රෙඛාවක් දිගේ තන්තුව තදුව පද්ධතිය නිශ්චලනාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ. ස්කන්ධය  $m$  වූ අංශුව තලය දිගේ ඉහළට  $d$  දුරක් වලනය වූ විට එහි වේගය  $v$  යන්න ( $M + m$ )  $v^2 = 2gd(M - m \sin \alpha)$  මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.



$\mathbf{F} = ma$  යෙදීමෙන්,

$$(m) \rightarrow T - mg \sin \alpha = mf \quad (5)$$

$$(M) \downarrow Mg - T = Mf \quad (5)$$

$$\therefore f = \frac{(M - m \sin \alpha)g}{(M + m)} \quad (5)$$

$$(m) \nearrow v^2 = u^2 + 2as \text{ යෙදීමෙන්, } v^2 = 2(f)(d) = 2 \frac{(M - m \sin \alpha)}{(M + m)} gd$$

$$\Rightarrow (M + m)v^2 = 2gd(M - m \sin \alpha) \quad (5) \quad 25$$

#### විකල්ප විසඳුම

ඉහත රුප සටහනට


(5)

$$\text{ගක්නි සංස්ථීත නියමයෙන්, } \frac{1}{2} Mv^2 + \frac{1}{2} mv^2 = Mg d - mg d \sin \alpha \\ = (M - m \sin \alpha)gd$$

$$\Rightarrow (M + m)v^2 = 2gd(M - m \sin \alpha) \quad (5) \quad 25$$

## 5 වන ප්‍රශ්නය

5. සුපුරුදු අංකනයෙන්,  $O$  අවල මූලයකට අනුබද්ධයෙන්  $A$  හා  $B$  ලක්ෂා දෙකක පිහිටුම් දෙයික පිළිවෙළින්  $\mathbf{i}$  හා  $\mathbf{i} + \mathbf{j}$  යැයි ගතිමු.  $C$  යනු  $A$  හරහා  $OB$  ට සමාන්තර සරල රේඛාව මත වූ ලක්ෂායක් යැයි ද ගතිමු.  $\overrightarrow{OC} = (1+\lambda)\mathbf{i} + \lambda\mathbf{j}$  බව පෙන්වන්න; මෙහි  $\lambda$  යනු තාත්ත්වික සංඛ්‍යාවක් වේ.  $OB$  ට  $BC$  ලම්බ වන පරිදී වූ  $\lambda$  හි අය සොයන්න.



$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} \text{ සහ } \overrightarrow{AC} = \lambda(\mathbf{i} + \mathbf{j}), \text{ මෙහි } \lambda \in \mathbb{R} \quad (5)$$

$$\therefore \overrightarrow{OC} = \mathbf{i} + \lambda(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \quad (5)$$

$$= (1+\lambda)\mathbf{i} + \lambda\mathbf{j} \quad (5)$$

$$BC \perp OB \Rightarrow \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OB} = 0 \quad \dots \dots \dots \quad (1) \quad (5)$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC}$$

$$= -\mathbf{i} - \mathbf{j} + (1+\lambda)\mathbf{i} + \lambda\mathbf{j} \quad (5)$$

$$= \lambda\mathbf{i} + (\lambda - 1)\mathbf{j} \quad (5)$$

(1) ත්

$$[\lambda\mathbf{i} + (\lambda - 1)\mathbf{j}] \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j}) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda + (\lambda - 1) = 0$$



$$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

(5)

25

## 6 වන ප්‍රශ්නය

6. රං තිරස් මෙසයක් මත නිසල ව ඇති බර  $w_1$  වූ ලේ කුවිටියක්, සැහැල්ලු අවිතනා  $BC$  තන්තුවකින් සිරස් බිත්තියක් මත පිහිටි කුඩා අවල ඇණයකට රුපයෙහි දක්වා ඇති පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. තන්තුවේ  $A$  ලක්ෂායකදී බර  $w_2$  වූ අංගුවක් ගැටෙසා ඇත්තේ  $CA$  යට අත් සිරස සමග  $\alpha$  කේෂයක් සාදන පරිදි ය.  $AB$  කොටස තිරස් නම් සහ කුවිටිය සීමාකාරී සමතුලිතනාවයේ ඇත්තම්,  $\mu w_1 = w_2 \tan \alpha$  බව පෙන්වන්න. මෙහි  $\mu$  යනු කුවිටිය හා මෙසය අතර සර්ථක සංගුණකය වේ.



$$\begin{array}{l} (w_1) \uparrow R = w_1 \\ F = \mu R = \mu w_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} (5) \\ (5) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{පද්ධතියට } \rightarrow T_1 \sin \alpha = F \\ (w_2) \qquad \qquad \qquad T_1 \cos \alpha = w_2 \end{array} \quad \left. \right\} \quad \begin{array}{c} (5) \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \tan \alpha &= \frac{F}{w_2} \\ \Rightarrow w_2 \tan \alpha &= \mu w_1 \end{aligned} \quad \begin{array}{c} (5) \end{array}$$

25

## 7 වන ප්‍රශ්නය

7.  $A, B$  හා  $C$  යනු  $\Omega$  නියැදි අවකාශයක අතෙක්තානාය වශයෙන් බහිජ්කාර හා තිරවණී සිද්ධි කුනක් යැයි ගතිම්.  $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ ,  $P(B \cup C) = \frac{1}{2}$  හා  $P(C \cup A) = \frac{2}{3}$  යන සම්බාධිතා එකවිට තිබිය හැකි ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

ନୋହେକି ଯ.

5

*A* һа *B* պեսանաս վշտեն ինչպէս կար նիս,

5

5

*A, B හා C නිරවශේෂ සිද්ධි බැවින්,*

$$A \cup B \cup C = \Omega$$

5

(4) හා (5) සමාන තොවන බැවින් ඉහත සම්භාවිතා සපරාලන පරිදි

$A$ ,  $B$  හා  $C$  සිද්ධී පැවතිය නොහැකිය.

5

## 8 වන ප්‍රශ්නය

8.  $A$  හා  $B$  යනු  $\Omega$  නියැදි අවකාශයක සිද්ධී දෙකක් යැයි ගනිමු.  $P(A \setminus B) = P(A \setminus B')$  තම  $A$  හා  $B$  ස්වායන්ත බව පෙන්වන්න; මෙහි  $B'$  මගින්  $B$  හි අනුපූරක සිද්ධිය දැක්වේ.

$$P(A \setminus B) = P(A \setminus B')$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B')}{P(B')} \quad [P(B) \neq 0, P(B') \neq 0] \quad (5)$$

$$= \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)} \quad [P(B) \neq 0, 1 \text{ එනම් } 0 < P(B) < 1] \quad (5)$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) - P(B) P(A \cap B) = P(A) P(B) - P(B) P(A \cap B) \quad (5)$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) P(B) \quad (5)$$

$\therefore A$  හා  $B$  ස්වායන්ත වේ. (5)

25

9 වන ප්‍රශ්නය

**9.** පහත දැක්වෙන නිරීක්ෂණ අටෙහි මධ්‍යනාය හා මාතය පිළිවෙළින් 4 හා 6 වේ.

2, 3, 6, 2, 1,  $x$ ,  $y$ ,  $z$

මෙහි  $x$ ,  $y$  හා  $z$  තාන්ත්‍රික සංඛ්‍යා වේ.  $x$ ,  $y$  හා  $z$  හි අගයන් සොයා, නිරීක්ෂණ අවබෝ සම්මත අපගමනය ගණනය කරන්න.

ମଧ୍ୟନୟ ପାତା ୫ ଲେଖିବ,

$$2 + 3 + 6 + 2 + 1 + x + y + z = 4 \times 8$$

ମାତ୍ର 6 ଲୈଖିନ୍ ଅଛୁଟ 3ହୁ 2କୁ ଲନ୍ 6 ଲିଙ୍ ଯୁଦ୍ଧାଯ.

(1) ට අනුව අනෙක් අයුරාතය දී 6 විය යුතුය.

$$\therefore x = y = z = 6$$

$$\text{සම්මත අපගමනය} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{4+1+4+4+9+3\times 4}{8}}$$


$$= \sqrt{\frac{34}{8}} = \frac{\sqrt{17}}{2}$$

25

## 10 වන ප්‍රශ්නය

10. සංඛ්‍යාත වගුවකට පළලින් සමාන පන්ති ප්‍රාන්තර පහක් ඇත. තෙවන පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය ලක්ෂය 22.5 වේ. පස්වන පන්ති ප්‍රාන්තරයේ උච්ච පන්ති මායිම 40 වේ. පළමුවන පන්ති ප්‍රාන්තරයේ සිට අනුපිළිවෙළින් පන්ති ප්‍රාන්තරවල සංඛ්‍යාත 7, 19, 27, 15 හා 2 වේ. ව්‍යාප්තියේ මාතය ගණනය කරන්න.

පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම (පළල) =  $2x$  යයි ගනිමු.



$$\therefore 5x = 40 - 22.5 \quad (5)$$

$$x = 3.5 \quad (5)$$

මාතය ඇතුළත් වන්නේ 3 වන පන්ති ප්‍රාන්තය වන  $19 - 26$  අය.

$$\therefore \text{මාතය} = 19 + \left( \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) C, \text{ මෙහි } \Delta_1 = 27 - 19 = 8, \Delta_2 = 27 - 15 = 12, C = 7 \quad (5)$$

$$= 19 + \frac{8}{20} \times 7$$

$$= 21.8 \quad (5)$$

25

## (10) සංයුක්ත ගණිතය II - B කොටස


### 11 වන ප්‍රශ්නය

**11.(a)** අංගුවක්, අවල දැඩි තිරස් ගෙවීමක වූ ලක්ෂායකින් සිරස්ව උතු අතට  $u$  ප්‍රවේගයකින් ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. ගුරුත්වය යටතේ වලනය වීමෙන් පසු එය ගෙවීම හා ගැවෙයි. අංගුව හා ගෙවීම අතර ප්‍රත්‍යාගති සංග්‍රහකය  $e$  ( $0 < e < 1$ ) වේ.

- (i) තුන්වෙනි ගැටුම දක්වා අංගුවේ වලිතය සඳහා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයෙහි දළ සටහනක් අදින්න.
  - (ii) තුන්වෙනි ගැටුම දක්වා අංගුව ගන්නා කාලය  $\frac{2u}{g} (1 + e + e^2)$  බව පෙන්වන්න.
  - (iii) නිශ්චලතාවට පැමිණීමට අංගුව ගන්නා මුළු කාලය  $\frac{2u}{g (1 - e)}$  බව තවදුරටත් පෙන්වන්න.
- (b) මුළු ස්කන්ධය මෙටරික් ටොන් 300ක් වූ දුම්රියක්, එන්ඡ්ම ක්‍රියා විරහිත කර, තිරසට  $\sin^{-1}\left(\frac{1}{98}\right)$  ආනතියක් ඇති සෑපු දුම්රිය මාර්ගයක් දිගේ පහළට නියත වේ. දුම්රියේ ඉහළට වලිතය කෙරෙහි සර්පණ ප්‍රතිරෝධයේ විශාලත්වය, පහළට වලිතයේදී වූ නියත අගයේම පවතිය නම්, දුම්රිය නියත  $54 \text{ km h}^{-1}$  වේ. දුම්රියකින් එම දුම්රිය මාර්ගයේ ම ඉහළට ඇදගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය ජවය  $900 \text{ kW}$  බව පෙන්වන්න.

දුම්රිය සෑපු තිරස් මාර්ගයක, කළුන් තිබුණු විශාලත්වයම ඇති ප්‍රතිරෝධයක් සහිතව  $18 \text{ km h}^{-1}$  ක වේ. [ගුරුත්වය න්වරණය  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ලෙස ගන්න.]

**(a) (i)**



**(ii)** පළමුවන ගැටුම සඳහා ගතවන කාලය  $T_1$  යැයි ගනිමු.

$$T_1 / 2 = u/g \Rightarrow T_1 = 2u/g \quad (5)$$

පළමුවන ගැටුමේ සිට දෙවන ගැටුම දක්වා කාලය

$$T_2 = 2eu/g \quad (5)$$

දෙවන ගැටුමේ සිට තුන්වන ගැටුම දක්වා කාලය

$$T_3 = 2e^2 u/g \quad (5)$$

$$\text{තුන්වන ගැටුම දක්වා ගතවන මුළු කාලය} = T_1 + T_2 + T_3 = \frac{2u}{g} (1 + e + e^2) \quad (5)$$

(iii) අංශුවට නිශ්චලතාවට පත්වීම සඳහා ගතවන කාලය

$$= T_1 + T_2 + T_3 + \dots \quad (5)$$

$$= \frac{2u}{g} (1 + e + e^2 + e^3 + \dots) \quad (5)$$


$$= \frac{2u}{g} \sum_{r=0}^{\infty} e^r \quad (5)$$

$$= \frac{2u}{g} \frac{1}{(1-e)} \quad (5)$$

$$= \frac{2u}{g(1-e)}$$

70

(b) දුම්රියේ ස්කන්ධය  $M = 300\,000 \text{ kg}$



$$\sin \alpha = \frac{1}{98}$$

(5)

දුම්රිය ආනන තලය ඔස්සේ නියත ප්‍රවේගයෙන් පහළට වලනය වේ.

$\downarrow F = ma$  යෙදීමෙන්,

$$Mg \sin \alpha - R = 0 \quad (10)$$

$$300\,000 \times 9.8 \times \frac{1}{98} - R = 0$$

$$R = 30\,000 \text{ N} \quad (5)$$

සැඩු අත් වලිනය සඳහා

$$V = 54 \text{ km h}^{-1} = \frac{54 \times 1000}{60 \times 60}$$

$$V = 15 \text{ ms}^{-1} \quad (5)$$

ප්‍රකරණ බලය  $K$  යැයි ගනිමු.  $\nearrow F = ma$

$$K - R - Mg \sin \alpha = 0 \quad (10)$$

$P = FV$  යෙදීමෙන්

$$\text{ඡවය, } P = (R + Mg \sin \alpha) V$$

$$= (30\ 000 + 30\ 000) \times 15 = 900\ 000$$

$$= 900 \text{ kW}$$

(5)

40

ප්‍රවේශය  $V = 18 \text{ km h}^{-1} = \frac{18\ 000}{60 \times 60} \text{ m s}^{-1}$  (5)

$$= 5 \text{ m s}^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{ප්‍රකරණ බලය} &= \frac{P}{V} \\ &= \frac{900\ 000}{5} \text{ N} && (10) \\ &= 180\ 000 \text{ N} && (5) \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \mathbf{F} = ma$$

$$180\ 000 - 30\ 000 = 300\ 000 \times a; \text{ මෙහි } a \text{ යනු ත්වරණය වේ.} \quad (10)$$


$$\text{ත්වරණය} = \frac{150\ 000}{300\ 000} \quad (5)$$

$$a = \frac{1}{2} \text{ m s}^{-2} \quad (5)$$

40

## 12 වන ප්‍රශ්නය

- 12.(a)** ABC ත්‍රිකෝණය, ස්කන්දය M වූ එකාකාර සුමට කුක්කුයක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මස්සේ වූ සිරස්කඩි. AC හා BC රේබා අදාළ මුහුණෙන්වල වැඩිතම බැවුම රේබා වන අතර BA හා AC රේබා BC සමග සමාන  $\alpha$  ( $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ ) කේත සාදයි. තිරසට  $\alpha$  කේතයක ආනතියකින් යුතු අවල සුමට තලයක් මත BC අන්තර්ගත මුහුණෙන් ඇතිව ද, AB තිරසට ද කුක්කුය රුපයේ දැක්වෙන පරිදි තබා ඇත. ස්කන්ද පිළිවෙළින්  $m_1$  හා  $m_2$  වන P



හා Q අංශ දෙකක්, පිළිවෙළින් AB හා AC මත තබා, A ගිරුපයෙහි වූ කුඩා සුමට කප්පියක් උඩින් යන සැහැල්ල අවිතනා තන්තුවකින් සම්බන්ධ කර ඇත. තන්තුව තදව, පද්ධතිය නිශ්චලතාවෙහි සිට මුදා හරිනු ලැබේ.

එක් එක් අංශවේ කුක්කුයට සාපේක්ෂව ත්වරණයන්, කුක්කුයේ ත්වරණයන් නිර්ණය කිරීම සඳහා P අංශවට BA දිගේ ද, Q අංශවට AC දිගේ ද, මුළු පද්ධතියට BC දිගේ ද වලින සම්කරණ ලියා දක්වන්න.

$m_1 = m_2$  නම්, කුක්කුයට සාපේක්ෂව එක් එක් අංශවේ ත්වරණය ඉනා වන බව ද, කුක්කුයේ ත්වරණයේ විශාලත්වය  $gsin\alpha$  බව ද පෙන්වන්න.


- (b)** ස්කන්දය  $m$  වූ P අංශවක්, අරය  $a$  හා කේන්ද්‍රය O වූ අවල ගෝලයක සුමට බාහිර පෘෂ්ඨයේ ඉහළ ම ලක්ෂණයෙහි තබා ඇත. ස්කන්දය  $2m$  වූ වෙනත් Q අංශවක් තිරසට  $u$  ප්‍රවේශයෙන් වලනය වෙමින් P සමග සරල ලෙස ගැටෙයි. P හා Q අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය  $\frac{1}{2}$  වේ. ගැටුමෙන් මොහොත්කට පසු P අංශවේ ප්‍රවේශය සොයන්න.

$OP$  අරය  $\theta$  කේතයකින් හැරි ඇති විට තවමත් P අංශව ගෝලය සමග ස්ථාපිත ඇතැයි උපකල්පනය කරමින්, P අංශව මත ගෝලය මගින් ඇති කෙරෙන ප්‍රතිත්ව්‍යාවේ විශාලත්වය  $\frac{m}{a} [ ga(3 \cos \theta - 2) - u^2 ]$  බව පෙන්වන්න.

$u = \sqrt{ga}$  නම්, Q සමග ගැටුමෙන් මොහොත්කට පසු P අංශව ගෝලය පෘෂ්ඨය හැර යන බව ද පෙන්වන්න.

ବିଭାଗ 10

(a)



$$\text{acc}(W, E) = \frac{\alpha}{F}$$

$$\text{acc}(P, W) = f$$

$$\text{acc}(Q, W) = \frac{2\alpha}{f}$$

$$\text{acc}(P, E) = f \frac{\alpha}{F}$$

$$\text{acc}(Q, E) = \frac{\alpha}{F} \frac{\alpha}{f}$$

$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$  ଦେଖିଲେମନ୍,

$$P \text{ ବିଭାଗ } \leftarrow \quad T = m_1(f + F \cos \alpha) \quad \dots \dots \dots \quad (1) \quad 10$$

$$Q \text{ ବିଭାଗ } \leftarrow \quad m_2 g \sin 2\alpha - T = m_2(f + F \cos \alpha) \quad \dots \dots \dots \quad (2) \quad 10$$

ପଦ୍ଧତିକ ବିଭାଗ  $\frac{\alpha}{F}$

$$(M + m_1 + m_2) g \sin \alpha = MF + m_1(f \cos \alpha + F) + m_2(f \cos \alpha + F) \quad \dots \dots \dots \quad (3) \quad 10$$

50

$$m_1 = m_2$$

$$(1) + (2) \longrightarrow m_1 g \sin 2\alpha = m_1 2(f + F \cos \alpha)$$

$$f + F \cos \alpha = g \sin \alpha \cos \alpha \quad \dots \dots \dots \quad (4) \quad 5$$

$$(3) \Rightarrow (M + 2m_1) g \sin \alpha = MF + 2m_1(F + f \cos \alpha)$$

$$= (M + 2m_1)F + 2m_1 f \cos \alpha \quad 5$$

$$g \sin \alpha = F + \frac{2m_1}{M + 2m_1} f \cos \alpha \quad \dots \dots \dots \quad (5) \quad 5$$



$$(4) + (5) \cos \alpha \Rightarrow f = \frac{2m_1}{M + 2m_1} f \cos^2 \alpha \quad 5$$

$$Mf + 2m_1 \sin^2 \alpha f = 0 \Rightarrow f = 0 \quad 5$$

$$\text{ଏହି } (5), \Rightarrow F = g \sin \alpha$$

25

(b)



$$\mathbf{I} = \Delta(m\mathbf{v}) \longrightarrow \text{අංු සඳහා}$$

$$0 = 2mv_2 + mv_1 - 2mu \quad \textcircled{10}$$

$$2v_2 + v_1 = 2u \quad \dots \dots \dots \text{(1)}$$


නිවිතන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමය :

$$v_1 - v_2 = \frac{1}{2} u \quad \textcircled{10}$$

$$2v_1 - 2v_2 = u \quad \dots \dots \dots \text{(2)}$$

$$(1) + (2) \Rightarrow v_1 = u \quad \textcircled{5}$$

25



ගක්ති සංස්ථීති නියමය යෙදීමෙන්

$$\frac{1}{2}mv^2 + mg \cos \theta = \frac{1}{2}mu^2 + mga \quad (15)$$

$$V^2 = u^2 + 2ga(1 - \cos \theta)$$

  $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$  යෙදීමෙන්,

$$R - mg \cos \theta = -\frac{mv^2}{a} \quad (10)$$

$$R = mg \cos \theta - \frac{m}{a} [u^2 + 2ga(1 - \cos \theta)] \quad (5)$$

$$= \frac{m}{a} [gac \cos \theta - u^2 - 2ga(1 - \cos \theta)]$$

$$= \frac{m}{a} [3gac \cos \theta - 2ga - u^2] \quad (5)$$

$$= \frac{m}{a} [ga(3 \cos \theta - 2) - u^2]$$

$$u = \sqrt{ga} \quad \text{සහ } \theta = 0 \Rightarrow R = 0 \quad (5)$$

$\therefore$  ගැටුමෙන් මොහොතකට පසු  $P$  අංගුව පාල්‍ය හැර යයි. (5)

50

### 13 වන ප්‍රශ්නය

13. ස්කන්දය  $m$  වූ අංගුවක්, ස්වභාවික දිග  $l$  වූ සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යස්ථාපිත තන්තුවක එක් කෙළවරකට ඇදා ඇති අතර තන්තුවේ අනෙක් කෙළවර අවල  $O$  ලක්ෂ්‍යකට ඇදා ඇත. අංගුව සමතුලිතව එල්ලන විට තන්තුවේ විතතිය  $\frac{1}{3}$  වේ. තන්තුවේ ප්‍රත්‍යස්ථාපිත මාපාංකය සොයන්න.

අංගුව,  $O$  ට  $\frac{l}{2}$  දුරකින් සිරස්ව පහළින් වූ ලක්ෂ්‍යයේ තබා නිශ්චලතාවේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ.  $O$  සිට  $l$  දුරකින් සිරස්ව පහළින් වූ  $A$  ලක්ෂ්‍යය වෙත අංගුව ප්‍රථම වතාවට ලැගා වන විට එහි ප්‍රවේශය සොයන්න.


$B$  යනු අංගුව ලැගා වන පහළ ම ලක්ෂ්‍යය යැයි ගනිමු.  $A$  සිට  $B$  දක්වා අංගුවේ වලිතය සඳහා තන්තුවේ විතතිය  $x$  යන්න  $x'' + \frac{3g}{l} \left( x - \frac{1}{3} \right) = 0$  සමීකරණය සපුරාලන බව පෙන්වන්න.

ඉහත සමීකරණයේ විසඳුම  $x = \frac{l}{3} + \alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t$  ආකාරයේ බව උපකල්පනය කරමින්,  $\alpha, \beta, \omega$  නියතවල අගයන් සොයන්න.

එම නයින්, අංගුව  $A$  සිට  $B$  දක්වා යෙදෙන සරල අනුවර්ති වලිතයේ කේත්දය හා විස්තාරය සොයන්න.

මුදා හළ මොහොතේ සිට  $\sqrt{\frac{l}{g}} \left\{ 1 + \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \right\}$  කාලයකට පසුව අංගුව  $B$  වෙත ලැගා වන බව පෙන්වන්න.

අංගුව  $B$  හි ඇතිවිට තන්තුවේ ආතතිය සොයන්න.



$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$v^2 = 2g \left( \frac{l}{2} \right)$$

$$v = \sqrt{gl}$$

5

10



$$T = \frac{\lambda x}{l} = \frac{3mgx}{l}$$

(5)

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \downarrow \quad mg - T = m\ddot{x}$$

(10)

$$mg - \frac{3mgx}{l} = m\ddot{x}$$

$$\ddot{x} + \frac{3g(x-\frac{l}{3})}{l} = 0 ; \quad x \geq 0$$

(5)

20

$$x = \frac{l}{3} + \alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t$$

$$t = 0 \text{ වන විට } x = 0 \text{ නේ.}$$

(5)

$$0 = \frac{l}{3} + \alpha \Rightarrow \alpha = -\frac{l}{3}$$

(5)

$$\dot{x} = -\alpha \omega \sin \omega t + \beta \omega \cos \omega t$$

(5)

$$t = 0 \text{ වන විට } \dot{x} = \sqrt{gl} \text{ නේ.}$$

$$\sqrt{gl} = \beta \omega$$

(5)

$$\ddot{x} = -\alpha \omega^2 \cos \omega t - \beta \omega^2 \sin \omega t$$

(5)

$$\frac{-3g(x-\frac{l}{3})}{l} = -\alpha \omega^2 \cos \omega t - \beta \omega^2 \sin \omega t$$

(5)

$$\frac{-3g}{l} (\alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t) = -\omega^2 (\alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t) \quad (5)$$

$$\therefore \omega^2 = \frac{3g}{l}$$

$$\text{එබැවින්, } \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}} \text{ සහ } \beta = \sqrt{gl} \sqrt{\frac{l}{3g}} = \frac{l}{\sqrt{3}}$$

(5)

45

දැන්  $x = \frac{l}{3} + \alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t$  නිසා

$$x - \frac{l}{3} = \alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t \quad (5)$$

සරල අනුවර්ති වලිනයේ කේත්දය  $x - \frac{l}{3} = 0$  මගින් දෙනු ලබයි. (5)

$$\therefore x = \frac{l}{3}$$

එබැවින් කේත්දය  $C$  යන්න  $A$  සිට  $\frac{l}{3}$  දුරක් පහළින් පිහිටයි.

10

විස්තාරය  $= BC$

$$t = t_1 \text{ විට } \dot{x} = 0 \text{ බැවින්, } -\alpha \omega \sin \omega t_1 + \beta \omega \cos \omega t_1 = 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow \frac{l}{3} \sin \omega t_1 = -\frac{l}{\sqrt{3}} \cos \omega t_1$$

$$\tan \omega t_1 = -\sqrt{3}$$

$$\omega t_1 = \frac{2\pi}{3} \quad (5)$$

$t = t_1$  විට  $x$  සෙවීම :

$$\begin{aligned} x &= \frac{l}{3} - \frac{l}{3} \cos \omega t_1 + \frac{l}{\sqrt{3}} \sin \omega t_1 \quad (5) \\ &= \frac{l}{3} - \frac{l}{3} \cos \frac{2\pi}{3} + \frac{l}{\sqrt{3}} \sin \frac{2\pi}{3} \\ &= \frac{l}{3} + \frac{l}{6} + \frac{l}{2} \\ &= l \quad (5) \end{aligned}$$

$$\therefore BC = l - \frac{l}{3} = \frac{2l}{3} \quad (5)$$

30

ප්‍රථම වරට  $A$  වෙත ලැබීමට ගත් කාලය  $t_0$  යැයි ගනිමු.

$$s = ut + \frac{1}{2} at^2 \quad \downarrow \text{යෙදීමෙන්,}$$

$$u = 0, a = g, s = \frac{l}{2}, t = t_0$$

$$\frac{l}{2} = \frac{1}{2} g t_0^2 \quad (5)$$

$$t_0 = \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (5)$$

$$B \text{ වෙත ලැබාවේමට මුළු කාලය} = \sqrt{\frac{l}{g}} + \frac{2\pi}{3\omega} \quad \textcircled{5}$$

$$= \sqrt{\frac{l}{g}} + \frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{l}{3g}}$$

$$= \sqrt{\frac{l}{g}} \left( 1 + \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \right) \quad \textcircled{5}$$

**20**

$$\text{අංගුව } B \text{ හි ඇති විට ආතකය} = \frac{3mg}{l} (AB) \quad \textcircled{5}$$

$$= \frac{3mg}{l} (l)$$

$$= 3mg \quad \textcircled{5}$$

**10**

## 14 වන ප්‍රශ්නය

- 14.(a)  $OABC$  යනු වතුරසුයක් යැයි ද  $D$  හා  $E$  යනු පිළිවෙළින්  $OB$  හා  $AC$  විකර්ණවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය යැයි ද ගනිමු. තව ද,  $DE$  හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය  $F$  යැයි ගනිමු.  $O$  අනුබද්ධයෙන්  $A, B$  හා  $C$  ලක්ෂ්‍යවල පිහිටුම් දෙනීක පිළිවෙළින්  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  යැයි  $\mathbf{c}$  ගනිමින්,  $\overrightarrow{OF} = \frac{1}{4}(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$  බව පෙන්වන්න.


$P$  හා  $Q$  යනු පිළිවෙළින්  $OA$  හා  $BC$  පැතිවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය යැයි ගනිමු.  $P, F$  හා  $Q$  ලක්ෂ්‍ය ඒක රේඛිය බව පෙන්වා  $PF : FQ$  අනුපාතය සොයන්න.

- (b)  $ABCD$  යනු, පැත්තක දිග  $2l$  හා  $BD = 2l$  වූ රෝම්බසයක් යැයි ගනිමු. රෝම්බසයේ විකර්ණ  $O$  ලක්ෂ්‍යයනිදී හමුවේ. විශාලත්ව නිවිතන  $2P, 6P, 4P, 8P$  හා  $6P$  වූ බල පිළිවෙළින්  $AB, BC, DC, DA$  හා  $BD$  දිගේ, අක්ෂර අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන දිගාවලට ක්‍රියා කරයි.  $\overrightarrow{OC}$  හා  $\overrightarrow{OD}$  දිගාවලට බල පද්ධතිය විශේෂනය කර, සම්පූක්තයේ ක්‍රියා රේඛාව  $BC$  ට සමාන්තර වන බව පෙන්වන්න.

පද්ධතියේ  $O$  වටා සුර්ණය සොයන්න.

සම්පූක්තයේ ක්‍රියා රේඛාවට  $E$  ලක්ෂ්‍යයේදී දික් කරන ලද  $AB$  හමු වේ නම්,  $BE = 2l$  බව පෙන්වන්න.

අන්, නිවිතන  $\alpha P, \beta P, \gamma P$  හා  $\alpha P$  විශාලත්ව සහිත අතිරේක බල පිළිවෙළින්  $EB, CE, CA$  හා  $DC$  දිගේ අක්ෂර අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන දිගාවලට ක්‍රියා කරයි. මුළු පද්ධතිය සමතුලිතතාවේ ඇත්තම  $\alpha, \beta$  හා  $\gamma$  නි අයෙන් සොයන්න.



$$\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OB} = \left( \frac{\mathbf{b}}{2} \right) \quad (5)$$

$$\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AE} \quad (5)$$

$$= \mathbf{a} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$$

$$= \mathbf{a} + \frac{1}{2} (\mathbf{c} - \mathbf{a})$$

$$= \frac{\mathbf{a} + \mathbf{c}}{2} \quad (5)$$

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{OF} &= \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DF} \\
 &= \left(\frac{\mathbf{b}}{2}\right) + \frac{1}{2} \overrightarrow{DE} \\
 &= \left(\frac{\mathbf{b}}{2}\right) + \frac{1}{2} (\mathbf{e} - \mathbf{d}) \\
 &= \left(\frac{\mathbf{b}}{2}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\mathbf{a} + \mathbf{c}}{2} - \frac{\mathbf{b}}{2}\right) \\
 &= \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{4}
 \end{aligned} \quad \textcircled{5}$$

25

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{OQ} &= \overrightarrow{OB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \\
 &= \mathbf{b} + \frac{1}{2} (\mathbf{c} - \mathbf{b}) \\
 &= \frac{1}{2} (\mathbf{b} + \mathbf{c})
 \end{aligned} \quad \textcircled{5}$$

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{PF} &= \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OF} \\
 &= -\frac{\mathbf{a}}{2} + \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{4} \\
 &= \frac{-\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{4}
 \end{aligned} \quad \textcircled{5}$$

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{FQ} &= \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{OQ} \\
 &= \frac{-\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{4} + \frac{1}{2} (\mathbf{b} + \mathbf{c}) \\
 &= \frac{-\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{4}
 \end{aligned} \quad \textcircled{5}$$


$$\overrightarrow{PF} = \overrightarrow{FQ} \quad \textcircled{5}$$

$$\Rightarrow P, F \text{ හා } Q \text{ ඒක රේඛීය වේ.} \quad \textcircled{5}$$

$$\text{තවද } PF : FQ = 1 : 1 \quad \textcircled{5}$$

35

(b)



5

 $\vec{OC}$ :

$$X = 2P \cos 30^\circ + 6P \cos 30^\circ + 4P \cos 30^\circ - 8P \cos 30^\circ \quad (5)$$

$$= 2P \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - 3 + 2 + 4)$$

$$= 2\sqrt{3}P \quad (5)$$

 $\vec{OD}$ :

$$Y = 6P - 2P \cos 60^\circ + 6P \cos 60^\circ - 4P \cos 60^\circ - 8P \cos 60^\circ \quad (5)$$

$$= 6P - 2P \cdot \frac{1}{2} (1 - 3 + 2 + 4)$$

$$= 6P - 4P$$

$$= 2P \quad (5)$$

$$\tan \theta = \frac{Y}{X} = \frac{2P}{2\sqrt{3}P} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \theta = 30^\circ \quad (5)$$

$\therefore$  සම්පූරුක්තය  $BC$  ට සමාන්තර වේ. (5)

35

O

සුදුරුණ ගැනීමෙන්,

$$M_0 = 2P \cdot l \cos 30^\circ + 6P \cdot l \cos 30^\circ - 4Pl \cos 30^\circ + 8Pl \cos 30^\circ \quad (5)$$

$$= 2Pl \frac{\sqrt{3}}{2} (1 + 3 - 2 + 4)$$

$$= 6\sqrt{3}Pl \quad (5)$$

10

$$\begin{aligned}
 R^2 &= X^2 + Y^2 = (2\sqrt{3}P)^2 + (2P)^2 \\
 &= 12P^2 + 4P^2 \\
 &= 16P^2
 \end{aligned}
 \quad (5)$$

$$R = 4P$$

O  සූර්ය ගැනීමෙන්,

$$\begin{aligned}
 6\sqrt{3}Pl &= 4P(l \cos 30^\circ + x \cos 30^\circ), \text{ මෙහි } x = BE \text{ වේ.} \quad (5) \\
 6\sqrt{3}Pl &= 4P \frac{\sqrt{3}}{2}(l + x)
 \end{aligned}$$

$$3l = l + x$$

$$x = 2l \quad (5)$$

15

සමතුලිතතාව සඳහා,

$\overrightarrow{OC}$  දීගේ විෂේදනයෙන්

$$\begin{aligned}
 \nearrow 2\sqrt{3}P - \gamma P &= 0 \quad (5) \\
 \gamma &= 2\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$\overrightarrow{OD}$  දීගේ විෂේදනයෙන්

$$\begin{aligned}
 \nearrow 2P - \beta P &= 0 \quad (5) \\
 \beta &= 2
 \end{aligned}$$

E  සූර්ය ගැනීමෙන්,

$$\alpha P 2l \cos 30^\circ - \gamma P 2l = 0 \quad (5)$$

$$\alpha \sqrt{3} = \gamma \cdot 2$$


$$\alpha = 2 \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4 \quad (5)$$

30


15. (a) එක එකක දිග  $2a$  හා බර  $w$  වූ  $AB, BC$  හා  $CA$  ඒකාකාර දුඩු තුනක්  $ABC$  සමඟාද ත්‍රිකෝණයක් සැදෙන පරිදි ඒවායේ කෙළවරවලදී සුමට ලෙස සන්ධි කර ඇත.  $A$  සිරුපය අවල ලක්ෂායකට සුමට ලෙස අස්ථි කර ඇත්තේ ත්‍රිකෝණයට සිරසේ තලයක නිදහසේ ප්‍රමණය වීමට හැකිවන පරිදි ය. ත්‍රිකෝණයේ තලයෙහි  $BC$  ට ලම්බව  $B$  හිදී යොදු  $P$  බලයකින් ත්‍රිකෝණය,  $AB$  තිරස්ව හා  $AB$  ට පහළින්  $C$  තිබෙන පරිදි, අල්ලා තබා ඇත.  $P$  ති අගය සොයන්න.

$C$  හි දී  $AC$  මගින්  $BC$  මත යෙදෙන බලයේ තිරස් හා සිරස් සංරචකත් සොයන්න.

**(b)** යාබදු රුප සටහනින් අත්තවලදී සුම්මත ලෙස සන්ධි කරන ලද සැහැල්ල දඩු නයකින් සමන්විත රාමු සැකිල්ලක් නිරුපණය වේ. එය සිරස් බිත්තියකට A හා B හිදී සුම්මත අසව් කර ඇති අතර, D හිදී 150 N භාරයක් දරයි. බෝ අංකනය යොදීමෙන් ප්‍රත්‍යාගල සටහනක් ඇඳු, ඒ නයින්, දඩුවල ප්‍රත්‍යාගල, ආත්ත හෝ තෙරපුම් වශයෙන් දක්වමින්, නිරුණය කරන්න.



(a)



පද්ධතියට A වටා සුරණ ගැනීමෙන්,

$$W(\cos 60^\circ + a + (2a - \cos 60^\circ)) = P \cdot 2\cos 60^\circ \quad (15)$$

$$W \left( \frac{a}{2} + a + 2a - \frac{a}{2} \right) = 2a \cdot \frac{1}{2} P \quad (10)$$

$$P = 3W$$

30

$$A, \quad Ya - Xa\sqrt{3} = W \cdot \frac{a}{2} \quad \text{10}$$



$$B, \quad Ya + Xa\sqrt{3} = -W \cdot \frac{a}{2} \quad (10)$$

$$\Rightarrow Y = 0 \quad \text{5}$$

$$\therefore X = -\frac{W}{2\sqrt{3}}$$
5

30

(b)



30

දැන්වීම	තෙරපුම	ආතතිය	විගාලත්වය
$AC$	-	✓	$100\sqrt{3}$ N
$CD$	✓	-	$50\sqrt{3}$ N
$DE$	✓	-	$50\sqrt{3}$ N
$CE$	-	✓	$100\sqrt{3}$ N
$BC$	-	✓	$50\sqrt{3}$ N
$BE$	✓	-	$150\sqrt{3}$ N


60

60


## 16 වන ප්‍රශ්නය

16. අරය  $a$  වූ ඒකාකාර සන අර්ථ ගෝලයක ස්කන්දය කේත්දය, එහි සම්මිත ආක්ෂය මත, ආධාරකයේ කේත්දයේ සිට  $\frac{3a}{8}$  දුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.

එකම ඒකාකාර ද්‍රව්‍යකින් සැදී සන අර්ථ ගෝලයක් හා සන ගෝලයක්, දිග  $2l$  සහ ස්කන්දය  $m$  වූ ඒකාකාර දැන්ඩික දෙකෙලවරට රුපයේ දැක්වෙන ආකාරයට අර්ථ ගෝලයේ සම්මිත ආක්ෂය, දැන්ඩි හා ගෝලයේ කේත්දය එකම සරල රේඛාවක් මත පිහිටන පරිදි දාඩ් ලෙස සවි කිරීමෙන්, සංයුක්ත වස්තුවක් සාදා ඇති. ගෝලයේ අරය  $r$  දී, ස්කන්දය  $m$  ද වන අතර අර්ථ ගෝලයේ අරය  $2r$  වේ. සංයුක්ත වස්තුවේ ස්කන්දය කේත්දය, අර්ථ ගෝලයේ ආධාරකයේ කේත්දයේ සිට  $\frac{1}{6} (8r + 3l)$  දුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.



මෙම සංයුක්ත වස්තුව තිරසට  $\theta$  කොළයකින් ආනත අවල තලයක් මත, අර්ථ ගෝලයේ ආධාරකය තලය ස්පර්ශ කරමින් තබා ඇති. ලිස්සා යාම වැළැක්වීමට ප්‍රමාණවත් තරම් තලය රු යැයි උපකල්පනය කරමින්,  $\tan \theta < \frac{12r}{8r + 3l}$  නම්, සංයුක්ත වස්තුව නොපෙරලෙන බව පෙන්වා සංයුක්ත වස්තුව මත ආනත තලය මගින් යෙදෙන අභිල්මීඩ ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වය සොයන්න.



සම්මිතයෙන්, අර්ථ ගෝලයේ ස්කන්දය කේත්දය සම්මිත ආක්ෂය මත පිහිටයි.

10

$O$  සිට  $x$  දුරින් වූ  $dx$  සනකමකින් යුත් අංගුමාත්‍රිය තැවීය සලකමු.


$O$  සිට ස්කන්දය කේත්දයට දුර  $\bar{X}$  යැයි ගනීමු.

ද්‍රව්‍යයේ සනත්වය  $\rho$  යැයි ගනීමු.

$\Delta$  සනකමකින් යුත් අංගුමාත්‍රිය තැවීයේ ස්කන්දය  $\approx \pi (a^2 - x^2) dx \rho$

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\int_0^a \pi(a^2-x^2)x\rho dx}{\int_0^a \pi(a^2-x^2)\rho dx} = \frac{\left[ \frac{a^2}{2}x^2 - \frac{x^4}{4} \right]_0^a}{\frac{2}{3}a^3} \\ &\quad \text{(10)} \qquad \text{(05)} \\ &= \frac{3}{8}a \quad \text{(05)} \end{aligned}$$

40



සමමිතියෙන්, සංයුක්ත වස්තුවහි ස්කන්ධය කේන්ද්‍රය සමමිත අක්ෂය මත පිහිටයි.

05


වස්තුව	ස්කන්ධය	කේන්ද්‍රයට O සිට දුර
	$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$ (05)	$3r + 2l$ (05)
	$\frac{2}{3}\pi (2r)^3 \rho = \frac{2}{3}\pi 8r^3 \rho = 4m$ (05)	$\frac{3}{8}(2r) = \frac{3r}{4}$ (05)
	$m$ (05)	$2r + l$ (05)
	$6m$ (05)	$\bar{Y}$

$$6m\bar{Y} = m(3r + 2l) + 4m\left(\frac{3r}{4}\right) + m(2r + l) \quad \text{(10)}$$

$$6\bar{Y} = 8r + 3l \quad \text{(05)}$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{6}(8r + 3l)$$

55



$$OG = \frac{1}{6}(8r + 3l)$$

$OH < 2r$  නම් සංයුක්ත වස්තුව නොපෙරලේයි.

(10)

එනම්  $OG \tan \theta < 2r$

(05)

$$\tan \theta < \frac{2r \times 6}{8r+3l} = \frac{12r}{8r+3l}$$

20

$$l = \frac{4r}{3}, \quad \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\tan \theta = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$


$$\frac{12r}{8r+3l} = \frac{12r}{8r+3 \cdot \frac{4r}{3}} = \frac{12r}{12r} = 1$$

$$\tan \theta = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} < 1$$

$$\tan \theta < \frac{12r}{8r+3l}$$

$\therefore$  සංයුක්ත වස්තුව නොපෙරලේයි.

20



විශේදනයෙන්,

$$R - 6mg \cos 30^\circ = 0 \quad (10)$$

$$\therefore R = 3\sqrt{3} mg$$

(05)

15

## 17 වන ප්‍රශ්නය

**17. (a)** පාසලක එක්තරා විභාගයකට පෙනී සිටි සිසුන් 100 දෙනකු පිළිබඳ සමික්ෂණයකට අනුව, එම සිසුන්ගේන් 48 දෙනකු විභාගය සමත් වී ඇති බව අනාවරණය විය. තවද මෙම සිසුන් 100 දෙනා අතුරෙන් 50 දෙනකු පාසලේ දී ක්‍රිඩා කටයුතු සඳහා සහභාගි වී ඇති බවද 30 දෙනකු පාසලේ දී සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි වී ඇති බවද කිසිම සිසුවකු ක්‍රිඩා කටයුතු හා සංගීත කටයුතු යන දෙකට ම සහභාගි වී නොමැති බවද අනාවරණය විය. තවද, පාසලේ දී ක්‍රිඩා කටයුතු සඳහා සහභාගි වූ සිසුන්ගේන් 60% ක් විභාගය සමත් වී ඇති අතර පාසලේදී ක්‍රිඩා කටයුතු හෝ සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි නොවූ සිසුන්ගේන් 30%ක් විභාගය සමත් වී ඇතේ.

ඉහත සිසුන් 100 දෙනාගේන් එක් සිසුවකු සසම්භාවී ව තෝරා ගනු ලැබේ. මෙම සිසුවා

- (i) පාසලේදී සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි වූ අයකු බවද ඇති විට, ඔහු විභාගය සමත් අයකු වීමේ,
- (ii) විභාගය සමත් වූ අයකු බවද ඇති විට, පාසලේදී ඔහු ක්‍රිඩා කටයුතු සඳහා සහභාගි වූ අයකු වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

- (b)** කුඩා ලෝහ බෝල 50 කින් සමන්වීත කුලකයක විෂ්කම්භවල සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහත දැක්වෙන වගුවේ දී ඇතේ.

විෂ්කම්භය (cm)	කුඩා බෝල සංඛ්‍යාව
0.80 – 0.81	1
0.81 – 0.82	3
0.82 – 0.83	9
0.83 – 0.84	20
0.84 – 0.85	14
0.85 – 0.86	2
0.86 – 0.87	1

විෂ්කම්භවල ව්‍යාප්තියේ පළමුවන වතුර්ථකය ගණනය කරන්න.

මෙම ලෝහ බෝල 50 කින් සමන්වීත කුලකයේ විෂ්කම්භවල මධ්‍යන්ය හා සම්මත අපගමනය 0.835 cm හා 0.01 cm බවද ඇතේ. කුඩා ලෝහ බෝල 100 ක තවත් කුලකයක් සඳහා විෂ්කම්භවල මධ්‍යන්ය පළමුවන ලෝහ බෝල 50 හි කුලකයේ විෂ්කම්භවල මධ්‍යන්ය ම බවද සම්මත අපගමනය 0.015 cm බවද ඇතේ.

ලෝහ බෝල 150 හි සංයුත්ත කුලකයේ විෂ්කම්භවල මධ්‍යන්ය හා විවෘතාව සොයන්න.

දෙවන ලෝහ බෝල 100 ක කුලකය සඳහා මිනුම් ගැනීමේදී හාවිත කරනු ලැබූ උපකරණය දේප සහිත බවද එමගින් එක් එක් බෝලයක විෂ්කම්භය 0.015 cm ප්‍රමාණයකින් අවතක්සේරු වී ඇති බවද පසුව සොයා ගනු ලැබේණ. මෙම ලෝහ බෝල 100 හි විෂ්කම්භවල සත්‍ය මධ්‍යන්ය හා සත්‍ය සම්මත අපගමනය සොයන්න.

(a)  $S, M, N$  හා  $X$  පහත දක්වෙන පරිදි අර්ථ දක්වා ඇත.

$$\begin{aligned}
 S &: \text{ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා සහභාගි වීම } \\
 M &: \text{සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි වීම } \\
 N &: \text{ත්‍රිඩා හේ සංගීත කටයුතු සඳහා සහභාගි නොවීම } \\
 X &: \text{විහාරය සමත් වීම } \\
 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{10}$$

$$\text{එවිට, } P(S) = \frac{50}{100}, P(M) = \frac{30}{100}, P(N) = \frac{20}{100}, P(X) = \frac{48}{100} \quad \text{05}$$

$$\text{05} \quad P(X \setminus S) = 0.60, P(X \setminus N) = 0.30 \quad \text{05}$$

(i) මූල සම්බාධිතා ප්‍රමේයයෙන්,

$$P(X) = P(S) P(X \setminus S) + P(M) P(X \setminus M) + P(N) P(X \setminus N) \quad \text{10}$$

$$\frac{48}{100} = \frac{50}{100} \times 0.6 + \frac{30}{100} \times P(X \setminus M) + \frac{20}{100} \times 0.3 \quad \text{05}$$

$$P(X \setminus M) = \frac{48 - 30 - 6}{30} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5} \quad \text{10}$$

$$\text{(ii) බෙදා ප්‍රමේයයෙන්, } P(S \setminus X) = \frac{P(S) P(X \setminus S)}{P(X)} = \frac{50 \times 0.6}{48} = \frac{30}{48} = \frac{5}{8} \quad \text{05}$$

10

75

(b) පළමුවන වතුර්ථකය  $= \frac{50}{4}$  වන නිරික්ෂණයේ අගය  $= 12.5$  වන නිරික්ෂණයේ අගය

$$\therefore \text{පළමුවන වතුර්ථකය පිහිටන පන්ති ප්‍රාන්තරය } (0.82 - 0.83) \quad \text{10}$$

$$\therefore \text{පළමුවන වතුර්ථකය } = 0.82 + \frac{(12.5 - 4)}{9} \times 0.01 \quad \text{10}$$

$$= 0.82 + 0.009$$

$$= 0.829 \quad \text{05}$$

25

$$\text{බෝල } 50 \text{ හි විෂ්කම්භවල මධ්‍යනායය = } 0.835$$

$$\text{බෝල } 100 \text{ හි විෂ්කම්භවල මධ්‍යනායය = } 0.835$$

$$\therefore \text{බෝල } 150 \text{ හි විෂ්කම්භවල මධ්‍යනායය = } 0.835$$

(10)

10

$$\text{බෝල } 50 \text{ හි විෂ්කම්භවල විවලතාව, } S_1^2 = 0.01^2 = 0.0001$$

$$\text{බෝල } 100 \text{ හි විෂ්කම්භවල විවලතාව, } S_2^2 = 0.015^2 = 0.000225$$

බෝල 150 හි විෂ්කම්භවල සංයුක්ත කුලකයේ විවලතාව,

$$S^2 = \frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2} \quad (10)$$

$$= \frac{50 \times 0.0001 + 100 \times 0.000225}{150}$$

$$= \frac{0.0050 + 0.0225}{150} \quad (05)$$

$$= 0.00018$$

15

$y$  යනු බෝල 100 හි විෂ්කම්භවල නිවැරදි අගය යැයි ගනිමු.

එවිට,  $y = x + 0.015$ ; මෙහි  $x$  මූල් අගය වේ. (05)

$$(05) \therefore \bar{y} = \bar{x} + 0.015 \text{ හා සත්‍ය සම්මත අපගමනය = මූල් සම්මත අපගමනය } \quad (05)$$

$$\therefore \text{සත්‍ය මධ්‍යනායය } = 0.835 + 0.015 = 0.85 \text{ හා සත්‍ය සම්මත අපගමනය } = 0.015 \quad (05)$$

(05)

25

### III කොටස

3.0 පිළිතුරු සැපයීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හා යෝජනා :

3.1. පිළිතුරු සැපයීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු :

පොදු උපදෙස් :

- ★ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඇති මූලික උපදෙස් කියවා හොඳින් තේරුම ගත යුතුය. එහම එක් එක් කොටසින් කොපමත ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවකට පිළිතුරු සැපයීය යුතු ද කුමන ප්‍රශ්න අනිවාර්ය වේ ද කොපමත ලකුණු ලැබේ ද කොපමත කාලයක් ලැබේ ද යන කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු අතර, ප්‍රශ්න හොඳින් කියවා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ප්‍රශ්න පිළිබඳව නිරවුල් අවබෝධයක් ඇති කර ගෙන පිළිතුරු ලිවිය යුතුය.
- ★ I පත්‍රයේන් II පත්‍රයේන් A කොටසෙහි සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීය යුතුය.
- ★ I පත්‍රයේන් II පත්‍රයේන් B කොටසෙහි ප්‍රශ්න 07න් තෝරා ගත් ප්‍රශ්න 05කට පිළිතුරු සැපයීය යුතුය.
- ★ සැම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්ම අලුත් පිටුවකින් ආරම්භ කළ යුතුය.
- ★ අයදුමකරුගේ විභාග අංකය සැම පිටුවකම අභ්‍යා ස්ථානයේ ලිවිය යුතුය.
- ★ ප්‍රශ්න අංක හා අනුකාටස් අංක නිවැරදිව ලිවිය යුතුය.
- ★ සියලුම ප්‍රශ්න හොඳින් කියවා පිළිතුරු ලිවිය යුතුය. ප්‍රශ්න යටතේ දී ඇති තොරතුරුත්, ලබා ගත යුතු පිළිතුරු හෝ සාධනය කළ යුතු ප්‍රතිථිල කවරේ ද යන්නත් පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගත යුතුය.
- ★ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී දී ඇති කාලය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ගැනීමට වග බලා ගත යුතුය.
- ★ පැහැදිලි අත් අකුරින් පිළිතුරු සැපයීය යුතුය. පිළිතුරු ලිවිමේදී නිල් පාට හෝ කඩ පාට පැන් පමණක් හාවිත කළ යුතුය. අනෙකුත් පාට පැන් හාවිත කිරීමෙන් වැළකිය යුතුය.

විශේෂ උපදෙස් :

- ★ රුප සටහන් ඇදිය යුතු අවස්ථාවලදී ඒවා ඉතා පැහැදිලිව ඇද නම් කළ යුතුය. මෙහිදී රේඛාවල දිග හා කේෂණවල විශාලත්ව සන්සන්දනාත්මකව නිවැරදි රුපය හා අනුරුප වන සේ දැක්වීම අවශ්‍ය වේ. රුපසටහන්වල නිරවද්‍යතාව, සම්බන්ධතා දැකීමටත් ඒ ඇසුරින් පහසුවෙන් පිළිතුරු කරා එළිඤීමටත් මහෝපකාරී වෙයි. රුප සටහන්වල තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේදී ද නිරවද්‍යතාව කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. (නිදුසු : බල ලකුණු කිරීම)
- ★ ගණනය කිරීම්වලදී එක් එක් පියවර පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු අතර, අවශ්‍ය ස්ථානවලදී පියවර අතර සම්බන්ධය දැක්වෙන සමාන ලකුණු හෝ වෙනත් අදාළ සංකේත හෝ ලියා දැක්වීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. එක් පියවරක හෝ පිටුවක හෝ ඇති ප්‍රකාශන හා සම්කරණ ර්‍යුග පියවරට හෝ පිටුවට පිටපත් කිරීමේදී ඒවායේ නිරවද්‍යතාව පිළිබඳව ඉතා සැලකිලිමත් විය යුතුය.
- ★ අවශ්‍ය ස්ථානවලදී නිවැරදිව ඒකක හාවිත කළ යුතුය.

- ★ ප්‍රස්තාර ඇදිමෙදී X හා Y අකු නිවැරදිව නම කර පරිමාණගත කළ යුතු අතර, අවශ්‍ය අවස්ථාවල ඒකක ද සඳහන් කළ යුතුය.
- ★ මූලික සමානුපාත පිළිබඳ සංකල්ප නැවත පරිභේදනය කළ යුතුය.
- ★ මූලික ත්‍යාමිතිය පිළිබඳ දැනුම සහ අවබෝධය ඉතා වැදගත් වේ.

**නිදසුන්:**

- (1) සමාන්තරාසුයක ලක්ෂණ
- (2) රොම්බසයක ලක්ෂණ
- (3) සවිධ ඡබසුයක / බහු අසුයක ලක්ෂණ
- (4) ත්‍රිකෝණ ආක්‍රිත විවිධ ප්‍රමේය
- (5) සමරුපී ත්‍රිකෝණ
- (6) වෘත්ත ආක්‍රිත ප්‍රමේය
- (7) සමමිත ගුණ

- ★ සාධකවලට බිඳිය හැකි වර්ගය ප්‍රකාශන එකවරම සාධකවලට වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කළ යුතුය.
- ★ දෙදික නිරුපණයේදී නිවැරදි සංකේත භාවිත කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය.
- ★ “එනයින් ලබා ගන්න”, “අපේෂනය කරන්න”, “සත්‍යාපනය කරන්න”, “ව්‍යුත්පන්න කරන්න” වැනි යෝජිත කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතු අතර, ඒ අනුව පිළිතුර කරා එළඹීමට වග බලා ගත යුතුය. ‘එනයින් හෝ අන් කුමයකින් හෝ’ යනුවෙන් සඳහන් අවස්ථාවලදී බහුල වශයෙන්ම පෙර ලබා ගත් ප්‍රතිඵලය භාවිත කර ජ්‍රේ පසු ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම වඩාත් පහසු වේ.
- ★ දී ඇති තොරතුරු භාවිතයෙන් නිගමනයකට එළඹීය යුතු අවස්ථාවලදී විලෝම ක්‍රියාවලය ඉදිරිපත් කිරීම ලක්ෂු අනිමි විමට හෝ අඩුවීමට හෝතු වේ. එබැවින් ප්‍රශ්නය මගින් අපේක්ෂිත ආකාරයට පිළිතුර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එහෙත් “නම ම පමණක්” හෝ “ම නම පමණක්” සත්‍ය බව සාධනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී විලෝම වශයෙන් ද ප්‍රතිඵලය ලැබෙන බව සනාථ වන පරිදි පිළිතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
- ★ සැම විටෙකදීම අවසාන පිළිතුර සරලම ආකාරයෙන් දැක්වීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය. අවසාන පිළිතුර, ප්‍රශ්නයෙහි අසා ඇති ආකාරය අනුව පැහැදිලිව දැක්වීය යුතුය.
- ★ අයදුම්කරුවන් තම ඉලක්කම්, සංකේත සහ අදහස් පැහැදිලිවත් නිවැරදිවත් ලියා දැක්වීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය.
- ★ පිළිතුර කරා එළඹීමට අවශ්‍ය පූජා කිරීම (සංඛ්‍යාමය, වීජීය හෝ ත්‍රිකෝණමිතික) කටුවැඩ ලෙස සැලකුව ද පිළිතුර සමගම පසෙකින් ඉදිරිපත් කරන්න.
- ★ පිළිතුර සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි අවස්ථාවලදී වුව ද ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ලබා ගැනීමට අභ්‍ය ඉදිරි පියවර ලියා දැක්වීම බොහෝවිට එලදායී විය හැකිය.
- ★ ප්‍රශ්නයක අග කොටස්වල පවා මූල් කොටස්වලින් ස්වාධීන වූ පහසු කොටස් තිබිය හැකි බැවින් ප්‍රශ්නයක මූල් කොටස අපහසු වුව ද ප්‍රශ්නය අත්හැර නොයා ඉතිරි කොටස් පිළිබඳව ද අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ.
- ★ සමහර විටෙක යම් අනුකාටසක් සාධනය නොකළ ද එම ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය නම යෙදීමෙන් ඉදිරි අනුකාටසක් සඳහා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.