


අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය - 2015

අැගයිම් වාර්තාව

10 - සංයුක්ත ගණිතය



පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව
ජාතික අැගයිම් හා පරීක්ෂණ සේවාව,
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව.

2.1.3 I ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි ප්‍රශ්න සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා

(10) සංයුක්ත ගණිතය I පත්‍රය - A කොටස

1 වන ප්‍රශ්නය

1. ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය භාවිතයෙන්, සියලු $n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $8^n - 3^n$ යන්න 5 හි පූර්ණ සංඛ්‍යාමය ගුණාකාරයක් බව සාධනය කරන්න.

$$n=1 \text{ නම් } 8^n - 3^n = 8 - 3 = 5, n=1 \text{ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ.} \quad (5)$$

$n=p$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය යැයි ගනිමු.

$$\Rightarrow 8^p - 3^p = 5m, \text{ මෙහි } m \text{ ධන නිඛිලයකි.} \quad (5)$$

$$n=p+1 \text{ සලකමු. } 8^{p+1} - 3^{p+1} = 8^p(5+3) - 3^{p+1}$$

$$= (5m + 3^p)(5+3) - 3^{p+1} \quad (5)$$

$$= 8 \times 5m + 5 \times 3^p + 3^{p+1} - 3^{p+1}$$

$$= 5(8m + 3^p) \quad (5) \quad 8m + 3^p \in \mathbb{Z}^+$$

එනසින් $n=p$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ නම්, $n=p+1$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ.

එබැවින් ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය අනුව සියලුම $n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ. 5

25


1 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

පළමුවන ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත්, මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 97%ක් පමණ ය. ප්‍රශ්නයෙහි පහසුතාව 54%කට සීමා වී තිබේ. එනම් එම අපේක්ෂකයින්ට පොදුවේ හිමිකර ගත හැකි වී ඇත්තේ ලැබිය හැකිව තිබූ උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් අඩකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පමණි. සමහර අයදුම්කරුවන් සපයා තිබූ පිළිතුරුවල කැපී පෙනෙන දුර්වලතාවක් වූයේ $n=p$ සඳහා උපකල්පිත ප්‍රතිඵලය නිවැරදිව ලියා දක්වා නොමැති වීමයි.

එනම්, ඇතැම් අයදුම්කරුවන් $8^p - 3^p = 5k$, ලෙස විජයව ප්‍රකාශ කළත් “මෙහි k යනු ධන නිඛිලයකි.” යන ප්‍රකාශය ලියා දක්වා නැත. එම හේතුවෙන් අපේක්ෂකයින් ලකුණු 5ක් අහිමි කර ගෙන ඇත.

2 වන ප්‍රශ්නය

2. $|x| < 2 - x^2$ අසමානතාව සපුරාලන x හි සියලු ම තාත්ත්වික අගයන් සොයන්න.



$x \geq 0$ සඳහා

$$x = 2 - x^2$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x+2)(x-1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 1 \quad (5)$$

$x < 0$ සඳහා

$$-x = 2 - x^2$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x-2)(x+1) = 0$$

$$\Rightarrow x = -1 \quad (5)$$

$\therefore$ විසඳුම : $\{x \mid -1 < x < 1\}$ (5) 25

වෙනත් ක්‍රමයක්

$x \geq 0$ සඳහා

$$x < 2 - x^2 \quad (5)$$

$$x^2 + x - 2 < 0$$

$$(x-1)(x+2) < 0$$

$$\Rightarrow 0 \leq x < 1 \quad (5)$$


$$\therefore \text{විසඳුම : } \{x \mid -1 < x < 1\} \quad (5) \quad \boxed{25}$$

3 වන ප්‍රශ්නය

3. ආගන්ති සටහනක් මත $|z - 3 + 4i| = 2$ සමීකරණය සපුරාලන z සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව මගින් නිරූපණය කරනු ලබන ලක්ෂ්‍යයේ පථය වන C හි දළ සටහනක් අඳින්න. එනම්, C මත පිහිටි z සඳහා $|z + 4i|$ හි වැඩිතම හා අඩුතම අගයන් සොයන්න.

C යනු කේන්ද්‍රය $(3, -4)$ වූ ද අරය 2ක් වූ ද වෘත්තයකි.

(5)



$$|z - 3 + 4i| = 2$$

$$|z - (3 - 4i)| = 2$$

$$|z + 4i| = |z - (-4i)|$$

$\therefore C$ මත z සඳහා $|z + 4i|$ හි වැඩිතම අගය 5 යි. (5)

$|z + 4i|$ හි අඩුතම අගය 1 යි. (5)

25

4 වන ප්‍රශ්නය

4. $n \in \mathbb{Z}^+$ හා $n \geq 5$ යැයි ගනිමු. $\left(3x + \frac{2}{x}\right)^n$ හි ද්විපද ප්‍රසාරණයේ x^{n-10} හි සංගුණකය 100 ට වඩා අඩු වේ. n හි අගය සොයන්න.

$$\begin{aligned} \left(3x + \frac{2}{x}\right)^n &= \sum_{r=0}^n {}^nC_r (3x)^{n-r} \left(\frac{2}{x}\right)^r \\ &= \sum_{r=0}^n {}^nC_r 3^{n-r} 2^r x^{n-2r} \quad (5) \end{aligned}$$

$$n-10 = n-2r \Rightarrow r=5 \quad (5)$$

$$\text{එම නිසා, } x^{n-10} \text{ හි සංගුණකය} = {}^nC_5 3^{n-5} 2^5$$

$${}^nC_5 3^{n-5} \times 32 < 100 \Rightarrow 3^{n-5} < \frac{100}{32}, \therefore {}^nC_5 > 1 \quad (5)$$

$n \geq 5$ බව දී ඇත. $n=5$ හෝ $n=6$ වලට අගයන් වේ.

$$\left. \begin{array}{ll} n=5 & 5! \cdot 3^0 < \frac{100}{32} \times 5! \quad \text{වලංගු වේ.} \\ n=6 & 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 < \frac{100}{32} \times 5! \quad \text{වලංගු නොවේ.} \end{array} \right\} \quad (5)$$

$$\therefore n=5. \quad (5)$$

25

5 වන ප්‍රශ්නය

5. $n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා, $\lim_{y \rightarrow a} \frac{y^n - a^n}{y - a} = na^{n-1}$ ප්‍රතිඵලය භාවිතයෙන් හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ


$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + \sqrt{2})^4 - 4}{\sin 4x} = 2\sqrt{2} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + \sqrt{2})^4 - 4}{\sin 4x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(x + \sqrt{2})^4 - (\sqrt{2})^4}{(x + \sqrt{2} - \sqrt{2})} \cdot \frac{1}{4 \frac{\sin 4x}{4x}} \right] \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + \sqrt{2})^4 - (\sqrt{2})^4}{(x + \sqrt{2} - \sqrt{2})} \cdot \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x}} \\ &= \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot (\sqrt{2})^3 \cdot \frac{1}{1} \quad (\text{දෙන ලද ප්‍රතිඵලය භාවිතයෙන්}) \\ &= (\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

25

6 වන ප්‍රශ්නය

6. එක ම රූප සටහනක $y=e^x$ හා $y=e^{-x}$ වක්‍ර දෙකෙහි දළ සටහන් අඳින්න. x -අක්ෂයෙන් ද $-1 \leq x \leq 0$ පරාසය තුළ $y=e^x$ වක්‍රයෙන් හා $0 \leq x \leq 1$ පරාසය තුළ $y=e^{-x}$ වක්‍රයෙන් ද ආවෘත වන පෙදෙසෙහි වර්ගඵලය $2\left(1-\frac{1}{e}\right)$ බව පෙන්වන්න.



$$A = \int_{-1}^0 e^x dx + \int_0^1 e^{-x} dx \quad (5)$$

$$= [e^x]_{-1}^0 + [-e^{-x}]_0^1 \quad (5)$$

$$= 1 - e^{-1} - e^{-1} + 1$$

$$= 2 - 2e^{-1} \quad (5)$$

$$= 2\left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

25

7 වන ප්‍රශ්නය

7. තාත්වික θ පරාමිතියක් ඇසුරෙන්, xy -තලයේ C චක්‍රයක් $x = 2 + \cos 2\theta$, $y = 4 \sin \theta$ යන සමීකරණ මගින් දෙනු ලැබේ. $\frac{dy}{dx}$ ව්‍යුත්පන්නය θ ඇසුරෙන් සොයා, $\theta = \frac{\pi}{4}$ වන ලක්ෂ්‍යයෙහි දී C චක්‍රයට ඇඳි අභිලම්භයේ සමීකරණය $x - \sqrt{2}y + 2 = 0$ බව පෙන්වන්න.

C චක්‍රයෙහි පරාමිතික සමීකරණය : $x = 2 + \cos 2\theta$, $y = 4 \sin \theta$.

$$\frac{dx}{d\theta} = -2\sin 2\theta, \frac{dy}{d\theta} = 4\cos \theta \quad (5)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4\cos \theta}{-4\sin \theta \cos \theta} = -\frac{1}{\sin \theta} \quad (5)$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ විට, } \frac{dy}{dx} = -\sqrt{2} \quad \text{අභිලම්භයේ අනුක්‍රමණය} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (5)$$

$$(2, 2\sqrt{2}) \text{ ලක්ෂ්‍යයෙහි අභිලම්භයේ සමීකරණය : } (5)$$

$$y - 2\sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - 2) \quad (5)$$


$$\sqrt{2}y - 4 = x - 2 \Rightarrow x - \sqrt{2}y + 2 = 0.$$

25

8 වන ප්‍රශ්නය

8. $A(10,0)$ හා $B(0,5)$ ලක්ෂ්‍ය යා කරන සරල රේඛාව $C(1,2)$ හා $D(3,6)$ ලක්ෂ්‍ය යා කරන CD රේඛා ඛණ්ඩයෙහි ලම්බ සමච්ඡේදකය බව පෙන්වන්න.

$ACBD$ චතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය වර්ග ඒකක 25 ක් බව තවදුරටත් පෙන්වන්න.



CD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය, $M(2, 4)$.

$$AB \text{ රේඛාවේ සමීකරණය : } \frac{y-5}{x-0} = -\frac{1}{2} \quad (5)$$

$$\Rightarrow x+2y-10=0$$

$\therefore 2+2.4-10=0$ බැවින් M හි ඛණ්ඩාංක, ඉහත සමීකරණය සපුරාලයි. 5

තවද, CD හි අනුක්‍රමණය $= \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$. $\therefore CD \perp AB$. 5

$$ACBD \text{ හි වර්ගඵලය} = \frac{1}{2} AB (MD+MC) = \frac{1}{2} AB \cdot CD = \frac{1}{2} \sqrt{100+25} \sqrt{2^2+4^2} = 25$$

5
5

25

9 වන ප්‍රශ්නය

9. O මූල ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ ද $y = 1$ රේඛාවේ $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ වෘත්තයේත් ඡේදන ලක්ෂ්‍ය දෙක ඔස්සේ ද යන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය හා අරය සොයන්න.

$$x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 + \lambda(y - 1) = 0 \text{ වෘත්තය } (5) \text{ } O \text{ මූලය ඔස්සේ යන බැවින්}$$

$$1 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 1. \quad (5)$$

$$\text{අවශ්‍ය වෘත්තයේ සමීකරණය } x^2 + y^2 - 2x - y = 0 \quad (5)$$

$$(x-1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 1 + \frac{1}{4} = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$$

$$\text{කේන්ද්‍රය } \left(1, \frac{1}{2}\right), \text{ අරය } = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

(5)

(5)

25

10 වන ප්‍රශ්නය

10. $\sin \alpha + \sin \beta = 1$ හා $\cos \alpha + \cos \beta = \sqrt{3}$ යැයි ගනිමු; මෙහි α හා β සුළු කෝණ වේ. $\alpha + \beta$ හි අගය සොයන්න.

α හා β දෙකම සුළු කෝණ වේ.

$$\sin \alpha + \sin \beta = 1, \quad 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) = 1 \quad (5)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = \sqrt{3}, \quad 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \sqrt{3} \quad (5)$$

බෙදීමෙන්, $\tan \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad (5) \quad 0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{\pi}{3}. \quad (5)$$

25

11 වන ප්‍රශ්නය

11. (a) x හි මාත්‍රය 4 වූ $F(x)$, $G(x)$ හා $H(x)$ යන බහුපද පහත දැක්වෙන පරිදි දෙනු ලැබේ.

$$F(x) \equiv (x^2 - \alpha x + 1)(x^2 - \beta x + 1), \text{ මෙහි } \alpha \text{ හා } \beta \text{ තාත්ත්වික නියත වේ;}$$

$$G(x) \equiv 6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6,$$

$$H(x) \equiv x^4 + x^2 + 1.$$

(i) $F(x) = 0$ හා $G(x) = 0$ යන දෙකට ම එක ම මූල තිබේ නම්, α හා β මූල වශයෙන් ඇති වර්ගජ සමීකරණය $6x^2 - 35x + 50 = 0$ බව පෙන්වන්න.

ඒකයින්, $G(x) = 0$ සමීකරණයෙහි සියලු ම මූල සොයන්න.

(ii) $F(x) \equiv H(x)$ වෙයි නම්, α හා β ට තිබිය හැකි අගයන් සොයා, $H(x) = 0$ සමීකරණයේ මූල තාත්ත්වික හෝ වන බව පෙන්වන්න.

(b) (i) $f(x) \equiv 2x^4 + \gamma x^3 + \delta x + 1$ යැයි ගනිමු; මෙහි γ හා δ තාත්ත්වික නියත වේ. $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$ හා $f(-2) = 21$ බව දී ඇති විට, $f(x)$ හි තාත්ත්වික ඒකජ සාධක දෙක සොයන්න.

(ii) සියලු ම තාත්ත්වික x සඳහා $(x^2 + x + 1)P(x) + (x^2 - 1)Q(x) = 3x$ සමීකරණය සපුරාලන $P(x)$ හා $Q(x)$ ඒකජ ප්‍රකාශන දෙක සොයන්න.

$$(a) \quad F(x) = (x^2 - \alpha x + 1)(x^2 - \beta x + 1)$$

$$= x^4 - (\alpha + \beta)x^3 + (2 + \alpha\beta)x^2 - (\alpha + \beta)x + 1 \quad (5)$$

$$(i) \quad F(x) = 0 \text{ හා } G(x) = 0 \text{ එකම මූල සහිත නම්, එවිට } G(x) = 6F(x) \Rightarrow$$

$$6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 6[x^4 - (\alpha + \beta)x^3 + (2 + \alpha\beta)x^2 - (\alpha + \beta)x + 1]$$

(5)

$$\text{සංගුණක සමාන කිරීමෙන් : } \alpha + \beta = \frac{35}{6} \quad (5)$$

$$2 + \alpha\beta = \frac{62}{6} \Rightarrow \alpha\beta = \frac{62}{6} - 2 = \frac{50}{6} \quad (5)$$

α හා β මූල වශයෙන් ඇති වර්ගජ සමීකරණය,

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{35}{6}x + \frac{50}{6} = 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 35x + 50 = 0$$

25

$$\Rightarrow (3x - 10)(2x - 5) = 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow x = 10/3 \text{ or } x = 5/2$$

$$\alpha = 10/3 \text{ හා } \beta = 5/2 \text{ ලෙස ගනිමු.}$$

(5)

(5)

$G(x) = 0$ සමීකරණයේ මූල, $F(x) = 0$ මගින් දෙනු ලැබේ.

$$\Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{10}{3}x + 1\right)(x^2 - \frac{5}{2}x + 1) = 0 \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow (3x^2 - 10x + 3)(2x^2 - 5x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)(3x - 1)(x - 2)(2x - 1) = 0 \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow x = 2, \frac{1}{2}, 3 \text{ හෝ } \frac{1}{3}$$

(5)

(5)

35

(ii) $H(x) \equiv F(x)$ නම්

$$x^4 + x^2 + 1 = x^4 - (\alpha + \beta)x^3 + (2 + \alpha\beta)x^2 - (\alpha + \beta)x + 1$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \alpha + \beta = 0 \quad (5) \\ 2 + \alpha\beta = 1 \Rightarrow \alpha\beta = -1 \quad (5) \end{array} \right\} \text{---} [*]$$

$$[*] \Leftrightarrow \alpha(-\alpha) = -1 \Rightarrow \alpha^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \alpha = \pm 1 \\ \text{එවිට } \beta = \mp 1 \end{array} \right\} \quad (5)$$

වෙනත් ක්‍රමයක්

$\therefore \alpha$ හා β , $x^2 - 1 = 0$ සමීකරණයේ මූල වේ.

$$\Rightarrow x = \pm 1. \quad (5)$$

$\alpha = 1$ හා $\beta = -1$ ලෙස ගනිමු.

$$H(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow F(x) = 0 \Rightarrow (x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1) = 0 \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x + 1 = 0 \text{ හෝ } x^2 + x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = (-1)^2 - 4(1)(1) < 0 \quad \Delta' = 1 - 4(1)(1) < 0 \quad (5)$$

$\therefore H(x) = 0$ සමීකරණයට තාත්ත්වික මූල නොමැත.

25

(b) (i) $f(x) = 2x^4 + \gamma x^3 + \delta x + 1$
 $f(-1/2) = 0$ බැවින්,

$$2\left(\frac{1}{16}\right) + \gamma\left(-\frac{1}{8}\right) + \delta\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 1 - \gamma - 4\delta + 8 = 0$$

$$\Rightarrow \gamma + 4\delta = 9 \quad (5)$$

$f(-2) = 21$ බැවින්,

$$2(16) + \gamma(-8) + \delta(-2) + 1 = 21$$

$$\Rightarrow 8\gamma + 2\delta = 12$$

$$\Rightarrow 4\gamma + \delta = 6 \quad (5)$$

$$\Rightarrow \gamma = 1 \text{ හා } \delta = 2$$

$$(5)$$

$$(5)$$

එම නිසා $f(x) = 2x^4 + x^3 + 2x + 1$

$$= (2x + 1)(x^3 + 1), \because f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0.$$

$$= (2x + 1)(x + 1)(x^2 - x + 1)$$

$f(x)$ හි ඒකජ සාධක දෙක $x + 1$ හා $2x + 1$ වේ.

$$(5)$$

$$(5)$$

30

(ii) $(x^2 + x + 1)P(x) + (x^2 - 1)Q(x) = 3x$

$P(x) = ax + b$ හා $Q(x) = cx + d$ යැයි ගනිමු.

එවිට $(x^2 + x + 1)(ax + b) + (x^2 - 1)(cx + d) = 3x \quad (5)$

සංගුණක සමාන කිරීමෙන්,

$$a + c = 0 \dots\dots\dots (1) \quad (5)$$

$$b + a + d = 0 \dots\dots\dots (2) \quad (5)$$

$$b + a - c = 3 \dots\dots\dots (3) \quad (5)$$

$$b - d = 0 \dots\dots\dots (4) \quad (5)$$

$$(1) + (3) \Rightarrow 2a + b = 3 \dots\dots\dots (5)$$

$$(2) + (4) \Rightarrow 2b + a = 0 \dots\dots\dots (6)$$

(5) න් හා (6) න්, $a \equiv 2$ හා $b = -1$

(1) න්, $c = -2$, තවද (4) න් $d = -1$

$$\therefore P(x) = 2x - 1 \quad \text{හා} \quad Q(x) = -2x - 1$$

(5)

(5)

35

වෙනත් ක්‍රමයක්

(ii) $(x^2 + x + 1)P(x) + (x^2 - 1)Q(x) = 3x$

$P(x) = ax + b$ හා $Q(x) = cx + d$ යැයි ගනිමු.

එවිට $(x^2 + x + 1)(ax + b) + (x^2 - 1)(cx + d) = 3x$

(5)

$$x = 1 : 3(a + b) = 3 \Rightarrow a + b = 1 \quad (5)$$

$$x = -1 : -a + b = -3 \quad (5)$$

$$x = 0 : -1 - d = 0 \quad (5)$$

$$x = \frac{1}{2} : \left(\frac{1}{4} - 1\right)\left(-\frac{c}{2} - 1\right) = \frac{3}{2} \quad (5)$$

$$x = 0 : -1 - d = 0 \Rightarrow d = -1$$

$$\Rightarrow c = -2$$

$$P(x) = 2x - 1 \quad Q(x) = -2x - 1$$

(5)

(5)

35

12 වන ප්‍රශ්නය

12.(a) නිපුණතා සංදර්ශන තරගයක විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා සාමාජික සාමාජිකාවන් හතර දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ලක් පිහිටුවා ගත යුතුව ඇත. මෙම විනිසුරු මඩුල්ල තෝරා ගත යුතුව ඇත්තේ ක්‍රීඩකාවන් තුන් දෙනෙකු, ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු, ගායිකාවන් හය දෙනෙකු, ගායකයින් පස් දෙනෙකු, නිළියන් දෙදෙනෙකු හා නළුවන් හතර දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමකිනි. ප්‍රධාන විනිසුරු, ක්‍රීඩකයකු හෝ ක්‍රීඩකාවක හෝ විය යුතු ය. විනිසුරු මඩුල්ලේ අනෙක් තිදෙනා තෝරා ගත යුතු වන්නේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩකාවන් හැර කණ්ඩායමේ ඉතිරි අයගෙන් ය. පහත දැක්වෙන එක් එක් අවස්ථාවේ දී විනිසුරු මඩුල්ල පිහිටුවා ගත හැකි වෙනස් ආකාර ගණන සොයන්න.

- අඩු තරමින් එක් ගායිකාවක හා එක් ගායකයකු මඩුල්ලට ඇතුළත් විය යුතු ම නම්,
- ප්‍රධාන විනිසුරු ඇතුළුව පිරිමි දෙදෙනෙකු හා ගැහැනු දෙදෙනෙකු මඩුල්ලේ සිටිය යුතු ම නම්,
- ප්‍රධාන විනිසුරු ක්‍රීඩකාවක විය යුතු ම නම්.

(b) $r \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $A(r+5)^2 - B(r+1)^2 = r+C$ වන පරිදි A, B හා C නියතවල අගයන් සොයන්න.

ඒකාස්ථ, අපරිමිත ශ්‍රේණියක r වන පදය $U_r = \frac{8}{(r+1)^2(r+3)(r+5)^2}$ යන්න $f(r) - f(r+2)$ ලෙස ප්‍රකාශ කළ හැකි බව පෙන්වන්න; මෙහි $f(r)$ යනු නිර්ණය කළ යුතු ශ්‍රිතයක් වේ.

$\sum_{r=1}^n U_r$ ශ්‍රේණියේ ඓක්‍යය සොයා, $\sum_{r=1}^{\infty} U_r$ ශ්‍රේණිය, $\frac{1}{8^2} + \frac{1}{15^2}$ ඓක්‍යයට අභිසාරී වන බව **අපෝහනය** කරන්න.

(a)	ක්‍රීඩකයින්	ක්‍රීඩකාවන්	ගායකයන් (MS)	ගායිකාවන් (FS)	නළුවන්	නිළියන්
	2	3	5	6	4	2
මඩුල්ල :	ප්‍රධාන		අනෙක් තිදෙනා			

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad & \text{ප්‍රධාන 1 + FS 1 + MS 1 + අනෙක් 1} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^6C_1 \times {}^5C_1 \times {}^6C_1 \quad \begin{matrix} (5) \\ (5) \\ (5) \end{matrix} + \quad \begin{matrix} (5) \\ (5) \\ (5) \end{matrix} \\
 & \text{ප්‍රධාන 1 + FS 2 + MS 1} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^6C_2 \times {}^5C_1 \\
 & \text{ප්‍රධාන 1 + FS 1 + MS 2} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^6C_2 \times {}^5C_2 \\
 & \quad \quad \quad = 900 + 375 + 300 = 1575 \quad (5)
 \end{aligned}$$

25

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \quad & \text{ගැහැණු ප්‍රධාන 1 + ගැහැණු 1 + පිරිමි 2} \Rightarrow {}^3C_1 \times {}^8C_1 \times {}^9C_2 \quad \begin{matrix} (5) \\ (5) \end{matrix} + \quad (5) \\
 & \text{පිරිමි ප්‍රධාන 1 + ගැහැණු 2 + පිරිමි 1} \Rightarrow {}^2C_1 \times {}^8C_2 \times {}^9C_1 \quad \begin{matrix} (5) \\ (5) \end{matrix} + \quad (5) \\
 & \quad \quad \quad = 864 + 504 = 1368 \quad (5)
 \end{aligned}$$

30

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad & \text{ප්‍රධාන 1 ලෙස ක්‍රීඩකාවක් + ඕනෑම අනෙක් 3 දෙනෙක්} \Rightarrow {}^3C_1 \times {}^{17}C_3 \\
 & \quad \quad \quad = 2040 \quad (5)
 \end{aligned}$$

15

(b) $A(r+5)^2 - B(r+1)^2 \equiv r + C$
 $A(r^2 + 10r + 25) - B(r^2 + 2r + 1) \equiv r + C$

සංගුණක සමාන කිරීමෙන් ;

$$r^2 : A - B = 0 \quad (5)$$

$$r : 10A - 2B = 1 \quad (5)$$

$$r^0 : 25A - B = C \quad (5)$$

$$A = B = \frac{1}{8}, \quad (5) \quad C = 24A = 3 \quad (5) \quad \text{එවිට} \quad (r+5)^2 - (r+1)^2 \equiv 8(r+3)$$

25

දෙන ලද U_r සලකන්න :

$$U_r = \frac{(5) \quad 8(r+3)}{(r+1)^2(r+3)^2(r+5)^2} = \frac{(r+5)^2 - (r+1)^2}{(r+1)^2(r+3)^2(r+5)^2} \quad (5)$$

$$= \frac{1}{(r+1)^2(r+3)^2} - \frac{1}{(r+3)^2(r+5)^2}$$

$$= f(r) - f(r+2) \quad \text{මෙහි} \quad f(r) = \frac{1}{(r+1)^2(r+3)^2} \quad (5)$$

15

$$U_r = f(r) - f(r+2)$$

$r = 1, 2, \dots, n$ සඳහා

$$U_1 = f(1) - f(3) \quad (10)$$

$$U_2 = f(2) - f(4)$$

$$U_3 = f(3) - f(5)$$

$\vdots$

$$U_{n-2} = f(n-2) - f(n)$$

$$U_{n-1} = f(n-1) - f(n+1)$$

$$U_n = f(n) - f(n+2) \quad (10)$$

$$\sum_{r=1}^n U_r = f(1) + f(2) - f(n+1) - f(n+2) \quad (5)$$

$$= \frac{1}{2^2 4^2} + \frac{1}{3^2 5^2} - \frac{1}{(n+2)^2 (n+4)^2} - \frac{1}{(n+4)^2 (n+6)^2} \quad (5)$$

$$\therefore \sum_r U_r = \frac{1}{8^2} + \frac{1}{15^2}, \quad n \rightarrow \infty \quad \text{විට} \quad \text{අවසාන පද} \quad \text{දෙක} \quad \text{ශුන්‍යය} \quad \text{කරා} \quad \text{එළඹෙන} \quad \text{බැවින්},$$

(5)

40

13 වන ප්‍රශ්නය

13.(a) **A, B** හා **C** න්‍යාස තුනක්

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \end{pmatrix} \text{ හා } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ මගින් දෙනු ලැබේ.}$$

(i) $\mathbf{AC} = \mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ බව පෙන්වන්න. **CA** ගුණිතයත් සොයන්න.

(ii) $\mathbf{BC} = \mathbf{I}_2$ වන පරිදි a, b, c හා d හි අගයන් සොයන්න.

(iii) $(\lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{I}_2$ වෙයි නම්, λ හා μ සම්බන්ධ කෙරෙන සමීකරණයක් ලබා ගන්න.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} -3 & 8 & -6 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} \text{ න්‍යාසය, } \mathbf{A} \text{ හා } \mathbf{B} \text{ ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කර, } \mathbf{D}\mathbf{C} \text{ ගුණිතය සොයන්න.}$$

(b) z සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් $z = \cos \theta + i \sin \theta$ ලෙස දෙනු ලැබේ; මෙහි $\theta (-\pi < \theta \leq \pi)$ තාත්ත්වික පරාමිතියකි. ආගන්තික සටහනක් මත z නිරූපණය කරන ලක්ෂ්‍යයේ C පථය සොයන්න.

$\cos \theta$ හා $\sin \theta$ සඳහා ප්‍රකාශන z හා $\frac{1}{z}$ ඇසුරෙන් ලබා ගන්න.

$$w = \frac{2z}{z^2 + 1} \text{ හා } t = \frac{z^2 - 1}{z^2 + 1} \text{ යැයි ගනිමු; මෙහි } z \text{ යන්න } z \neq \pm i \text{ වන පරිදි } C \text{ මත පිහිටයි.}$$

(i) $\text{Im}(w) = 0$ හා $\text{Re}(t) = 0$ බව පෙන්වන්න. ඒවායින්, හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ, $w^2 + t^2 = 1$ බව තවදුරටත් පෙන්වන්න.

(ii) $w = 2$ සමීකරණය සපුරාලන z සංකීර්ණ සංඛ්‍යා සොයන්න.

(iii) $t = i$ සමීකරණය සපුරාලන z සංකීර්ණ සංඛ්‍යා සොයන්න.

(a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \end{pmatrix} \text{ හා } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(i) $\mathbf{AC} = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2$

(5)

$$\mathbf{CA} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

10

(5)

(ii) $\mathbf{BC} = \begin{pmatrix} 3a + 2b & 4a + 3b \\ 3c + 2d & 4c + 3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1 වැනි පේළිය

$$\left. \begin{array}{l} 3a + 2b = 1 \\ 4a + 3b = 0 \end{array} \right\} \quad (5)$$

$$\left. \begin{array}{l} 3a + 2\left(\frac{-4a}{3}\right) = 1 \\ a = 3, b = -4 \end{array} \right\} \quad (5)$$

2 වැනි පේළිය

$$\left. \begin{array}{l} 3c + 2d = 0 \\ 4c + 3d = 1 \end{array} \right\} \quad (5)$$

$$\left. \begin{array}{l} 4c + 3\left(\frac{-3c}{2}\right) = 1 \\ c = -2, d = 3 \end{array} \right\} \quad (5)$$

$$\therefore \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

35

$$(iii) \quad (\lambda A + \mu B)C = \lambda AC + \mu BC = (\lambda + \mu)I_2 = I_2 \quad (5)$$

$$\Rightarrow (\lambda + \mu - 1)I_2 = 0 \Rightarrow \lambda + \mu = 1 \quad (5)$$

10

$$D = \begin{pmatrix} -3 & 8 & -6 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

1 වැනි තීරුව

3 වැනි තීරුව

$$\mu = -1 \quad (5)$$

$$\lambda = 2 \quad (5)$$

15

එම නිසා $D = 2A - B$ හා $DC = (2A - B)C = 2AC - BC \quad (5)$

$$= 2I_2 - I_2 = I_2 \quad (5)$$

10

(b) $z = \cos \theta + i \sin \theta$, $(-\pi < \theta \leq \pi)$

$$|z| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1;$$

z නිරූපණය කරන ලක්ෂ්‍යය අරය 1 හා කේන්ද්‍රය O වූ C වෘත්තය මත පිහිටයි.

$$\bar{z} = \cos \theta - i \sin \theta = \frac{1}{z} \quad (5)$$

$$z + \bar{z} = 2\cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \quad (5)$$

$$z - \bar{z} = 2i \sin \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) \quad (5)$$

25

(i) $w = \frac{2z}{z^2 + 1} = \frac{2}{z + \frac{1}{z}} = \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta \quad (5) \quad \therefore \text{Im}(w) = 0$

$$t = \frac{z^2 - 1}{z^2 + 1} = \frac{z - \frac{1}{z}}{z + \frac{1}{z}} = \frac{i \sin \theta}{\cos \theta} = i \tan \theta ; \therefore \text{Re}(t) = 0 \quad (5)$$

10

$$w^2 + t^2 = \sec^2 \theta + (i \tan \theta)^2 = \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \quad (5)$$

5

(ii) $w = 2 \Rightarrow \frac{1}{\cos \theta} = 2$ හෝ $\cos \theta = \frac{1}{2} \quad (5)$

දෙන ලද ප්‍රාන්තරය තුළ $\theta = \pm \frac{\pi}{3} \quad (5) \quad z = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, z = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (5)$

15

(iii) $t = i \Rightarrow i \tan \theta = i \quad (5)$

$$\Rightarrow \tan \theta = 1$$

දෙන ලද ප්‍රාන්තරය තුළ $\theta = \pi/4$ හෝ $\theta = (-3\pi)/4. \quad (5)$

$$z = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}, z = -\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) \quad (5)$$

15

14 වන ප්‍රශ්නය

14.(a) $x \neq 0$ සඳහා $y = x \sin \frac{1}{x}$ යැයි ගනිමු.

(i) $x \frac{dy}{dx} = y - \cos \frac{1}{x}$ හා


(ii) $x^4 \frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$

බව පෙන්වන්න.

(b) $x \neq 1$ සඳහා $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{(x-1)^2}$ යැයි ගනිමු.

$f(x)$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය හා හැරුම් ලක්ෂ්‍යය සොයන්න. හැරුම් ලක්ෂ්‍යය හා ස්පර්ශෝන්මුඛ දක්වමින්, $y = f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයේ දළ සටහනක් අඳින්න.

(c) දී ඇති රූපයෙහි, $ABCD$ යනු, BC හා AD සමාන්තර පාද සහිත ත්‍රපිසියමකි. සෙන්ටිමීටරවලින් මනිනු ලබන එහි පාදවල දිග $AB = CD = a$, $BC = b$ හා $AD = b + 2x$ මගින් දෙනු ලැබේ; මෙහි $0 < x < a$ වේ. BE හා CF යනු පිළිවෙළින් B හා C ශීර්ෂවල සිට AD පාදය මතට ඇඳි ලම්භ වේ.



$ABCD$ ත්‍රපිසියමේ වර්ගඵලය $S(x)$, වර්ග සෙන්ටිමීටරවලින් $S(x) = (b+x)\sqrt{a^2 - x^2}$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.

$a = \sqrt{6}$ හා $b = 4$ නම්, x හි එක්තරා අගයකට $S(x)$ උපරිම වන බව තවදුරටත් පෙන්වා, x හි මෙම අගය හා ත්‍රපිසියමේ උපරිම වර්ගඵලය සොයන්න.

(a) $y = x \cdot \sin(1/x)$, $x \neq 0$

(i) $\frac{dy}{dx} = \sin(1/x) + x \left(\frac{-1}{x^2} \right) \cos(1/x)$ (5) x වලින් ගුණ කිරීමෙන් (5)

$\Rightarrow x \frac{dy}{dx} = y - \cos(1/x)$

10

(ii) x විෂයයෙන් අවකලනයෙන් හා $\sin(1/x) = y/x$ යෙදීමෙන් :

$x \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} + \sin(1/x) \cdot \left(\frac{-1}{x^2} \right)$ (10)

x^3 මගින් ගුණ කිරීමෙන් $\Rightarrow x^4 \frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ (5)

10

(b) $f(x) = \frac{2x^2+1}{(x-1)^2}$, $x \neq 1$

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2 \cdot 4x - (2x^2+1) \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4} \quad (10)$$

$$= \frac{(x-1)4x - 2(2x^2+1)}{(x-1)^3}$$

$$= \frac{-2(2x+1)}{(x-1)^3} ; (x \neq 1) \quad (5)$$

15

$x = \frac{-1}{2}$ වන විට $f'(x) = 0$ වේ. (5)

05

$x = 1$ වන විට $f'(x)$ නොපවතී.

$\Rightarrow x = 1$ හිදී සිරස් ස්පර්ශෝන්මුඛයක් ඇත. (5)

	$x < (-1/2)$	$(-1/2) < x < 1$	$1 < x$
$f'(x)$ හි ලකුණ	(-)	(+)	(-)
			

(10)

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2(-1/2)^2+1}{\left(\frac{-1}{2}-1\right)^2} = \frac{3/2}{(-3/2)^2} = 2/3 \quad (5)$$


$\therefore f(x)$, $\left(\frac{-1}{2}, \frac{2}{3}\right)$ ලක්ෂ්‍යයේදී ස්ථානීය අවමයක් ගනී.

$x > 1$ හා $f'(x) < 0$

$$x \rightarrow +\infty, \quad f(x) \rightarrow 2$$


$$x \rightarrow -\infty, \quad f(x) \rightarrow 2.$$

(5)



50

(c)



වර්ගඵලය : $S(x) = 2 \times \frac{1}{2} x (\sqrt{a^2 - x^2}) + b\sqrt{a^2 - x^2} = (b + x)\sqrt{a^2 - x^2}$

(10)

10

$a = \sqrt{6}$, $b = 4$ ආදේශයෙන්,

$$S(x) = (4 + x)\sqrt{6 - x^2} \quad (5)$$

$$\frac{dS}{dx} = (4 + x) \frac{1}{2\sqrt{6-x^2}} (-2x) + \sqrt{6 - x^2} \quad (5)$$

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-x(4 + x) + 6 - x^2}{2\sqrt{6-x^2}}$$

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2 - 4x + 6}{\sqrt{6-x^2}} = \frac{-2(x^2 + 2x - 3)}{\sqrt{6-x^2}} \quad (5)$$

$$\frac{dS}{dx} = 0 \text{ වන විට } x^2 + 2x - 3 = 0 \quad (5)$$

$$(x + 3)(x - 1) = 0$$

x ධන බැවින් $x = 1$ හැරුම් ලක්ෂ්‍යයක් දෙයි. (5)

	$0 < x < 1$	$1 < x < \sqrt{6}$
$S'(x)$ හි ලකුණ	(+)	(-)
	↗ (5)	↘ (5)

$\therefore x = 1$ හිදී $S(x)$ උපරිම වේ. (5)

$S(x)$ හි උපරිම අගය, $S(1) = (4 + 1)\sqrt{6 - 1} = 5\sqrt{5}$ වර්ග ඒකක. (5)

45

15 වන ප්‍රශ්නය

15.(a) $\int_0^{\pi} f(x) dx = \int_0^{\pi} f(\pi - x) dx$ බව පෙන්වන්න.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{4} \text{ බවත් පෙන්වන්න.}$$

ඒනයින්, $\int_0^{\pi} x \sin^2 x dx = \frac{\pi^2}{4}$ බව පෙන්වන්න.

(b) සුදුසු ආදේශයක් හා කොටස් වශයෙන් අනුකලන ක්‍රමය භාවිතයෙන්, $\int x^3 e^{x^2} dx$ සොයන්න.

(c) $\frac{1}{x^3 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1}$ වන පරිදි A, B හා C නියතවල අගයන් සොයන්න.

ඒනයින්, $\frac{1}{x^3 - 1}$ යන්න x විෂයයෙන් අනුකලනය කරන්න.

(d) $t = \tan \frac{x}{2}$ ආදේශය භාවිතයෙන්, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{5 + 4\cos x + 3\sin x} = \frac{1}{6}$ බව පෙන්වන්න.

(a) $y = \pi - x$ යැයි ගනිමු.

$$\int_0^{\pi} f(x) dx = \int_{\pi}^0 f(\pi - y) (-dy) = \int_0^{\pi} f(\pi - y) dy = \int_0^{\pi} f(\pi - x) dx$$

10

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2} [x]_0^{\pi/2} - 0 = \frac{\pi}{4}, \quad \because [\sin 2x]_0^{\pi/2} = 0$$

10

පළමු ප්‍රතිඵලය යෙදීමෙන්,

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x \sin^2 x dx &= \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin^2(\pi - x) dx \\ &= \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x dx - \int_0^{\pi} x \sin^2 x dx \end{aligned}$$

$$\therefore 2 \int_0^{\pi} x \sin^2 x dx = \pi \left[\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^2 x dx \right]$$

$$= \pi \left[\frac{\pi}{4} + J \right] \quad \text{මෙහි } J = \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^2 x dx$$

$\pi - x = y$ ආදේශයෙන්,

$$J = \int_{\pi/2}^0 \sin^2(\pi - y) (-dy) = \int_0^{\pi/2} \sin^2 y dy = \pi/4$$

$$\therefore \int_0^{\pi} x \sin^2 x \, dx = \frac{\pi}{2} \left[\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right] = \frac{1}{2} \left(\pi \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi^2}{4} \quad (5)$$

30

(b) ආදේශය

$$t = x^2 \Rightarrow dt = 2x dx \quad (5)$$

$$\therefore \int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int t e^t dt \quad (5)$$

$$= \frac{1}{2} \int t \frac{d}{dt}(e^t) dt = \frac{1}{2} t e^t - \frac{1}{2} \int e^t dt \quad (5)$$

$$= \frac{1}{2} t e^t - \frac{1}{2} e^t + C. \text{ ආදේශය : } t = x^2, \int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} (x^2 - 1) + C \quad (5) \quad (5) \quad (5)$$

30

$$(c) \quad \frac{1}{x^3 - 1} \equiv \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1}$$

$$1 \equiv A(x^2 + x + 1) + (x - 1)(Bx + C)$$

$$x = 1 \text{ ආදේශයෙන් } 1 = 3A \Rightarrow A = \frac{1}{3} \quad (5)$$

$$x = 0 \text{ ආදේශයෙන්, } 1 = A - C \Rightarrow C = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3} \quad (5)$$

$$x^2 \text{ හි සංගුණක සමාන කිරීමෙන්, } 0 = A + B \Rightarrow B = -\frac{1}{3} \quad (5)$$

15

$$\int \frac{dx}{x^3 - 1} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{3} \int \frac{(x + 2)}{x^2 + x + 1} dx$$

(5)

$$= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{3} \int \frac{\frac{1}{2}(2x + 1) + \frac{3}{2}}{x^2 + x + 1} dx \quad (5)$$

$$= \frac{1}{3} \ln|x - 1| - \frac{1}{6} \ln|x^2 + x + 1| - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \quad (5)$$

(5)

(5)

$$= \frac{1}{3} \ln|x-1| - \ln|x^2+x+1| - \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C \quad (5)$$

35

(d) ආදේශය : $t = \tan(x/2) \Rightarrow dt = \frac{1}{2}(1+t^2) dx \Rightarrow dx = \frac{2 dt}{1+t^2} \quad (5)$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{5+4\cos x+3\sin x} &= \int_0^1 \frac{dx}{5+4\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)+3\cdot\frac{2t}{1+t^2}} \quad (5) \\ &= \int_0^1 \frac{2 dt}{5(1+t^2)+4(1-t^2)+6t} \\ &= \int_0^1 \frac{2 dt}{t^2+6t+9} \quad (5) \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 \frac{2 dt}{(t+3)^2} = 2 \left[\frac{-1}{t+3} \right]_0^1 = 2 \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{6}$$

(5)

20

16 වන ප්‍රශ්නය

16. වෘත්ත දෙකක සමීකරණ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ හා $x^2 + y^2 + 2g'x + 2f'y + c' = 0$ යැයි ගනිමු. මෙම වෘත්ත ප්‍රලම්භ ලෙස ඡේදනය වේ නම්, $2gg' + 2ff' = c + c'$ බව පෙන්වන්න.

$x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$ සමීකරණය සහිත C වෘත්තය x -අක්ෂය ස්පර්ශ කරන බව පෙන්වන්න.

O මූලයෙහි පොදු කේන්ද්‍රය පිහිටන, අරය r වූ C_1 වෘත්තයක් හා අරය $R (> r)$ වූ C_2 වෘත්තයක් පිළිවෙළින් A හා B ලක්ෂ්‍යවල දී C වෘත්තය ස්පර්ශ කරයි. r හා R හි අගයන් ද A හා B හි ඛණ්ඩාංක ද සොයන්න.

S යනු, C හා C_1 යන වෘත්ත දෙක ම ප්‍රලම්භ ලෙස ඡේදනය කරන හා y -අක්ෂය ස්පර්ශ කරන වෘත්තයක් යැයි ගනිමු. S සඳහා තිබිය හැකි සමීකරණ දෙක සොයන්න.

C හා C_2 යන වෘත්ත දෙකට ම B ලක්ෂ්‍යයෙහි දී අඳින ලද පොදු ස්පර්ශකයට x -අක්ෂය P හි දී ද y -අක්ෂය Q හි දී ද හමු වේ. පොදු ස්පර්ශකයේ සමීකරණය $4x + 3y = 40$ බවත්, PQ රේඛා ඛණ්ඩය විෂ්කම්භයක් ලෙස ඇති වෘත්තයේ සමීකරණය $3(x^2 + y^2) - 30x - 40y = 0$ බවත් පෙන්වන්න.

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ හා $x^2 + y^2 + 2g'x + 2f'y + c' = 0$ වෘත්ත දෙක ප්‍රලම්භ ලෙස ඡේදනය වේ නම්, එවිට $(g - g')^2 + (f - f')^2 = g^2 + f^2 - c + g'^2 + f'^2 - c'$ (5)

(5)

(5)

$$\Rightarrow 2gg' + 2ff' = c + c'$$

15

C වෘත්තය $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$

$$(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 3^2.$$

වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය $(4,3)$ (5) අරය $= 3$ (5)

මෙම වෘත්තය $(4,0)$ හිදී x -අක්ෂය ස්පර්ශ කරයි, $\therefore$ කේන්ද්‍රයේ y -ඛණ්ඩාංකය $= 3$ (5)

15

C_1 වෘත්තය : $x^2 + y^2 = r^2$, $A(r \cos \alpha, r \sin \alpha)$ ලක්ෂ්‍යයේදී බාහිර ලෙස C ස්පර්ශ කරයි, මෙහි

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}, \sin \alpha = \frac{3}{5}.$$

$$r + 3 = 5 \Rightarrow r = 2 \quad (5)$$


$$\therefore A \equiv \left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right) \quad (5)$$

C_2 වෘත්තය : $x^2 + y^2 = R^2$, B ලක්ෂ්‍යයේදී අභ්‍යන්තර ලෙස C

ස්පර්ශ කරයි, (5)

$$R = 5 + 3 = 8 \quad (5)$$

$$\therefore B \equiv (8 \cos \alpha, 8 \sin \alpha) = \left(\frac{32}{5}, \frac{24}{5}\right) \quad (5)$$



30

C හා C_1 ප්‍රලම්බ ලෙස ඡේදනය කරන හා y - අක්ෂය ස්පර්ශ කරන වෘත්තය S යැයි ගනිමු.

$$S: x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

එහි කේන්ද්‍රය ; $(-g, -f)$ හා අරය $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

$$\because S, y - \text{අක්ෂය ස්පර්ශ කරන බැවින් අරය} = |g|, \quad (5)$$

$$g^2 + f^2 - c = g^2 \Rightarrow f = \pm \sqrt{c}. \quad (5)$$

$$S \text{ හා } C_1 \text{ ප්‍රලම්බව ඡේදනය} \Rightarrow 0 + 0 = c - 2^2 \Rightarrow c = 4. \text{ එම නිසා } f = \pm 2 \quad (5)$$

$$S \text{ හා දෙන ලද } C \text{ වෘත්තය ප්‍රලම්බව ඡේදනය} \Rightarrow 2g(-4) + 2f(-3) = 4 + 16 = 20 \quad (5)$$

$$\Rightarrow 4g + 3f + 10 = 0 \quad (5)$$

$$f = +2 \Rightarrow 4g = -10 - 6 \Rightarrow g = -4 \quad (5)$$


$$f = -2 \Rightarrow 4g = -10 + 6 \Rightarrow g = -1 \quad (5)$$

S හි නිබ්භය හැකි සමීකරණ දෙක වන්නේ,

$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 4 = 0 \quad \text{සහ} \quad (5)$$

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0 \quad (5)$$

50



C හා C_2 ට පොදු ස්පර්ශකයේ සමීකරණය $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ වේ ; මෙහි $P \equiv (a, 0)$ හා $Q \equiv (0, b)$ යනු එයට ඛණ්ඩාංක අක්ෂ දෙක හමුවන ලක්ෂ්‍යයයි. (10)

$$a = 8 \sec \alpha = 8 \cdot \frac{5}{4} = 10 \Rightarrow P \equiv (10, 0) \quad (5)$$

$$b = 8 \operatorname{cosec} \alpha = 8 \cdot \frac{5}{3} = \frac{40}{3} \Rightarrow Q \equiv \left(0, \frac{40}{3}\right) \quad (5)$$

$$PQ \text{ හි සමීකරණය } \frac{x}{10} + \frac{3y}{40} = 1 \quad (5) \quad \Rightarrow \quad 4x + 3y = 40$$

වෙනත් ක්‍රමයක්

$$C \text{ හා } C_2 \text{ වෘත්තවල පොදු ස්පර්ශකයේ සමීකරණය } (x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16) - (x^2 + y^2 - 64) = 0 \quad (10)$$

මගින් දෙනු ලැබේ.

$$\Rightarrow 8x + 6y - 80 = 0 \Rightarrow 4x + 3y = 40. \quad (5)$$

$$\text{එම නිසා } P \equiv (10, 0) \text{ හා } Q \equiv \left(0, \frac{40}{3}\right). \quad (5) \quad (5)$$

25

PQ රේඛා ඛණ්ඩය විෂ්කම්භයක් ලෙස ඇති වෘත්තය මත (x, y) ලක්ෂ්‍යයක් සපුරාලන අවශ්‍යතාව :

$$\left(\frac{y-0}{x-a}\right)\left(\frac{y-b}{x-0}\right) = -1 \quad (5)$$

හෝ

$$x(x-a) + y(y-b) = 0 \quad (5)$$

$$\text{i.e. } x^2 + y^2 - ax - by = 0$$

$$x^2 + y^2 - 10x - \frac{40}{3}y = 0 \quad (5)$$

හෝ

$$3(x^2 + y^2) - 30x - 40y = 0$$

40

17 වන ප්‍රශ්නය

17.(a) $\cos^2(\alpha + \beta) + \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta - 2 \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha \cos \beta = 1$ බව පෙන්වන්න.

(b) $f(x) = \cos 2x + \sin 2x + 2(\cos x + \sin x) + 1$ යැයි ගනිමු. $f(x)$ යන්න $k(1 + \cos x) \sin(x + \alpha)$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි k හා α යනු නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ.

$g(x)$ යන්න $\frac{f(x)}{1 + \cos x} = \sqrt{2} \{g(x) - 1\}$ වන ලෙස ගනිමු; මෙහි $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ වේ.

$y = g(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයේ දළ සටහනක් ඇඳ එහිදී, ඉහත දී ඇති පරාසය තුළ $f(x) = 0$ සමීකරණයට එක විසඳුමක් පමණක් ඇති බව පෙන්වන්න.

(c) සුපුරුදු අංකනයෙන්, ABC ත්‍රිකෝණයක් සඳහා සයින් නීතිය භාවිතයෙන්,

$$a(b-c) \operatorname{cosec} \frac{A}{2} \cot \frac{A}{2} = (b+c)^2 \tan \left(\frac{B-C}{2} \right) \sec \left(\frac{B-C}{2} \right) \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

(a) $\cos^2(\alpha + \beta) + \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta - 2 \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha \cos \beta = 1.$

$$= \cos(\alpha + \beta)[\cos(\alpha + \beta) - 2 \cos \alpha \cos \beta] + \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta \quad (5)$$

$$= -[\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta][\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta] + \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta \quad (5)$$

$$= -\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + (1 - \cos^2 \alpha)(1 - \cos^2 \beta) + \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta$$

$$= 1$$

30

(b) $f(x) = \cos 2x + \sin 2x + 2(\cos x + \sin x) + 1$

$$= 2\cos^2 x - 1 + 2 \sin x \cos x + 2 \cos x + 2 \sin x + 1 \quad (5)$$

$$= 2 \cos x (\cos x + 1) + 2 \sin x (\cos x + 1) \quad (5)$$


$$= 2\sqrt{2}(\cos x + 1) \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \quad (5)$$

$$(5) \quad k = 2\sqrt{2}, \quad \alpha = \frac{\pi}{4} \quad (5)$$

25

$$\frac{f(x)}{1 + \cos x} = 2\sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \{g(x) - 1\} \quad (5)$$

$$y = g(x) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + 1 \quad (5)$$



හැඩය (5)

අවම සහ උපරිම (5)

දෙකෙළවර (5)

$$x=0, y=\sqrt{2}+1 \quad (5)$$

$$y=1 \quad (5)$$

$f(x)=0 \Rightarrow g(x)=1$ (5) එක විසඳුමක් පමණක් පවතී. $\therefore f(x)=0$ ට එක විසඳුමක් පමණක් පවතී.
 $\Rightarrow x = -\frac{\pi}{4}$ (5)

45

(5)

(c) $A+B+C=\pi$ වන විට, සයින නීතිය, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ (5)

$$\frac{b-c}{b+c} = \frac{\sin B - \sin C}{\sin B + \sin C} \quad (5)$$

$$= \frac{2 \cos \frac{B+C}{2} \sin \frac{B-C}{2}}{2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2}} \quad (5)$$

$$= \frac{\tan\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\cot \frac{A}{2}} \quad (5)$$

$$\frac{a}{b+c} = \frac{\sin A}{\sin B + \sin C} = \frac{2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}}{2 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2}} \quad (5)$$

$$= \frac{\sin \frac{A}{2}}{\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)} \quad **$$

(*) හා (**) සමීකරණ ගුණ කිරීමෙන්,

$$\frac{a(b-c)}{(b+c)^2} = \frac{\tan\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\cot\frac{A}{2}} \cdot \frac{\sin\frac{A}{2}}{\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)} \quad (5)$$

$$a(b-c) \frac{\cot\frac{A}{2}}{\sin\frac{A}{2}} = (b+c)^2 \frac{\tan\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)} \quad (5)$$

$$a(b-c) \cot\frac{A}{2} \operatorname{cosec}\frac{A}{2} = (b+c)^2 \tan\left(\frac{B-C}{2}\right) \sec\left(\frac{B-C}{2}\right)$$

50

තවත් ක්‍රමයක්

$$\begin{aligned} & (5) \quad A + B + C = \pi \text{ වන විට, සයින් නීතිය} \quad (5) \quad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{a(b-c)}{(b+c)^2} &= \frac{\sin A (\sin B - \sin C)}{(\sin B + \sin C)^2} \quad (10) \\ &= \frac{\sin A \cdot 2 \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) \sin\left(\frac{B-C}{2}\right)}{4 \sin^2\left(\frac{B+C}{2}\right) \cos^2\left(\frac{B-C}{2}\right)} \quad (5) \end{aligned}$$

$$= \frac{\sin A \cdot \sin\frac{A}{2} \sin\left(\frac{B-C}{2}\right)}{2 \cos^2\frac{A}{2} \cos^2\left(\frac{B-C}{2}\right)} \quad (5) \quad (\because A + B + C = \pi)$$

$$= \frac{2 \sin^2\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{A}{2} \sin\left(\frac{B-C}{2}\right)}{2 \cos^2\frac{A}{2} \cos^2\left(\frac{B-C}{2}\right)}$$

$$= \frac{\sin\frac{A}{2} \tan\frac{A}{2} \cdot \tan\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)} \quad (5)$$

$$= \sin\frac{A}{2} \tan\frac{A}{2} \cdot \tan\left(\frac{B-C}{2}\right) \sec\left(\frac{B-C}{2}\right) \quad (5)$$

$$\Rightarrow a(b-c) \operatorname{cosec}\frac{A}{2} \cot\frac{A}{2} = (b+c)^2 \tan\left(\frac{B-C}{2}\right) \sec\left(\frac{B-C}{2}\right)$$


50

2.2.3. II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි ප්‍රශ්න සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිර්දේශ, නිගමන හා යෝජනා

(10) සංයුක්ත ගණිතය II - A කොටස

1 වන ප්‍රශ්නය

1. ස්කන්ධ පිළිවෙළින් m හා $2m$ වූ A හා B අංශු දෙකක්, අවල කුඩා සැහැල්ලු සුමට C කප්පියක් උඩින් යන $2l$ දිගකින් යුතු සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක දෙකෙළවරට සම්බන්ධ කර ඇත. එක් එක් අංශුව C ට l ගැඹුරකින් අල්ලා තබා පද්ධතිය මෙම පිහිටීමෙන් නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ. **ශක්ති සංස්ථිති මූලධර්මය යෙදීමෙන්**, එක් එක් අංශුව $x (< l)$ දුරක් චලනය වී ඇති විට එක් එක් අංශුවෙහි v වේගය, $v^2 = \frac{2gx}{3}$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න. **ඒනයින්**, හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ, පද්ධතියේ ත්වරණය සොයන්න.



$$\text{වා.ශ} + \text{වි.ශ} = \text{නියතයක් යෙදීමෙන්} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(2m)v^2 - mg(l-x) - 2mg(l+x) = \text{නියතයකි.}$$

$$= \text{ආරම්භක අගය} = 0 - 3mgl \quad (15)$$

$$\text{වෙනත් ක්‍රමයක් : ශක්ති සංස්ථිතියෙන්} \Rightarrow \frac{1}{2}mgx - mgx = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(2m)v^2 \quad (15)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 3mv^2 = (2mg - mg)x$$

$$v^2 = \frac{2gx}{3} \quad (5)$$

x විෂයයෙන් අවකලනයෙන් ;

$$2v \frac{dv}{dx} = \frac{2g}{3}$$

$$\text{පද්ධතියේ ත්වරණය} = \frac{g}{3} \quad (5)$$

වෙනත් ක්‍රමයක්

t විෂයයෙන් අවකලනයෙන්


$$2v \frac{dv}{dt} = \frac{2g}{3} \left(\frac{dx}{dt} \right)$$

$$\text{ත්වරණය} = \frac{dv}{dt} = \frac{g}{3} \quad (5)$$

25

2 වන ප්‍රශ්නය

2. දෙකෙළවර ම විවෘත, දිග l වූ සෘජු සිහින් සුමට OA නලයක්, O ඉහළ කෙළවර තිරස් පොළොවට $h(>l)$ උසක් ඉහළින් ඇති ව, යටි අත් සිරස සමග $\frac{\pi}{3}$ කෝණයක් සාදන පරිදි සවි කර ඇත. නලය ඇතුළත, O හි සිරුවෙන් තබනු ලැබූ අංශුවක් නලය දිගේ පහළට ලිස්සා යයි. ඊළඟට අංශුව A කෙළවරින් නලයෙන් ඉවත්ව ගොස්, O සිට $\sqrt{3}l$ තිරස් දුරකින් වූ B ලක්ෂ්‍යයක දී පොළොව සමග ගැටෙයි. (i) A හි දී අංශුවේ වේගය $\sqrt{gl}$ බව ද (ii) $h = \frac{3l}{2}$ බව ද පෙන්වන්න.



O සිට A දක්වා, අංශුවේ නියත ත්වරණය සහිත චලිතය සඳහා

$$\begin{aligned} v^2 &= u^2 + 2as \\ v^2 &= 2 \cdot g \cos \frac{\pi}{3} \cdot l \quad (5) \\ v^2 &= gl; \quad v = \sqrt{gl} \end{aligned}$$

A සිට B දක්වා චලිතය සඳහා,

$$\rightarrow s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$\sqrt{3}l - l \sin \frac{\pi}{3} = t \sqrt{gl} \sin \frac{\pi}{3} \quad (5)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}l \cdot \frac{1}{\sqrt{gl}} = \frac{\sqrt{3}}{2}t$$

$$t = \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (5)$$

$$\downarrow h' = \frac{1}{2} \sqrt{gl} \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} + \frac{1}{2}g \cdot \frac{l}{g} = l \quad (5)$$

$$\therefore h = l + l \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3l}{2} \quad (5)$$

25

3 වන ප්‍රශ්නය

3. සුමට තිරස් මේසයක් මත u ප්‍රවේගයෙන් චලනය වෙමින් පවතින ස්කන්ධය m වූ P අංශුවක්, P හි පෙතෙහි නිසලව තිබෙන m ස්කන්ධය සහිත වෙනත් Q අංශුවක් සමග සරල ලෙස ගැටෙයි. අංශු දෙක අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය e ($0 < e < 1$) නම්, ගැටුමෙන් පසු P හා Q හි ප්‍රවේගවල ඵෙක්කය හා අත්තරය සඳහා ප්‍රකාශන, u හා e ඇසුරෙන් ලබා ගන්න. **ඒකයිත්,** හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ, ගැටුමට පසු පද්ධතියේ ඉතිරි වන චාලක ශක්තිය, මුල් චාලක ශක්තියට දරන අනුපාතය, $(1+e^2):2$ බව පෙන්වන්න.

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ P \bigcirc \end{array} & \begin{array}{c} \bigcirc Q \end{array} & \text{ගැටුමට පෙර චාලක ශක්තිය} = T_0 = \frac{1}{2}mu^2 \\
 & \begin{array}{c} \xrightarrow{v} \xrightarrow{w} \\ P \bigcirc \bigcirc Q \end{array} & \text{ගැටුමට පසු චාලක ශක්තිය} = T_1 = \frac{1}{2}m(v^2 + w^2) \quad (5)
 \end{array}$$

ගම්‍යතා සංස්ථිතිය :

$$mu = mv + mw \dots\dots\dots (1)$$

$$u = v + w \quad (5)$$

නිව්ටන් ප්‍රත්‍යාගති නියමය :


$$eu = w - v \dots\dots\dots (2) \quad (5)$$

$$\begin{aligned}
 \text{චා. ශ. අනුපාතය} &= \frac{T_1}{T_0} = \frac{v^2 + w^2}{u^2} = \left[\frac{(v+w)^2 + (w-v)^2}{2u^2} \right] = \left(\frac{u^2 + e^2u^2}{2u^2} \right) \\
 &\quad (5) \qquad (5) \\
 &= \frac{1}{2}(1+e^2)
 \end{aligned}$$

25

4 වන ප්‍රශ්නය

4. එන්ජිම $H \text{ kW}$ ජවයකින් ක්‍රියා කරමින් ස්කන්ධය මෙට්‍රික් ටොන් M වූ ලොරියක්, සෘජු සමතලා පාරක් දිගේ $u \text{ m s}^{-1}$ නියත ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරයි. ඉන් පසුව, එන්ජිම $2H \text{ kW}$ ජවයකින් ක්‍රියා කරමින්, තිරසර α කෝණයක් ආනත වූ සෘජු පාරක් දිගේ ලොරිය ඉහළට චලනය වන අතර, චලිතයට ප්‍රතිරෝධය තිරස් චලිතයට ඇති ප්‍රතිරෝධය ම වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී ලොරියේ උපරිම වේගය $\frac{2Hu}{H + Mgu \sin \alpha} \text{ ms}^{-1}$ බව පෙන්වන්න.




ජවය = $H \text{ kW}$ බැවින්

$$\text{ප්‍රකර්ෂණ බලය } F = \frac{1000H}{u} \text{ N} \quad (5)$$

$$\longrightarrow F = ma$$

$$\frac{1000H}{u} - R = 0$$

$$R = \frac{1000H}{u} \text{ N} \quad (5)$$



$$F = ma$$

$$F' - R - Mg \sin \alpha = 0 \quad (5)$$

(5)

$$\frac{2000H}{v} = \frac{1000H}{u} + 1000Mg \sin \alpha$$


$$\frac{2H}{v} = \frac{H + Mgu \sin \alpha}{u} \quad (5)$$

$$v = \frac{2Hu}{H + Mgu \sin \alpha} \text{ ms}^{-1}$$

25

5 වන ප්‍රශ්නය

5. සුපුරුදු අංකනයෙන්, O මූලයක් අනුබද්ධයෙන් A හා B ලක්ෂ්‍ය දෙකක පිහිටුම් දෛශික පිළිවෙළින් $\lambda \underline{i} + \mu \underline{j}$ හා $\mu \underline{i} - \lambda \underline{j}$ වේ; මෙහි λ හා μ යනු $0 < \lambda < \mu$ වන පරිදි වූ තාත්ත්වික සංඛ්‍යා වේ. $\hat{A}OB$ සෘජු කෝණයක් බව පෙන්වන්න. AB රේඛා ඛණ්ඩයෙහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය C යැයි ගනිමු. $\overrightarrow{OC}$ දෛශිකයේ විශාලත්වය 2 නම් හා එය $\underline{i}$ ඒකක දෛශිකය සමග $\frac{\pi}{6}$ ක කෝණයක් සාදයි නම්, λ හා μ හි අගයන් සොයන්න.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} &= \lambda \underline{i} + \mu \underline{j} \\ \overrightarrow{OB} &= \mu \underline{i} - \lambda \underline{j} \\ \lambda, \mu &\in \mathbb{R}^+ \text{ සඳහා } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \lambda\mu - \mu\lambda = 0 \quad (5) \\ \Rightarrow \hat{A}OB &= \frac{\pi}{2} \\ \overrightarrow{OC} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \lambda \underline{i} + \mu \underline{j} + \overrightarrow{AC} \\ &= \lambda \underline{i} + \mu \underline{j} + \frac{1}{2} \{ (\mu \underline{i} - \lambda \underline{j}) - (\lambda \underline{i} + \mu \underline{j}) \} \\ &= \frac{1}{2} (\lambda + \mu) \underline{i} + \frac{1}{2} (\mu - \lambda) \underline{j} \quad (5)\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\overrightarrow{OC} \cdot \underline{i} &= 2 \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} = \frac{1}{2} (\lambda + \mu) \quad (5) \\ \overrightarrow{OC} \cdot \underline{j} &= 2 \sin \frac{\pi}{6} = 1 = \frac{1}{2} (\mu - \lambda) \quad (5)\end{aligned}$$

අඩු කිරීමෙන් සහ එකතු කිරීමෙන් $\Rightarrow$


$$\lambda = \sqrt{3} - 1, \quad \mu = \sqrt{3} + 1$$

(5)

25

6 වන ප්‍රශ්නය

6. ඒකාකාර සිහින් බර දණ්ඩක්, එහි එක කෙළවරක් රළු තිරස් ගෙබිමක් මත හා අනෙක් කෙළවර සුමට සිරස් බිත්තියකට එරෙහිව නිසලව තිබේ. දණ්ඩ බිත්තිය සමඟ θ සුළු කෝණයක් සාදමින්, බිත්තියට ලම්භ සිරස් තලයක පිහිටයි. මෙම පිහිටීමේ දී දණ්ඩ සමතුලිතව තිබීම සඳහා, දණ්ඩ හා ගෙබිම අතර μ සර්ඡණ සංගුණකය $\mu \geq \frac{1}{2} \tan \theta$ සපුරාලිය යුතු බව පෙන්වන්න.



විභේදනයෙන්

$$\begin{array}{l} \rightarrow F = S \quad (5) \\ \uparrow R = W \quad (5) \end{array}$$

A වටා ඝූර්ණය ගැනීමෙන් :

$$A \curvearrowright S \cdot 2a \cos \theta = W \cdot a \sin \theta \quad (5)$$

$$S = F \quad \text{නිසා} \quad F = \frac{1}{2} W \tan \theta \leq \mu R \quad (5)$$

$$\frac{1}{2} W \tan \theta \leq \mu W \Rightarrow \mu \geq \frac{1}{2} \tan \theta$$

(5)

25

7 වන ප්‍රශ්නය

7. A, B හා C යනු S නියැදි අවකාශයක ස්වායත්ත සිද්ධි තුනක් යැයි ගනිමු. සුපුරුදු අංකනයෙන්, $P(A \cup B \cup C)$ සම්භාවිතාව, $P(A), P(B)$ හා $P(C)$ සම්භාවිතා ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කරන්න.

$P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ හා $P(A \cup B \cup C) = \frac{3}{4}$ බව තවදුරටත් දී ඇති විට, $P(C)$ සම්භාවිතාව සොයන්න.

දෙනලද සම්භාවිතා : $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ and $P(A \cup B \cup C) = \frac{3}{4}$

A, B හා C ස්වායත්ත සිද්ධි බැවින්,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A) \cdot P(B) - P(B) \cdot P(C) - P(C) \cdot P(A) + P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

(10)

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + P(C) - \frac{1}{8} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \cdot P(C) + \frac{1}{8} \cdot P(C) \quad (5)$$

$$\frac{1}{8} = P(C) \left[1 + \frac{1}{8} - \frac{3}{4} \right] = P(C) \cdot \left[\frac{3}{8} \right] \quad (5) \quad \therefore P(C) = \frac{1}{3} \quad (5)$$

25

8 වන ප්‍රශ්නය

8. සර්වසම පෙනුමැති විදුලි බල්බ 7 ක් පෙට්ටියක අඩංගු වේ. මෙම බල්බවලින් 2 ක් දෝෂ සහිත බවත්, ඉතිරිය පාවිච්චි කළ හැකි බවත් දැනගෙන ඇත. දෝෂ සහිත බල්බ 2 ම හඳුනා ගන්නා තුරු එකකට පසුව අනෙක වශයෙන් බල්බ පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.


(i) බල්බ දෙකක් පමණක්,

(ii) බල්බ තුනක් පමණක්

පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු දෝෂ සහිත බල්බ දෙක ම හඳුනා ගැනීමට හැකිවීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

විදුලි බල්බ 7 ක් අතුරෙන් 2 ක් දෝෂ සහිත වන අතර 5 ක් පාවිච්චි කළ හැකි වේ.

$D =$ දෝෂ සහිත වීම, $U(=D') =$ පාවිච්චි කළ හැකි වීම



$$P(D_1) = \frac{2}{7} \quad (5)$$

$$P(D_1 D_2) = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{21} \quad (5)$$

$$P(D_1 U_2 D_2) = \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{21} \quad (5)$$

$$P(U_1 D_1 D_2) = \frac{5}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{21} \quad (5)$$

පරීක්ෂාව ; 1 වැනි 2 වැනි 3 වැනි

$$\text{පරීක්ෂා දෙකක් පමණක් සෑහීමේ සම්භාවිතාව} = P(D_1 D_2) = \frac{1}{21}$$

$$\text{පරීක්ෂා තුනක් පමණක් සෑහීමේ සම්භාවිතාව} = P(D_1 U_2 D_2) + P(U_1 D_1 D_2) = \frac{1}{21} + \frac{1}{21} = \frac{2}{21}$$

(5)

50

9 වන ප්‍රශ්නය

9. පූර්ණ සංඛ්‍යා හතක S කුලකයක සංඛ්‍යා පහත දැක්වෙන අයුරු ආරෝහණ පටිපාටියට සකසා ඇත.

$$S = \{1, 2, 4, x, y, 11, 13\}.$$

සංඛ්‍යාවල මධ්‍යන්‍යය y නම්, x හා y හි අගයන් නිර්ණය කරන්න. සංඛ්‍යාවල විචලතාව $\frac{120}{7}$ බව පෙන්වන්න.

ආරෝහණ පිළිවෙලට ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා හත : 1 2 4 x y 11 13

$$\text{මධ්‍යන්‍යය} = y \Rightarrow 1+2+4+x+y+11+13=7y$$

$$\Rightarrow 6y - x = 31 \quad (5)$$

$$x = 4 \text{ යැයි සිතමු.} : 6y - 4 = 31$$

$$6y = 35. \quad (5) \quad y \text{ සඳහා ධන පූර්ණ විසඳුමක් නොමැත.}$$

$$x = 5 : \text{යැයි සිතමු} : 6y - 5 = 31$$

$$y = 6 \quad (5)$$

වෙනත් ක්‍රමයක්

$$\because 4 \leq x \leq 11 \text{ බැවින්}$$

$$35 \leq 6y \leq 42$$

තිබිය හැකි නිඛිල y :

$$y = 6 \quad \text{හෝ}$$

$$\Rightarrow x = 5 \quad (5)$$

$$y = 7$$

$$\Rightarrow x = 11 \quad (5)$$

($x < y$ නිසා විසංවාදයකි)

$$\text{විසඳුම} : x = 5, \quad y = 6 = \mu$$

$$\text{විචලතාව} : S^2 = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 (x_i - \mu)^2 \quad (5)$$

$$= \frac{1}{7} [(-5)^2 + (-4)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 0 + 5^2 + 7^2] \quad (5)$$

$$= \frac{1}{7} (25 + 16 + 4 + 1 + 25 + 49) = \frac{120}{7}$$

25

10 වන ප්‍රශ්නය

10. මුහුණත් 1, 2, 3, 4, 5, 6 ලෙස සලකුණු කරන ලද දාදු කැටයක් 50 වරක් උඩ දැමූ විට දාදු කැටයේ උඩත් මුහුණතේ දක්නට ලැබුණු අංකවල සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය පහත දැක්වේ:

අංකය	1	2	3	4	5	6
සංඛ්‍යාතය	α	9	γ	11	8	7

සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියෙහි මධ්‍යන්‍යය 3.66 බව දී ඇත්නම්, α හා γ හි අගයන් නිර්ණය කර, මාතය හා මධ්‍යස්ථය සොයන්න.

Number x	1	2	3	4	5	6
Frequency f	α	9	γ	11	8	7

$$\sum f =: 50 = \alpha + \gamma + 35 \Rightarrow \alpha + \gamma = 15 \quad (5)$$

$$\text{තවද, මධ්‍යන්‍යය} = 3.66 \Rightarrow 50 \times 3.66 = 183 = 1 \cdot \alpha + 2 \cdot 9 + 3 \cdot \gamma + 4 \cdot 11 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 7$$

$$= \alpha + 3\gamma + 144 \Rightarrow \alpha + 3\gamma = 39 \quad (5)$$

$$\text{විසඳීමෙන් : } \gamma = 12 \text{ සහ } \alpha = 3 \quad (5)$$

$$\text{මාතය} = 3 \quad (5) \quad \text{මධ්‍යස්ථය} = 4$$

25

11 වන ප්‍රශ්නය

11. (a) P හා Q අංශු දෙකක් අවල තිරස් ගෙබිමක් මත ලක්ෂ්‍ය දෙකක සිට පිළිවෙළින් u හා $\frac{u}{\sqrt{2}}$ වේගවලින් සිරස් ව ඉහළට, එක විට ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. ගෙබිම සිට $\frac{u^2}{4g}$ උසකින් අවල සුමට තිරස් සිවිලිමක් ඇත. සිවිලිමත් එය සමග ගැටෙන P අංශුවත් අතර ප්‍රත්‍යාගතී සංගුණකය $\frac{1}{\sqrt{2}}$ වන අතර, අංශු දෙක ගුරුත්වය යටතේ පමණක් ඉහළට හා පහළට චලනය වේ.

(i) P අංශුව සිවිලිම සමග ගැටීමට මොහොතකට පෙර එහි වේගයත්, ගැටීම සිදු වන මොහොත දක්වා ගත වූ T_1 කාලයත් සොයන්න.

P අංශුව එහි ප්‍රක්ෂේප ලක්ෂ්‍යය කරා $\frac{u\sqrt{3}}{2}$ වේගයෙන් ආපසු පැමිණෙන බව පෙන්වන්න.


(ii) Q අංශුව, සිවිලිමට යන්නමින් ළඟා වන බව පෙන්වා, එම මොහොත දක්වා ගත වූ T_2 කාලය සොයන්න.

(iii) P හා Q අංශු දෙකෙහි ප්‍රක්ෂේප මොහොතේ සිට ආපසු අදාළ ප්‍රක්ෂේප ලක්ෂ්‍ය වෙතට පැමිණීම දක්වා, ඒවායේ චලිත සඳහා ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්තාරවල දළ සටහන්, එක ම රූපයක අඳින්න.

(iv) ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්තාර භාවිතයෙන්, P අංශුව සිවිලිම සමග ගැටෙන මොහොතේ දී Q අංශුව, සිවිලිමට $\frac{u^2}{2g}(\sqrt{2} - 1)^2$ සිරස් දුරක් පහළින් තිබෙන බව පෙන්වන්න.

(b) S නැවක්, u ඒකාකාර වේගයෙන් උතුරු දිශාවට යාත්‍රා කරයි. එහි සරල රේඛීය පෙත P වරායක සිට නැගෙනහිර පැත්තට p ලම්භ දුරකින් පිහිටා ඇත. එක්තරා මොහොතක දී, $\overline{PS}$ හි දිශාව නැගෙනහිරින් දකුණට 45° කෝණයක් සාදන විට දී ම, S නැව හමු වීම සඳහා B_1 හා B_2 සැපයුම් බෝට්ටු දෙකක් P වරායේ සිට වෙනස් දිශා දෙකකට $v\left(\frac{u}{\sqrt{2}} < v < u\right)$ ඒකාකාර වේගයෙන් එක විට ගමන් අරඹයි. මෙම බෝට්ටු පිළිවෙළින් T_1 හා $T_2 (> T_1)$ කාලවල දී S නැවට ළඟා වේ. $\frac{v}{u} = \sqrt{\frac{2}{3}}$ බව තවදුරටත් දී ඇත්නම්, S නැවට සාපේක්ෂ ව B_1 හා B_2 බෝට්ටුවල චලිත සඳහා සාපේක්ෂ ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණ දෙකෙහි දළ සටහන් එක ම රූපයක ඇඳ, P වරායේ සිට S නැව වෙත ගමන් කිරීමේ දී B_1 හා B_2 බෝට්ටුවල නියම චලිත දිශා සොයන්න.

තවදුරටත්, $T_2 - T_1 = \frac{2\sqrt{3}p}{u}$ බව පෙන්වන්න.



(i) P අංශුව

$$v^2 = u^2 - 2g \cdot \frac{u^2}{4g} = \frac{u^2}{2} \quad (5)$$

සිවිලිම සමග ගැටුමට පෙර P හි ප්‍රවේගය, $v = \frac{u}{\sqrt{2}} \uparrow \quad (5)$

කාලය T_1 දෙනු ලබන්නේ $\frac{u}{\sqrt{2}} = u - gT_1 \quad (5) \Rightarrow T_1 = \frac{u}{g} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad (15)$

සිවිලිම සමග ගැටුමට මොහොතකට පසු එහි ප්‍රවේගය $= ev = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{u}{\sqrt{2}} = \frac{u}{2} \downarrow \quad (5)$

ප්‍රක්ෂේපණ ලක්ෂ්‍යයට ආපසු පැමිණෙන විට P හි w ප්‍රවේගය

$$w^2 = \left(\frac{u}{2}\right)^2 + 2g \left(\frac{u^2}{4g}\right) \Rightarrow w = \frac{u\sqrt{3}}{2} \quad (5) \quad (10)$$

(ii) Q අංශුව


$$v_1^2 = \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2g \left(\frac{u^2}{4g}\right) = 0; \quad (5) \quad Q \text{ අංශුව, ශුන්‍ය ප්‍රවේගයකින් සිවිලිමට ළඟා වෙයි.}$$

සිවිලිමට ළඟා වීමට ගත කරන කාලය T_2 දෙනු ලබන්නේ $0 = \frac{u}{\sqrt{2}} - gT_2 \Rightarrow T_2 = \frac{u}{\sqrt{2}g} \quad (5) \quad (10)$

ආපසු (පහළට) චලිතයේදී, Q අංශුව ප්‍රක්ෂේපණ ලක්ෂ්‍යයට ළඟාවීමේ ප්‍රවේගය $= \frac{u}{\sqrt{2}} \downarrow \quad (5)$

ගත වූ කාලය $2T_2 = \frac{u}{g} \sqrt{2}$

(iii)



30

(iv) කාලය T_1 වන විට Q අංශුව සිව්ලිමට පහළින් පිහිටන දුර

= රූපසටහනෙහි අඳුරු පෙදෙසේ වර්ගඵලය

$$= \left(u - \frac{u}{\sqrt{2}}\right) T_1 \quad (5)$$




$$= \frac{u}{\sqrt{2}} (\sqrt{2} - 1) \times \frac{u}{\sqrt{2}g} (\sqrt{2} - 1) \quad (5)$$

$$= \frac{u^2}{2g} (\sqrt{2} - 1)^2$$

10

(b) වරාය P , නැව S , බෝට්ටුව B

$$\text{ප්‍රවේ (B, S)} = \text{ප්‍රවේ (B, P)} + \text{ප්‍රවේ (P, S)} \quad (5)$$



ප්‍රවේ (B, P) සඳහා දිශා දෙකක් තිබිය හැකි අතර ඒවා එක එකක් සාපේක්ෂ පෙත සමඟ θ කෝණයක් සාදයි.

$$\frac{v}{u} = \sqrt{\frac{2}{3}} \text{ බව දී ඇත.}$$

PQR_1 හෝ PQR_2 ත්‍රිකෝණයෙන්,

$$\frac{v}{\sin 45^\circ} = \frac{u}{\sin \theta} \Rightarrow \sin \theta = \left(\frac{u}{v}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ \quad (5)$$

(5)

$$\therefore \phi = 15^\circ$$

වරායට (පොළොවට) සාපේක්ෂව,

(i) B_1 හි ප්‍රවේගය, නැගෙනහිරෙන් උතුරට 15° කෝණයක් සාදයි. (5)

(ii) B_2 හි ප්‍රවේගය, උතුරෙන් නැගෙනහිරට 15° කෝණයක් සාදයි. (5)

60

$$T_2 - T_1 = \sqrt{2} p \left(\frac{1}{PR_2} - \frac{1}{PR_1} \right) = \frac{\sqrt{2} p}{PR_1 \cdot PR_2} (PR_1 - PR_2)$$


(5)

$$= \frac{\sqrt{2} p v}{\left(\frac{u}{\sqrt{2}} + \frac{v}{2} \right) \left(\frac{u}{\sqrt{2}} - \frac{v}{2} \right)} = \frac{\sqrt{2} p v}{\left(\frac{u^2}{2} - \frac{v^2}{4} \right)} = \frac{\sqrt{2} p \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} u}{\frac{u^2}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right)} = \frac{2\sqrt{3} p}{u}$$

(5) (5)

15

- 12.(a) දී ඇති රූපයේ, ABC ත්‍රිකෝණය, ස්කන්ධය M වූ ඒකාකාර සුමට කුඤ්ඤයක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඔස්සේ යන සිරස් හරස්කඩක් නිරූපණය කරයි. කුඤ්ඤය තුළ BC ට සමාන්තර වූ DE සිහින් සුමට පිල්ලක් ඇත. AB හා AC රේඛා, අදාළ මුහුණත්වල උපරිම බෑවුම් රේඛා වන අතර $\angle ABC = \alpha$ හා $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ වේ.




BC අඩංගු මුහුණත අවල සුමට තිරස් මේසයක් මත සිටින පරිදි කුඤ්ඤය තබා ඇත. එක එකක ස්කන්ධය

m වූ P හා Q අංශු දෙකක් පිළිවෙළින් DE හා DB මත තබා ඒවා, D ලක්ෂ්‍යයෙහි පිහිටි කුඩා සුමට සැහැල්ලු කප්පියක් උඩින් යන සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවකින් ඇඳා ඇත. ස්කන්ධය $\frac{m}{2}$ වූ S අංශුවක් AC මත ලක්ෂ්‍යයක තබා P හා Q සම්බන්ධ කෙරෙන තන්තුව ඇඳී තිබිය දී, පද්ධතිය මෙම පිහිටීමෙන් නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ.

P අංශුවට ED දිගේ ද Q අංශුවට DB දිගේ ද S අංශුවට AC දිගේ ද චලිත සමීකරණ ලියා දක්වන්න. තවදුරටත්, මුළු පද්ධතියට ම BC දිගේ චලිත සමීකරණය ලියන්න. **ඒනයින්,** කුඤ්ඤයේ ත්වරණය $\vec{BC}$ හි දිශාවට $\frac{mg \sin \alpha}{2M + 3m - 2m \cos \alpha}$ බව පෙන්වන්න.

- (b) $ABCD$ සිහින් සුමට තලයක් පහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට නවා ඇත. තලයේ AB කොටස සෘජු වේ. BCD කොටසට අරය a හා කේන්ද්‍රය O වූ අර්ධ වෘත්තාකාර හැඩයක් ඇති අතර BD විෂ්කම්භය AB ට ලම්භ වේ. AB තිරස් ව හා ඉහළින් ම ඇතිව තලය සිරස් තලයක සවිකර ඇත. තලය ඇතුළත, ස්කන්ධය m වූ P අංශුවක් හා ස්කන්ධය $3m$ වූ Q අංශුවක් $l \left(> \frac{\pi a}{2} \right)$ දිගැති සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවකින් සම්බන්ධ කර ඇත. ආරම්භයේ දී, තන්තුව ඇඳී AB දිගේ තිබෙන අතර Q අංශුව B ලක්ෂ්‍යයේ තබා ඇත. Q අංශුව මෙම පිහිටීමේ සිට යන්ත්‍රමයින් විස්ථාපනය කරනු ලැබීමෙන් t කාලයක දී OQ අරය θ සුළු කෝණයකින් හැරේ.




ශක්ති සංස්ථිති මූලධර්මය යෙදීමෙන්, $\left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = \frac{3g}{2a} (1 - \cos \theta)$ බව පෙන්වන්න.

ඒනයින්, හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ, P අංශුවේ ත්වරණය $\frac{3g}{4} \sin \theta$ බව පෙන්වන්න.

t කාලයේ දී Q අංශුව මත තලයෙන් ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව හා තන්තුවේ ආතතිය සොයන්න.

(a)




නිව්ටන් දෙවැනි නියමය යෙදීමෙන් :

P අංශුවට, ED දිගේ : $\leftarrow$

$$T = m(f_1 - F) \dots \dots \dots (1)$$


(10)

Q අංශුවට, DB දිගේ :



$$mg \sin \alpha - T = m(f_1 - F \cos \alpha) \dots \dots \dots (2) \quad (10)$$

S අංශුවට, AC දිගේ :



$$\frac{m}{2} g \cos \alpha = \frac{m}{2} (f_2 + F \sin \alpha) \dots \dots \dots (3) \quad (10)$$

පද්ධතියට, BC දිගේ : $\longrightarrow$

$$0 = MF + m(F - f_1) + m(F - f_1 \cos \alpha) + \frac{m}{2} (F + f_2 \sin \alpha) \dots \dots \dots (4) \quad (15) \quad \boxed{55}$$

$\frac{(1) + (2)}{m}$:

$$g \sin \alpha = 2f_1 - F(1 + \cos \alpha)$$

$$\Rightarrow f_1 = \frac{g \sin \alpha + F(1 + \cos \alpha)}{2} \quad (5)$$

(3) න්,

$$f_2 = g \cos \alpha - F \sin \alpha \quad (5)$$


(4) $\Rightarrow 0 = F \left\{ M + \frac{5m}{2} \right\} - m f_1 (1 + \cos \alpha) + \frac{m}{2} f_2 \sin \alpha$

$$0 = \frac{F}{2} (2M + 5m) - \frac{m}{2} (1 + \cos \alpha) \{ g \sin \alpha + F(1 + \cos \alpha) \} + \frac{m}{2} \sin \alpha (g \cos \alpha - F \sin \alpha) \quad (10)$$

$$mg \sin \alpha = F \{ 2M + 5m - m(1 + \cos \alpha)^2 - m \sin^2 \alpha \}$$

$$= F \{ 2M + 3m - 2m \cos \alpha \} \quad (5)$$

$$\Rightarrow F = \frac{mg \sin \alpha}{2m + 3m - 2m \cos \alpha} \quad \boxed{25}$$



(b) චා. ශ. + වි. ශ. = නියතය යෙදීමෙන් :

$$\frac{1}{2} m (a \dot{\theta})^2 + \frac{3m}{2} (a \dot{\theta})^2 - 3mga(1 - \cos \theta) = 0 \quad (5)$$

$$\frac{1}{2} m (a \dot{\theta})^2 + \frac{3m}{2} (a \dot{\theta})^2 - 3mga(1 - \cos \theta) = 0 \quad (10)$$

$$\dot{\theta}^2 = \frac{3g}{2a} (1 - \cos \theta) \quad (5) \quad \boxed{35}$$

$$\theta \text{ විෂයයෙන් අවකලනයෙන්} \quad 2\dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} = \frac{3g}{2a} \sin\theta \quad (5)$$

$$\Rightarrow a\ddot{\theta} = \frac{3g}{4} \sin\theta$$

$$\therefore P \text{ අංශුවේ ත්වරණය} = a\ddot{\theta} = \frac{3g}{4} \sin\theta \rightarrow (5)$$

10

P හා Q අංශු සඳහා නිව්ටන් දෙවැනි නියමය යෙදීමෙන් :


PB දිගේ P අංශුවට $\rightarrow$

$$T = ma\ddot{\theta} \quad (5)$$

$$\Rightarrow T = m \frac{3g}{4} \sin\theta. \quad (5)$$

= තන්තුවේ ආතතිය

QO දිගේ Q අංශුවට



$$3mg \cos\theta - R = 3ma\ddot{\theta} \quad (5)$$

$$R = 3mg \cos\theta - 3ma \frac{3g}{2a} (1 - \cos\theta) \quad (5)$$

$$= 3mg \cos\theta - \frac{9mg}{2} + \frac{9mg}{2} \cos\theta$$

$$= \frac{3mg}{2} (5\cos\theta - 3) \quad (5)$$

25

13 වන ප්‍රශ්නය

13. ස්වාභාවික දිග a හා ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය $2mg$ වූ සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක එක කෙළවරක් අවල A ලක්ෂ්‍යයකට ගැට ගසා ඇත. A හි මට්ටමට ඉහළින් සවිකරන ලද B කුඩා සුමට නාදැත්තක් උඩින් තන්තුව යන අතර, තන්තුවේ අනෙක් කෙළවරට ස්කන්ධය m වූ P අංශුවක් සම්බන්ධ කර ඇත. AB දුර a වන අතර, BA යටි අත් සිරස සමග සාදන කෝණය $\frac{\pi}{3}$ වේ. ආරම්භයේ දී P අංශුව B නාදැත්තට යන්ත්‍රමත් පහළින් තබා සිරස් ව පහළට $u = \sqrt{\frac{5ga}{8}}$ වේගයෙන් ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. කාලය t වන විට තන්තුවේ විතතිය x යැයි ගනිමු. P අංශුවෙහි සරල අනුවර්ති චලිතය සඳහා සමීකරණය $\ddot{X} + \omega^2 X = 0$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කළ හැකි බව පෙන්වන්න; මෙහි $X = x - \frac{a}{2}$ හා $\omega^2 = \frac{2g}{a}$ වේ. මෙම චලිත සමීකරණය සඳහා, $\dot{X}^2 = \omega^2 (A^2 - X^2)$ ආකාරයේ විසඳුමක් උපකල්පනය කරමින්, සරල අනුවර්ති චලිතයේ විස්තාරය $A = \frac{3a}{4}$ බව පෙන්වා, අංශුව ළඟා වන පහත් ම පිහිටීම වූ E ලක්ෂ්‍යය සොයන්න.

සරල අනුවර්ති චලිතයේ C කේන්ද්‍රය පසු කර අංශුව යන විට එහි වේගය $\frac{3u}{\sqrt{5}}$ බව පෙන්වන්න.


අනුරූප වෘත්ත චලිතය සැලකීමෙන්, හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ, P අංශුව පහළට චලනය වීමේ දී C පසු කර යෑමට ගන්නා කාලය $\sqrt{\frac{a}{2g}} \left\{ \frac{\pi}{2} - \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \right\}$ බව පෙන්වන්න.

තවදුරටත්, P අංශුව එහි පහත් ම පිහිටීම වූ E වෙත ළඟා වීමට ගන්නා කාලයත්, නාදැත්ත මත තන්තුවෙන් ඇති කරන ලබන බලයේ උපරිම විශාලත්වයත් සොයන්න.

P අංශුවට $F = ma$ යොදමු.

$$\downarrow mg - T = m\ddot{x} \quad (5)$$

$$T = 2mg \left(\frac{x}{a} \right), \because \text{ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය} = 2mg \quad (5)$$



T ඉවත් කිරීමෙන් හා m වලින් බෙදීමෙන්

$$g = \ddot{x} + \frac{2g}{a}x \quad (5) \quad \text{හෝ} \quad \ddot{x} + \frac{2g}{a} \left(x - \frac{a}{2} \right) = 0 \quad (5)$$

$$\ddot{X} + \omega^2 X = 0, \quad \text{මෙහි } X = x - \frac{a}{2} \quad \text{හා} \quad \omega^2 = \frac{2g}{a} \quad \text{වේ.} \quad (5)$$

25

සරල අනුවර්ති චලිතයේ (SHM) C කේන්ද්‍රය : $X = 0 \Rightarrow x = \frac{a}{2} = BC$ (5)

SHM සමීකරණයේ උපකල්පිත විසඳුම, $\dot{X}^2 = \omega^2 (A^2 - X^2)$,

මෙහි A යනු චලිතයේ විස්තාරය වේ.

$$\text{ආරම්භයේදී } x = 0 \quad \text{වන විට} \quad X = -\frac{a}{2} \quad \text{හා} \quad \dot{x} = \dot{X} = \sqrt{\frac{5ga}{8}} = u \quad \text{වේ.} \quad (5) \quad (5)$$

දී ඇති ආකාරයේ විසඳුමට ආදේශයෙන්

$$A \text{ ධන නිසා, } \frac{5ga}{8} = \frac{2g}{a} \left[A^2 - \left(-\frac{a}{2} \right)^2 \right] \quad (5)$$

$$\frac{5a^2}{16} + \frac{a^2}{4} = A^2 = \frac{9a^2}{16}$$

$$, A = \frac{3a}{4}. \quad (5)$$

$$\text{එනම්, විස්තරය} = \frac{3a}{4} \quad (5)$$

$$\text{තත්ත්වේ උපරිම විතරිය} \Rightarrow \dot{X} = 0 \Rightarrow X = A \text{ එනම් } x - \frac{a}{2} = \frac{3a}{4} \Rightarrow x = \frac{5a}{4}. \quad (5)$$

35

$$\dot{X}^2 = \omega^2 (A^2 - X^2), \text{ මෙහි } A = \frac{3a}{4}$$

කේන්ද්‍රය ($X = 0$) පසුකර යනවිට අංශුවේ වේගය V ,

$$V^2 = \omega^2 A^2 = \frac{2g}{a} \cdot \frac{9a^2}{16} \Rightarrow V = 3\sqrt{\frac{ga}{8}} \quad (5)$$

$$\text{තවද, } u^2 = \frac{5ga}{8}.$$

$$\therefore \left(\frac{V}{u} \right)^2 = \frac{9ga}{8} \cdot \frac{8}{5ga} \quad (5)$$

$$\Rightarrow V = \frac{3u}{\sqrt{5}}. \quad (5)$$

20

α යනු, $\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$ වූ සුළු කෝණය ලෙස ගනිමු. (5)

C කේන්ද්‍රය පසුකර යෑමට අංශුව ගත කරන කාලය t_0 ,

$$\omega t_0 = \frac{\pi}{2} - \alpha \Rightarrow t_0 = \frac{1}{\omega} \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \text{ මගින් දෙනු ලැබේ.}$$


(5)

(5)

$$\text{එනම් } t_0 = \sqrt{\frac{a}{2g}} \left\{ \frac{\pi}{2} - \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \right\} \quad (5)$$

රූප සටහනට : (15)

35



පහතම පිහිටීමට ළඟා වීමට අංශුව ගන්නා කාලය t_1 ,

$$\omega t_1 = \pi - \alpha \Rightarrow t_1 = \frac{1}{\omega}(\pi - \alpha) \text{ මගින් දෙනු ලැබේ.}$$

(5)

(5)

$$\text{එනම් } t_1 = \sqrt{\frac{a}{2g}} \left\{ \pi - \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \right\} \quad (5)$$

15

$$\text{උපරිම විතනිය} = \frac{a}{2} + A = \frac{5a}{4}.$$

රූප සටහනට (5)


$$\text{උපරිම ආතතිය, } T_{\max} = (2mg) \left(\frac{5a/4}{a} \right) = \frac{5mg}{2} \quad (5)$$

(5)

$$\text{නාඳුන්න මත බලයෙහි උපරිම විශාලත්වය} = 2T_{\max} \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) = T_{\max} \sqrt{3} = \sqrt{3} \frac{(5mg)}{2}.$$

(5)

20



වෙනත් ක්‍රමයක්

$$X = x - \frac{a}{2} = \alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t \text{ ..(i) මෙහි } \omega^2 = \frac{2g}{a}, \text{ ආකාරයේ විසඳුමක් උපකල්පනය කරමු.}$$

$$\text{අවකලනයෙන් } \dot{X} = \dot{x} = -\alpha \omega \sin \omega t + \beta \omega \cos \omega t, \dots\dots\dots \text{(ii)}$$

$$\text{ආරම්භයේදී (} t = 0 \text{ වන විට), } x = 0 \Rightarrow \dot{x} = u = \sqrt{\frac{5ga}{8}} \text{ වේ.}$$

$$\Rightarrow -\frac{a}{2} = \alpha \text{ හා } u = \beta \omega, \quad \text{එනම් } \beta = \frac{u}{\omega}$$

$$\text{විසඳුම : } x = \frac{a}{2}(1 - \cos \omega t) + \frac{u}{\omega} \sin \omega t,$$

$$\Rightarrow \dot{x} = \frac{a\omega}{2} \sin \omega t + u \cos \omega t.$$

30

සරල අනුවර්තීය චලිතයෙහි කේන්ද්‍රය $X = 0$; එනම් $x = \frac{a}{2}$. (5)

අංශුව C කේන්ද්‍රය පසු කර යන කාලය t_0


$$0 = -\frac{a}{2} \cos \omega t_0 + \frac{u}{\omega} \sin \omega t_0 \text{ මගින් දෙනු ලැබේ. (5)}$$

$$\text{එනම් } \tan \omega t_0 = \frac{a\omega}{2u} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \text{ (5) } \left[\because \left(\frac{a\omega}{2u} \right)^2 = \frac{2ga}{5ga/2} \text{ (5)} \right]$$

$$\text{සුළු කෝණය } \phi = \tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right) = \frac{\pi}{2} - \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \text{ ලෙස ගනිමු. (5)}$$

$$\text{එවිට } t_0 = \sqrt{\frac{a}{2g}} \left\{ \frac{\pi}{2} - \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \right\}$$

25



අංශුව C පසු කර යන විට V වේගය :

$$V = \frac{a\omega}{2} \sin \omega t_0 + u \cos \omega t_0 = u [\tan \omega t_0 \cdot \sin \omega t_0 + \cos \omega t_0] \text{ (5)}$$

$$= u \sec \omega t_0 = \frac{3u}{\sqrt{5}} \text{ (5)}$$

15

B නාදැත්ත සිට පහතම E පිහිටීම දක්වා ගත වන කාලය

$$t_1 = \text{B සිට C දක්වා කාලය} + \text{C සිට E දක්වා කාලය} \text{ (5)}$$

$$t_1 = t_0 + \frac{1}{\omega} \cdot \frac{\pi}{2} \text{ (5)}$$

$$t_1 = \sqrt{\frac{a}{2g}} \left\{ \pi - \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \right\} \text{ (5)}$$

15

$t = t_1$ වන විට ලැබෙන උපරිම විතතිය x_1 :

$$x_1 = \frac{a}{2} (1 - \cos \omega t_1) + \frac{u}{\omega} \sin \omega t_1 = \frac{a}{2} \left(1 + \frac{2}{3} \right) + \frac{a\sqrt{5}}{4} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{5a}{4}. \text{ (5) (5) (5)}$$

$$\text{සරල අනුවර්තී චලිතයෙහි විස්තාරය} = \frac{5a}{4} - \frac{a}{2} = \frac{3a}{4} \text{ (5)}$$

20


14. xy -තලයේ O මූලය අනුබද්ධයෙන් A, B හා C ලක්ෂ්‍යවල පිහිටුම් දෛශික, සුපුරුදු අංකනයෙන්, පිළිවෙළින් $\underline{i} + \underline{j}, 2\underline{i} + 3\underline{j}$ හා $4\underline{i} + 2\underline{j}$ වේ. $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3} \overrightarrow{BC}$ වන පරිදි BC මත පිහිටි P ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටුම් දෛශිකය සොයන්න. $ABCD$ ත්‍රිපිසියමක D ශීර්ෂය ගනු ලබන්නේ BC පාදය AD ට සමාන්තර වන පරිදි ද PD, AC ට ලම්භ වන පරිදි ද වේ. D හි පිහිටුම් දෛශිකය $\frac{11}{3}\underline{i} - \frac{1}{3}\underline{j}$ බව පෙන්වන්න.

දුර මීටරවලින් ද බලය නිව්ටනවලින් ද මනින ලද, xy -තලයෙහි බල හතරකින් සමන්විත වන පද්ධතියක් පහත දැක්වෙන පරිදි දී ඇත.

ක්‍රියා ලක්ෂ්‍යයෙහි බන්ධාංක	බලයේ Ox, Oy දිශාවලට සංරචක
$B(2, 3)$	$\underline{F}_1 = (2, 4)$
$C(4, 2)$	$\underline{F}_2 = (3, 1)$
$L(0, 1)$	$\underline{F}_3 = (6, 12)$
$M(0, 6)$	$\underline{F}_4 = (9, 3)$

- (i) $\underline{F}_1$ හා $\underline{F}_2$ බල දෙකෙහි O මූලය හා $A(1, 1)$ ලක්ෂ්‍යය වටා සූර්ණ ශුන්‍ය වන බව පෙන්වා, ඒවායින් $\underline{F}_1, \underline{F}_2, \underline{F}_3$ හා $\underline{F}_4$ බල හතරෙන් සමන්විත පද්ධතියෙහි O මූලය වටා G සූර්ණය දක්ෂිණාවර්ත අතර 60 N m විශාලත්වයෙන් යුතු වන බව පෙන්වන්න.
- (ii) පද්ධතියෙහි $\underline{R}$ සම්ප්‍රසුක්තයේ (X, Y) සංරචක සොයන්න. ඒවායින්, $\underline{R}$ හි ක්‍රියා රේඛාවට y -අක්ෂය හමු වන ලක්ෂ්‍යය සොයන්න.
- (iii) බල පද්ධතිය $(0, -4)$ ලක්ෂ්‍යයෙහි ක්‍රියා කරන තනි බලයකින් හා සූර්ණය G_1 වූ යුග්මයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ලැබේ. G_1 හි අගය සොයා, තනි බලයේ ක්‍රියා රේඛාව $D\left(\frac{11}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ ලක්ෂ්‍යය ඔස්සේ යන බව පෙන්වන්න.

$AD \parallel BC$ හා $PD \perp AC$ සහිතව $ABCD$ ත්‍රිපිසියමකි.



$$\overrightarrow{OA} = \underline{i} + \underline{j}$$

$$\overrightarrow{OB} = 2\underline{i} + 3\underline{j}$$

$$\overrightarrow{OC} = 4\underline{i} + 2\underline{j}$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC} \quad (5)$$

$$= -(2\underline{i} + 3\underline{j}) + 4\underline{i} + 2\underline{j}$$

$$= 2\underline{i} - \underline{j} \quad (5)$$

$$\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3} \overrightarrow{BC} = \frac{1}{3} (2\underline{i} - \underline{j}) \quad (5) \quad \text{එම නිසා } \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BP} = \frac{8}{3} (\underline{i} + \underline{j}) \quad (5)$$

$$\overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC} \Rightarrow \frac{\lambda-1}{2} = \frac{\mu-1}{-1} \Rightarrow \lambda - 1 = 2(1 - \mu) \quad (5)$$

$$\lambda + 2\mu = 3 \dots \dots \dots (1) \quad (5)$$

$$\overrightarrow{PD} \perp \overrightarrow{AC} \Rightarrow \overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0, \quad (5) \quad \overrightarrow{AC} = 3\underline{i} + \underline{j} \quad (5)$$

(5)

$$\Rightarrow \left\{ \left(\frac{8}{3} - \lambda \right) \underline{i} + \left(\frac{8}{3} - \mu \right) \underline{j} \right\} \cdot (3\underline{i} + \underline{j}) = 0 \quad 8 - 3\lambda + \frac{8}{3} - \mu = 0 \quad (5)$$

$$9\lambda + 3\mu = 32 \dots\dots\dots (2) \quad (5)$$

$$(1) \text{ න් } \Rightarrow 9\lambda + 18\mu = 27$$


$$15\mu = -5 \Rightarrow \mu = -\frac{1}{3} \quad (5)$$

හා

$$\lambda = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3} \quad (5)$$

$$\text{එනැයිත් } \overrightarrow{OD} = \frac{11}{3} \underline{i} - \frac{1}{3} \underline{j}.$$

බල පද්ධතිය



I O වටා F_1 හා F_2 හි සුර්ණය $\mathcal{U} = 2.4 - 3.2 + 4.1 - 2.3 = 0$ (5)

A වටා F_1 හා F_2 හි සුර්ණය $\mathcal{U} = 1.4 - 2.2 + 3.1 - 1.3 = 0$ (5)

F_1, F_2, F_3 හා F_4 හි O වටා සුර්ණය $= F_3$ හා F_4 හි O වටා සුර්ණය (5)

$$= 6.1 + 9.6 = 60 \sim Nm$$

(5)

30

II පද්ධතිය විභේදනයෙන්

$$\rightarrow X = 2 + 3 + 6 + 9 = 20$$
 (5)

$$\uparrow Y = 4 + 1 + 12 + 3 = 20$$
 (5)

(X, Y) සම්ප්‍රයුක්ත බලයෙහි ක්‍රියා රේඛාව හා y - අක්ෂය ජේදනය වන ලක්ෂ්‍යය $N(0, b)$ (5)
යැයි ගනිමු.

එවිට, O මූලය වටා සුර්ණ ගැනීමෙන්

$$O \sim b.X = 60 \Rightarrow b = \frac{60}{X} = \frac{60}{20} = 3$$
 (5)

(5)

$\therefore N$ ලක්ෂ්‍යයේ ඛණ්ඩාංක $(0, 3)$ වේ.

25

III $(0, -4)$ ලක්ෂ්‍යයෙහි $-R$ හා R බල ඇතුළත් කරන්න. (5)

එවිට පද්ධතිය, $(0, -4)$ ලක්ෂ්‍යයෙහි R බලයක් සමඟ

සුර්ණය වූ $G = X.(3 + 4) = 140 Nm$ ට යුග්මයකට තුල්‍ය වේ. (5)

$(0, -4)$ හි තනි R බලයේ ක්‍රියා රේඛාව $y = x - 4$ වේ. (5)


$\frac{-1}{3} = \frac{11}{3} - 4$ බැවින් $D\left(\frac{11}{3}, \frac{-1}{3}\right)$ හි ඛණ්ඩාංක මෙම සමීකරණය සපුරාලයි. (5)

$\Rightarrow$ තනි බලයේ ක්‍රියා රේඛාව මත D පිහිටයි. (5)

25

15 වන ප්‍රශ්නය


- 15.(a) AB, BC, CD, DE හා EA ඒකාකාර බර දඬු පහක් ඒවායේ කෙළවරවලින් සුමට ලෙස සන්ධි කර රූපයේ දැක්වෙන පරිදි $ABCDE$ පංචාස්‍රයක හැඩයේ රාමු සැකිල්ලක් සාදා ඇත. BC, CD හා DE දඬු එක එකක දිග l හා බර W වේ. AB හා EA දඬු එක එකක දිග $2l$ හා බර $2W$ වේ. දිග l වූ සැහැල්ලු PQ දණ්ඩක P හා Q දෙකෙළවර පිළිවෙලින් AE හා AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යවලට සුමට ලෙස අසව් කර ඇත. A සන්ධියෙන් නිදහස් ලෙස එල්ලා ඇති රාමු සැකිල්ල සිරස් තලයක සමතුලිතව පිහිටයි.




B සන්ධියෙහි ප්‍රතික්‍රියාවේ තිරස් හා සිරස් සංරචක වන (X, Y) ද PQ සැහැල්ලු දණ්ඩේ තෙරපුම වන T ද නිර්ණය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලියා දක්වන්න. **ඒනයින්**, B සන්ධියේ දී AB දණ්ඩ මත ප්‍රතික්‍රියාව සොයා, $T = \frac{7W}{\sqrt{3}}$ බව පෙන්වන්න.

- (b) දෘඪ සැහැල්ලු දඬු හතක් ඒවායේ කෙළවරවලින් නිදහස් ලෙස සන්ධි කර සාදා ගත් **සමමිතික** රාමු සැකිල්ලක් රූපයේ දැක්වේ. AB, BC හා DE දඬු තිරස් වේ. $\angle ADE = \angle CED = 45^\circ$ සහ $\angle BDE = \angle BED = 30^\circ$ වේ. රාමු සැකිල්ලට A, B හා C සන්ධිවල දී රූපයේ දැක්වෙන භාර යොදා ඇති අතර, D හා E සන්ධිවල දී සමාන P සිරස් බලවලින් ආධාර කර ඇත. P හි අගය සොයන්න.

බෝ අංකනය යෙදීමෙන්, A හා D සන්ධි සඳහා ප්‍රත්‍යාබල සටහන් එක ම රූපයක අඳින්න. **ඒනයින්**, AD, AB, DE හා DB දඬුවල ප්‍රත්‍යාබල සොයා, ඒවා ආතති හෝ තෙරපුම් වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න.



(a)



BC, CD, DE දඬු සඳහා

සිරස් විභේදනයෙන්,

$$\uparrow 2Y = 3W \Rightarrow Y = \frac{3W}{2} \quad (10)$$

CB සඳහා, C වටා ඝූර්ණ ගැනීමෙන්

$$C \curvearrowright -X \cdot l \frac{\sqrt{3}}{2} + Y \cdot \frac{l}{2} = W \cdot \frac{l}{4} \quad (10)$$

$$X\sqrt{3} = \frac{3}{2}W - \frac{1}{2}W = W \quad (5)$$

AB දණ්ඩ සඳහා A වටා ඝූර්ණ ගැනීමෙන්,

$$T \cdot l \frac{\sqrt{3}}{2} = Xl\sqrt{3} + Y \cdot l + 2W \cdot \frac{l}{2} \quad (15)$$

$$T \frac{\sqrt{3}}{2} = W + \frac{3}{2}W + W = \frac{7}{2}W \quad (5)$$

$$T = \frac{7W}{\sqrt{3}} \quad (5)$$


$$R = \sqrt{X^2 + Y^2} = W \sqrt{\left(\frac{1}{3} + \frac{9}{4}\right)} = W \sqrt{\frac{31}{12}} \quad (5)$$

$$\tan \theta = \frac{Y}{X} = \frac{3W/2}{W/\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \quad (5)$$

B හි ප්‍රතික්‍රියාව, තිරස සමග $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ කෝණයක් සාදයි. (5)


15

(b) රූප සටහන



$$2P = 70$$

$$P = 35 \text{ N} \quad (5)$$



ප්‍රත්‍යා බල සටහනට

(25)

$$bc = 20\sqrt{2} \text{ N} \quad (5) : AD \text{ හි තෙරපුම} \quad (5)$$

$$ca = 20 \text{ N} \quad (5) : AB \text{ හි තෙරපුම} \quad (5)$$

$$de = 20 + 15\sqrt{3} \text{ N} \quad (10) : DE \text{ හි ආතතිය} \quad (5)$$


$$ec = 30 \text{ N} \quad (5) : DB \text{ හි තෙරපුම} \quad (5)$$

75

16. ආධාරකයේ අරය a හා උස h වූ ඒකාකාර ඝන කේතුවක හා අරය a වූ ඒකාකාර ඝන අර්ධගෝලයක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රවල පිහිටුම්, අනුකූලව භාවිතයෙන් සොයන්න.

ස්කන්ධය M , අරය a හා කේන්ද්‍රය O වූ ඒකාකාර ඝන අර්ධගෝලයකින්, ආධාරකයේ අරය a හා උස a වූ C නම් සෘජු වෘත්ත කේතුව ඉවත් කිරීමෙන් ලැබෙන ඝන වස්තුව R යැයි ගනිමු. M ඇසුරෙන් R ඝන වස්තුවේ ස්කන්ධය, හා ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම සොයන්න.

ඊළඟට රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට S සංයුක්ත වස්තුවක් සෑදෙන පරිදි C ඝන කේතුව R ඝන වස්තුවට සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. මෙහි දී C හි ආධාරකයේ වෘත්තාකාර දාරය R හි ගැටියට දෘඪ ලෙස සම්බන්ධ කරනු ලබන්නේ ගැටියේ O කේන්ද්‍රය C හි ආධාරකයේ කේන්ද්‍රය සමග සම්පාත වන පරිදි ය.




S සංයුක්ත වස්තුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය G , එහි සමමිතික අක්ෂය මත, ආධාරකවල පොදු කේන්ද්‍රය වන O සිට $\frac{a}{8}$ දුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.

- (a) S සංයුක්ත වස්තුව, දාරයේ P ලක්ෂ්‍යයකින් නිදහස් ලෙස එල්ලනු ලැබේ.
- සමමිතික අක්ෂය වන OV හි තිරසර ආනතිය සොයන්න; මෙහි V යනු C හි ශීර්ෂයයි.
 - සමමිතික අක්ෂය තිරස් ලෙස තබා ගැනීම සඳහා V ශීර්ෂයට ඇඳිය යුතු අංශුවේ m ස්කන්ධය, M ඇසුරෙන් සොයන්න.
- (b) V හි දී සම්බන්ධ කරන ලද m ස්කන්ධය ද සහිත S සංයුක්ත වස්තුව, එල්ලන ලද ලක්ෂ්‍යයෙන් ඉවත් කර, එහි අර්ධගෝලීය පෘෂ්ඨය අවල සුමට තිරස් තලයක ඇතිව සමතුලිතව තබනු ලැබේ. OV අක්ෂය හා උඩු අත් සිරස අතර කෝණයේ අගය පරාසය සොයන්න.

අරය a වූ ඒකාකාර ඝන අර්ධ ගෝලය

ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය, සමමිතික අක්ෂය මත O කේන්ද්‍රයේ සිට $\bar{x}_1$ දුරකින් පිහිටයි.




$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{3}\pi a^3 \rho\right) \bar{x}_1 &= \int_0^a x \cdot \rho \pi (a^2 - x^2) dx \quad (5) \\ &= \rho \pi \left[-\frac{(a^2 - x^2)^2}{4} \right]_0^a \quad (5) \\ &= \frac{\rho \pi a^4}{4} \quad (5) \\ \bar{x}_1 &= \frac{3}{8} a \quad (5) \end{aligned}$$

25

ආධාරක අරය a හා උස h වූ ඒකාකාර ඝන කේතුව

ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය, සමමිතික අක්ෂය මත V ශීර්ෂයේ සිට y_1 දුරකින් පිහිටයි. මෙහි



$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3}\pi a^2 \rho h\right) \bar{y}_1 &= \int_0^h y \cdot \rho \pi \left(\frac{ay}{h}\right)^2 dy \quad \left(\tan \alpha = \frac{a}{h}, r = y \tan \alpha\right) \quad (5) \\ &= \frac{\rho \pi a^2}{h^2} \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^h \quad (5) \\ \Rightarrow \bar{y}_1 &= \frac{3h}{4} \quad (5) \end{aligned}$$

ආධාරකයේ කේන්ද්‍රයේ සිට ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට දුර $= \frac{1}{4} h$


25

ඉතිරි වූ ඝන වස්තුව R

$$R \text{ ඝනයේ ස්කන්ධය} = \frac{2}{3}\pi a^3 \rho - \frac{1}{3}\pi a^2 \cdot a\rho \quad (5)$$

$$= M - \frac{M}{2} = \frac{M}{2} \quad (5)$$

O සිට R හි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට දුර $\bar{x}$



$$\bar{x} = \frac{M \frac{3}{8}a - \frac{M}{2} \frac{a}{4}}{M/2} = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right)a = \frac{a}{2} \quad (5)$$

25

$OG \equiv \bar{x}$ යැයි ගනිමු. මෙහි G යනු S සංයුක්ත වස්තුවෙහි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය වේ.

$$M\bar{x} = \frac{M}{2} \left(\frac{a}{2}\right) - \frac{M}{2} \left(\frac{a}{4}\right) \Rightarrow \bar{x} = \frac{a}{8} \quad (5)$$

(5)

(15)


25

- a) i) P ලක්ෂ්‍යයෙන් එල්ල වීම, G ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය P ට සිරස්ව පහළින් පිහිටයි.
 PO හා සිරස අතර θ කෝණය

$$\tan \theta = \frac{a/8}{a} = \frac{1}{8} \quad \text{මගින් දෙනු ලැබේ.} \quad (10)$$

- ii) OV තිරස්ව තැබීම සඳහා (P ට සිරස්ව පහළින් O පිහිටීමට)

$$\vec{O} \quad mg \cdot a = Mg \left(\frac{a}{8}\right) \Rightarrow m = \frac{M}{8} \quad (5)$$




25

- b) $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ තුළ සියලු ϕ සඳහා

$$R = (M + m)g \quad \text{වේ.}$$

එහි OV අක්ෂය, සිරසට ඕනෑම සුළු කෝණයක් ආනතව නිශ්චලව තිබේ.



රූප සටහනට (5)

25

17 වන ප්‍රශ්නය

- 17.(a) මිනිසෙක්, යතුරු පැදිය, පා පැදිය හෝ පයින් යන ගමන් ක්‍රම තුනෙන් එකක් පමණක් යොදා ගනිමින්, නිශ්චිත මාර්ගයක් දිගේ අනතුරු සහිත ගමනක් යයි.

මිනිසා මෙම ගමනාගමන ක්‍රම යොදා ගැනීමේ සම්භාවිතා පිළිවෙළින් p , $2p$ හා $3p$ වේ නම්, p හි අගය සොයන්න.

ඔහු මෙම ගමනාගමන ක්‍රම යොදා ගැනීමේ දී අනතුරක් සිදු වීමේ සම්භාවිතා පිළිවෙළින් $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{10}$ සහ $\frac{1}{20}$ වේ නම්, තනි ගමනක් දී අනතුරක් සිදු වීමේ සම්භාවිතාව ගණනය කරන්න.

ගමන අතරතුරේ දී මිනිසාට අනතුරක් සිදු වී ඇති බව දන්නේ නම්, මිනිසා ගමන් කරමින් සිටියේ,

(i) යතුරු පැදියෙන්, (ii) පා පැදියෙන්, (iii) පයින්

වීමේ සම්භාවිතාව ගණනය කරන්න.

වඩාත් ආරක්ෂිත වූයේ කුමන ගමනාගමන ක්‍රමය ද? ඔබගේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.


- (b) කාර්මික විද්‍යාල සිසුන් 100 ක කණ්ඩායමක් මහා මාර්ගයක එක්තරා කොටසක් මතීන ලද අතර, ඔවුන්ගේ මිනුම් පහත සඳහන් සංඛ්‍යාත වගුවේ දක්වා ඇත.

දිග (මීටර) x	99.8	99.9	100.0	100.1	100.2	100.3	100.4
සංඛ්‍යාතය f	5	7	12	33	25	15	3

උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යය $\bar{x}_a = 100.1$ හා $d = 0.1$ සඳහා, $y = \frac{x - \bar{x}_a}{d}$ පරිණාමනය භාවිතයෙන්, අනුරූප y හා y^2 අගයන් ඇතුළත් කෙරෙන පරිදි ඉහත වගුව විස්තීරණය කරන්න. y හි මධ්‍යන්‍යය සොයා, එනමින් x හි මධ්‍යන්‍යය 100.123 බව පෙන්වන්න.

$\sqrt{1.917} \approx 1.385$ බව ගනිමින්, සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ සම්මත අපගමනය, ආසන්න වශයෙන් දශමස්ථාන තුනකට නිවැරදි ව, ගණනය කරන්න.

- (a) M = යතුරු පැදියෙන් ගමන යෑම
 B = පා පැදියෙන් ගමන යෑම
 F = පා ගමනින් යෑම
 A = අනතුරක් වීම



M , B හා F සිද්ධි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර හා නිරවශේෂ බැවින්,

$$P(M) + P(B) + P(F) = 1 \quad (5)$$

$$\Rightarrow p + 2p + 3p = 1 \quad \text{එනම්} \quad p = \frac{1}{6} \quad (5)$$

10

දැන්,

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(M \cap A) + P(B \cap A) + P(F \cap A) \quad (5) \\
 &= P(A|M) \cdot P(M) + P(A|B) \cdot P(B) + P(A|F) \cdot P(F) \quad (5) \\
 &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{10} + \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{20} \quad (15) \\
 &= \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{40} = \frac{4+4+3}{120} = \frac{11}{120} \quad (5)
 \end{aligned}$$

30

$$\text{(i) } P(M|A) = \frac{P(M \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{11}{120}} = \frac{4}{11} \quad (5)$$

$$\text{(ii) } P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{11}{120}} = \frac{4}{11} \quad (5)$$

$$\text{(iii) } P(F|A) = \frac{P(F \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{40}}{\frac{11}{120}} = \frac{3}{11} \quad (5)$$

අනතුරක් සිදුවීමේ අඩුතම සම්භාවිතාව, මිනිසා පා ගමනින් යන විටදී ය. ඒ අනික් සම්භාවිතා ඊට වඩා වැඩි බැවිනි. (5)

∴ ආරක්ෂිතම ගමනාගමන ක්‍රමය පා ගමනයි. (5)

30

b) x = මහා මාර්ග කොටසේ දිග, මීටරවලින්,

x	99.8	99.9	100.0	100.1	100.2	100.3	100.4
සංඛ්‍යාතය f	5	5	7	33	25	15	3

පරිණාමනය :

$$y = \frac{x - \bar{x}_a}{d} = \frac{x - 100.1}{0.1} \quad (5)$$

විස්තෘත වගුව :

y	-3	-2	-1	0	1	2	3
y^2	9	4	1	0	1	4	9

(10)

(5)

$$\sum fy = -15 - 14 - 12 + 0 + 25 + 30 + 9 = -41 + 64 = 23 \quad (5)$$

y හි මධ්‍යන්‍යය :

$$\bar{y} = \frac{1}{100} \sum fy = 0.23 \quad (5)$$

$$x = \bar{x}_a + dy \Rightarrow \bar{x} = \bar{x}_a + d\bar{y} \quad (5)$$

$$\therefore x \text{ හි මධ්‍යන්‍යය : } \bar{x} = 100.1 + (0.1)0.23 = 100.123$$

(5)

40

y හි විචලතාව,

$$S_y^2 = \frac{1}{100} \sum fy^2 - \bar{y}^2 \quad (5) \quad \text{හා}$$

$$\sum fy^2 = 45 + 28 + 12 + 0 + 25 + 60 + 27 = 85 + 85 + 27 = 197 \quad (5)$$

$$\frac{1}{100} \sum fy^2 = 1.97, \quad (5) \quad \bar{y}^2 = (0.23)^2 = 0.0529 \quad (5)$$

$$\therefore y \text{ හි විචලතාව} = 1.97 - 0.0529 = 1.917 \quad (5)$$

ඒකජ සම්බන්ධය : $x = dy + \bar{x}_a$

$$Var(X) = d^2 Var(Y), \quad d = 0.1$$

$$S_x^2 = d^2 S_y^2 \quad (5)$$

$$\therefore Var(X) = (0.1)^2 1.917$$

$Var(X)$ හි වර්ග මූල ගැනීමෙන්

$$x \text{ හි සම්මත අපගමනය} = S_x = (0.1)\sqrt{1.917} \quad (5)$$

$$S_x = 0.1385; \quad (\because \sqrt{1.917} \approx 1.385)$$

$$x \text{ හි සම්මත අපගමනය} \quad 0.1385m \approx 0.139m. \quad (5)$$

40

III කොටස

3.0 පිළිතුරු සැපයීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හා යෝජනා :

3.1. පිළිතුරු සැපයීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු :

පොදු උපදෙස් :

- ★ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඇති මූලික උපදෙස් කියවා හොඳින් තේරුම් ගත යුතුය. එනම් එක් එක් කොටසින් කොපමණ ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවකට පිළිතුරු සැපයිය යුතු ද කුමන ප්‍රශ්න අනිවාර්ය වේ ද කොපමණ ලකුණු ලැබේ ද කොපමණ කාලයක් ලැබේ ද යන කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු අතර, ප්‍රශ්න හොඳින් කියවා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ප්‍රශ්න පිළිබඳව නිරවුල් අවබෝධයක් ඇති කර ගෙන පිළිතුරු ලිවිය යුතුය.
- ★ I පත්‍රයේත් II පත්‍රයේත් A කොටසෙහි සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
- ★ I පත්‍රයේත් II පත්‍රයේත් B කොටසෙහි ප්‍රශ්න 07ත් තෝරා ගත් ප්‍රශ්න 05කට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
- ★ සෑම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්ම අලුත් පිටුවකින් ආරම්භ කළ යුතුය.
- ★ අයදුම්කරුගේ විභාග අංකය සෑම පිටුවකම අදාළ ස්ථානයේ ලිවිය යුතුය.
- ★ ප්‍රශ්න අංක හා අනුකොටස් අංක නිවැරදිව ලිවිය යුතුය.
- ★ සියලුම ප්‍රශ්න හොඳින් කියවා පිළිතුරු ලිවිය යුතුය. ප්‍රශ්න යටතේ දී ඇති තොරතුරුත්, ලබා ගත යුතු පිළිතුරු හෝ සාධනය කළ යුතු ප්‍රතිඵල කවරේ ද යන්නත් පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගත යුතුය.
- ★ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී දී ඇති කාලය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ගැනීමට වග බලා ගත යුතුය.
- ★ පැහැදිලි අත් අකුරින් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. පිළිතුරු ලිවීමේදී නිල් පාට හෝ කළු පාට පෑන් පමණක් භාවිත කළ යුතුය. අනෙකුත් පාට පෑන් භාවිත කිරීමෙන් වැළකිය යුතුය.

විශේෂ උපදෙස් :

- ★ රූප සටහන් ඇඳිය යුතු අවස්ථාවලදී ඒවා ඉතා පැහැදිලිව ඇඳ නම් කළ යුතුය. මෙහිදී රේඛාවල දිග හා කෝණවල විශාලත්ව සන්සන්දනාත්මකව නිවැරදි රූපය හා අනුරූප වන සේ දැක්වීම අවශ්‍ය වේ. රූපසටහන්වල නිරවද්‍යතාව, සම්බන්ධතා දැකීමටත් ඒ ඇසුරින් පහසුවෙන් පිළිතුරු කරා එළඹීමටත් මහෝපකාරී වෙයි. රූප සටහන්වල තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේදී ද නිරවද්‍යතාව කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. (නිදසුන : බල ලකුණු කිරීම)
- ★ ගණනය කිරීම්වලදී එක් එක් පියවර පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු අතර, අවශ්‍ය ස්ථානවලදී පියවර අතර සම්බන්ධය දැක්වෙන සමාන ලකුණු හෝ වෙනත් අදාළ සංකේත හෝ ලියා දැක්වීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. එක් පියවරක හෝ පිටුවක හෝ ඇති ප්‍රකාශන හා සමීකරණ ඊළඟ පියවරට හෝ පිටුවට පිටපත් කිරීමේදී ඒවායේ නිරවද්‍යතාව පිළිබඳව ඉතා සැලකිලිමත් විය යුතුය.
- ★ අවශ්‍ය ස්ථානවලදී නිවැරදිව ඒකක භාවිත කළ යුතුය. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී නිවැරදි ඒකක පරිවර්තනය පිළිබඳව ද සැලකිලිමත් විය යුතුය.

★ ප්‍රස්තාර ඇඳීමේදී X හා Y අක්ෂ නිවැරදිව නම් කර පරිමාණගත කළ යුතු අතර, අවශ්‍ය අවස්ථාවල ඒකක ද සඳහන් කළ යුතුය.

★ මූලික සමානුපාත පිළිබඳ සංකල්ප නැවත පරිශීලනය කළ යුතුය.

★ මූලික ජ්‍යාමිතිය පිළිබඳ දැනුම සහ අවබෝධය ඉතා වැදගත් වේ.

- නිදසුන්:
- (1) සමාන්තරාස්‍රයක ලක්ෂණ
 - (2) රොම්බසයක ලක්ෂණ
 - (3) සවිධි ඡඩ්‍රයක / බහු අස්‍රයක ලක්ෂණ
 - (4) ත්‍රිකෝණ ආශ්‍රිත විවිධ ප්‍රමේය
 - (5) සමරූපී ත්‍රිකෝණ
 - (6) වෘත්ත ආශ්‍රිත ප්‍රමේය
 - (7) සමමිති ගුණ

★ සාධකවලට බිඳිය හැකි වර්ගජ ප්‍රකාශන එකවරම සාධකවලට වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කළ යුතුය.

★ දෛශික නිරූපණයේදී නිවැරදි සංකේත භාවිත කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය.

★ “එනයිත් ලබා ගන්න”, “අපේක්ෂා කරන්න”, “සත්‍යාපනය කරන්න”, “ව්‍යුත්පන්න කරන්න” වැනි යෙදුම් කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතු අතර, ඒ අනුව පිළිතුර කරා එළඹීමට වග බලා ගත යුතුය. ‘එනයිත් හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ’ යනුවෙන් සඳහන් අවස්ථාවලදී බහුල වශයෙන්ම පෙර ලබා ගත් ප්‍රතිඵලය භාවිත කර ඊට පසු ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම වඩාත් පහසු වේ.

★ දී ඇති තොරතුරු භාවිතයෙන් නිගමනයකට එළඹිය යුතු අවස්ථාවලදී විලෝම ක්‍රියාවලිය ඉදිරිපත් කිරීම ලකුණු අභිවිමට හෝ අඩුවීමට හේතු වේ. එබැවින් ප්‍රශ්නය මගින් අපේක්ෂිත ආකාරයට පිළිතුර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එහෙත් “නම් ම පමණක්” හෝ “ම නම් පමණක්” සත්‍ය බව සාධනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී විලෝම වශයෙන් ද ප්‍රතිඵලය ලැබෙන බව සනාථ වන පරිදි පිළිතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

★ සෑම විටෙකදීම අවසාන පිළිතුර සරලම ආකාරයෙන් දැක්වීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය. අවසාන පිළිතුර, ප්‍රශ්නයෙහි අසා ඇති ආකාරය අනුව පැහැදිලිව දැක්විය යුතුය.

★ අයදුම්කරුවන් තම ඉලක්කම්, සංකේත සහ අදහස් පැහැදිලිවත් නිවැරදිවත් ලියා දැක්වීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය.

★ පිළිතුර කරා එළඹීමට අවශ්‍ය සුළු කිරීම් (සංඛ්‍යාමය, විජ්‍ය හෝ ත්‍රිකෝණමිතික) කටුවැඩ ලෙස සැලකුව ද පිළිතුර සමගම පසෙකින් ඉදිරිපත් කරන්න.

★ පිළිතුර සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි අවස්ථාවලදී වුව ද ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ලබා ගැනීමට අදාළ ඉදිරි පියවර ලියා දැක්වීම බොහෝවිට ඵලදායී විය හැකිය.

★ ප්‍රශ්නයක අග කොටස්වල පවා මුල් කොටස්වලින් ස්වාධීන වූ පහසු කොටස් තිබිය හැකි බැවින් ප්‍රශ්නයක මුල් කොටස අපහසු වුව ද ප්‍රශ්නය අත්හැර නොයා ඉතිරි කොටස් පිළිබඳව ද අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

★ සමහර විටෙක යම් අනුකොටසක් සාධනය නොකළ ද එම ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය නම් යෙදීමෙන් ඉදිරි අනුකොටසක් සඳහා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.